QL 674
M2
F
V. 5
Wolf Room

THE
ACADEMY of NATURAL SCIENCES
OF
Philadelphia
FOUNDED 1812

STORIA
DEGLI
UCCELLI

ORNITHOLOGIA

STORIA NATURA
DEGLI UCCE

TRATTATA CON METO

E ADORNATA

DI FIGURE INTAGLIATE IN RA
E MINIATE AL NATURALE

TOMO QUINTO

ED ULTIMO

A SUA ECCELLENZA

IL SIG. CONTE DEL S. R. I.

ANTONIO DI THURN E VALSASSINA

CIAMBERLANO E CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO
DELLE LL. MM. II. RR. APOST.
TENENTE MARESCALLO DELLE LL. ARMATE, MAGGIORDOMO MAGGIORE

DI S. A. R. IL GRANDUCA DI TOSCANA

ec. ec. ec.

IN FIRENZE L' ANNO MDCCLXXVI.
NELLA STAMPERIA DI GIUSEPPE VANNI

CON LICENZA DE' SUPERIORI

P.P.A.N.

ORNITHOLOGIA

METHODICE DIGESTA

ATQUE

ICONIBUS AENEIS

AD VIVUM INLUMINATIS ORNATA

TOMUS QUINTUS

ATQUE ULTIMUS

EXCELSO VIRO

S. R. IMP. COMITI

ANTONIO DE THURN ET VALSASSINAE

IMP. REG. APOST. MAIESTATUM

A CUBICULIS ET CONSILIIS SANCTIORIBUS STATUS

CASTRORUM LOCUMTENETI MARESCIALLO, MAGNO AULAE PRAEFECTO

REGIAE CELSITUDINIS MAGNI ETRURIAE DUCIS

&c. &c. &c.

FLORENTIAE ANNO MDCCLXXVI.

IN TYPOGRAPHIA IOSEPHI VANNI

SUPERIORUM PERMISSU.

QL674
M2
F
v. 5
Wolf Room

P.P.A.

112308

A SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE DEL SAC.ROM.IMP.
ANTONIO DI THURN E VALSASSINA
CIAMBERL.E CONSIGLIERE INTIMO
ATTUALE DI STATO, COLONNELLO
PROPRIETARIO D'UN REGGIMENTO
D'IN FANTERIA E TENENTE
MARESCIALLO NELLE
ARMATE DELLE LL.
MM.II.E R.APO. MAGGMO
MAGGIORE DI S.A.R
IL SERENISSIMO
GRANDUCA DI
TOSCA NA. &C &C.&C.
GLI AUTORI DI QUEST OPERA
HANNO L'ALTO ONORE DI
DEDICARE, E TRIBUTARE
IL QUINTO ED ULTIMO TOMO
DELLA MEDESIMA A PERSO
NAGGIO TANTO ILLUSTRE, E MAGNA
NIMO BENEFICENTE, E FREGIATO D'
OGNI ALTRA PIÙ LUMINOSA VIRTÙ.
Laudantur Vestes, Gemmae frangentur et aurum,
Quam tribuet Virtus fama perennis erit.
Giuliano Traballesi inv. e del.
L. Lorenzi incis.

STORIA DEGLI UCCELLI

La quale comprende non solo una sommaria notizia di quelli, che vengono rappresentati dalle Figure, o Tavole di quest'Opera, ma che si stende ancora a descrivere, e similmente a illustrare tutti gli altri finora cogniti, e statici descritti dai più celebri Autori.

I numeri Romani indicano la specie, e le spiegazioni di quegli Uccelli, le figure dei quali quì ritrovansi aggiunte: gli Arabici appartengono alle specie, e varietà non state figurate, ma che trovansi tuttavolta descritte, e aggiunte sotto i respettivi loro Generi.

AVIUM HISTORIA

Quae Aves illas non solum ab Operis huiusce Iconibus, sive Tabulis demostratas breviter illustrat, verum earum etiam omnium, quarum a celebroris notæ Auctoribus ad hanc usque diem notitiam habemus, concinnam descriptionem, atque non absimilem comprehendit illustrationem.

Romani numeri ad Aves Tabulis demostratas, ipsarumque historicas illustrationes designandas inserviunt: Arabici autem illas Avium species ac varietates indigitant, quae Iconibus non ostenduntur, sed singulis suisque tamen generibus adiunctae & descriptae adinveniuntur.

T. CCCCLXXXI. B. — 9. 1.

GALLINELLA Palustre comune, detta dai Veneziani Porzana — Lat. *Gallinula Palustris vulgaris*; Gerin. Ornith. N. 516. — *Ralla Anglorum & Gallorum ex Gallinularum genere*; Aldrov. — *Ralla Anglorum aquatica*; Jonst. — *Rallus aquaticus Aldrovandi*; Willugh. Rai. Sloan. & Klein — *Ortygometra subtus albescens, tergore fulvo, maculis castaneis*; Barr. — *Gallinula, serica*; Gesn. Aldrov. Jonst. & Willugh. — *Gallinula Holoserica*; Charlet. — *Gallinula Chloropus varior species*; Marsil. — *Gallinae aquaticae species prima de novo adjuncta*; Gesn. — *Glareola septima*; Schwenek, Klein. & Rzac. — *Rallus alis griseis fusco-maculatis, hypochondriis albo-maculatis, rostro luteo; Rallus aquaticus*; Linn. Syst. Nat. Gen. 83. spec. 2. — *Rallus aquaticus*; Brisl. Tom. V. pag. 151. sp. 1. — Gall. *Rasile d'eau.* — Angl. *Water-Rail.*

LE Gallinelle Palustri abitano presso le aeque, e frequentano particolarmente i stagni, dove nasce della Ninsèa, sopra le cui foglie corrono, come gli Scojattoli; anzi per la velocità del loro corso fannò lungo cammino per aequa senza punto intorbidarla. La loro carne viene molto apprezzata per un certo sapor salvatico, che ella ha, onde ne rimane provocato l'appetito e la volontà insieme di bere. Variano nel colore del becco secondo l'età, ed il tempo della cova.

A Mestre, luogo non molto lungi da Venezia, si fa caccia di questi Uccelli con somma spesa; mentre vi sono uomini, che muniti di alcuni calzari, fanno le veci dei cani da caccia, andando per l'acqua, e con dei bastoni gli discacciano; ond'è che sono quindi predati dai Falchi. Trovansi in Toscana nei Laghi di Bientina e di Fucecchio.

Juxta aquas degunt, & praecipue stagna, in quibus Nymphoea crescit, super cuius folia prout Glires currunt; imo ob celerem cursum claram aquam per intervalla transeunt. Earum caro conviviis commendatur; nam cum ferinum nescio quid sapiat, appetentiam irritat, bibendique voluntatem. In rostri colore variant juxta aetatem, & incubatus tempus.

Moestris, Rure non procul Venetiis distante, magnis capiuntur expensis. A Famulis, qui venaticorum Canum vice coturnis induti per aquas errant, fustibus exturbantur, hinc praeda Falconum insidiis fiunt. In lacu Focensi, & Blentinensi in Etruria frequentes.

Queſt' Uccello credeſi una ſemplice varietà della *Gallinella Vellutata*, così detta per uno ſplendido color nero a guiſa di *velluto*, di cui elegantemente è coperta. Hanno alcuni ancora creduto eſſer varietà di queſta ſpecie quell'Uccello detto dagli Italiani *Re delle Quaglie*, e dagli Autori *Rallus Geniſtrarum ſive Ortygometra*, il quale difatto è di queſto genere, ma di ſpecie affatto diverſa, come può vederſi alla Tav. CCXXXXVIII. Tom. II., ſotto la quale è ſtato deſcritto e rappreſentato.

A queſto parimente può andare appreſſo un'altra *Gallinella di piedi roſſi*, o ſieno di *color fenicio* dell' Aldovrando, ma eſſa appartiene ad altro genere, ed è ſtata da noi deſcritta ſotto nome di *Culbianco* ſpecie di *Beccaccino* alla Tav. CCCCLVII.. La Gallinella Paluſtre vien caratterizzata da quattro dita prive di membrane, tre anteriori, ed uno poſteriore: dalle gambe nell'inferior parte ſpogliate di piume, dal becco dritto, lateralmente piatto, e dalla corporatura egualmente nei fianchi compreſſa.

Avis haec ſimplex creditur varietas Gallinulae ſericae, *ideo dictae, quod color ater in ea holoſerici inſtar ſplendeat. Nonnulli varietatem hujus ſpeciei crediderunt eſſe Avem illam ab Italis nuncupatam* Re delle Quaglie, *& ab Authoribus* Rallum Geniſtrarum, ſive Ortygometram, *quae revera hujus generis eſt, ſed penitus diverſae ſpeciei, ut videre eſt ad Tabulam CCXXXXVII. Tom. II., ſub qua deſcripſimus, & delineavimus.*

Huic pariter adfinis eſt alia Gallinula Rhodopes, *ſeu* Phoenicopos *Aldovrandi; ſed ad aliud genus pertinet, ac deſcripta fuit, nempe ſub nomine* Tringae, *Tabula CCCCLVII.. Gallinulae Paluſtris characteres ſunt, digiti quatuor membranis deſtituti; tres ſcilicet antici, poſticus unus; crura in parte inferiore plumis denudata; roſtrum rectum, lateraliter compreſſum; corpus lateraliter aeque compreſſum.*

T. CCCCLXXXII. B. — 6. 2.

GALLINELLA Paluſtre piccola — Lat. *Gallinula paluſtris minor*; Gerin. Ornith. N. 514. — *Ratione roſtri, pedum, magnitudinis, ac colorum prorſus differre ab illa videtur, quam habet Briſſonius Tom. VI. pag. 7. ſp. 2.*

T. CCCCLXXXIII. B. — 8. 2.

GALLINELLA armata di vario colore Indiana ivi detta IACANA — Lat. *Gallinula armata varia Indica*, Iacana *dicta*. — *Rallus digitis triuncialibus, calcaneo biunciali, aculei-formi, anomalo*; Klein. — *Fulica fronte carunculata, corpore variegato, humeris ſpinoſis, digitis ſimplicibus, ungue poſtico longiſſimo. Fulica ſpinoſa*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 82. ſpec. 4. — *Iacana armata varia*; Briſſ. Tom. V. pag. 129. ſp. 5. — Gall. *Le Chirurgen varié* — *Georgius Edwardus hujus praebet Avis figuram valde accuratum Tom. I. pag.* 48.. *Habitat in India Occidentali, ſignanter circa Carthagenam novam in America Meridionali.*

T. CCCCLXXXIV. B. — 9. 1.

GALLINELLA acquatica volgarmente SUTRO — Lat. *Gallinula Ochra*; Geſn. Aldrov. Ionſt. Willugh. & Rai. — *Porzana minor*; Aldrov. & Ionſt. — *Porzana Italorum*; Charlet. — *Rallus acquaticus minor, ſive Maruetta*; Briſſ. Tom. V. pag. 155. ſp. 2. — Gall. *Le petit Raſile d'eau, ou la Marouette* — Angl. *Girardin.* — *Iuxta ſtagnorum, & fluviorum ripas verſatur.* Ochra *a colore totius fere corporis ſubviridi, ſed ſordido, & obſcuro dicta eſt; eam Bononienſes & Veneti* piccola Porzana, *ac Mediolanenſes* Girardina *appellant.*

5. GALLINELLA maggiore — Lat. *Gallinula major* — *Gallinula Chloropos noſtra major*; Aldrov. — *Gallinula*; Briſſ. Tom. VI. pag. 3. — *Flumina & ſtagna frequentat. In fruticibus juxta ipſorum ripas provenientibus nidificat. Ova ponit ex albo virideſcentia, maculis rubro-fuſcis varia.*
6. Altra GALLINELLA maggiore — Lat. *Gallinula alia major* — *Gallinula Chloropos altera*; Aldrov. — *Gallinula major*; Briſſ. Tom. VI. pag. 9. ſp. 3. — *Habitat in Italia circa Bononiam.*
7. GALLINELLA minore; — Lat. *Gallinula minor*; Briſſ. Tom. VI. pag. 7. ſp. 2. — *Flumina & Piſcinas frequentat.*
8. GALLINELLA detta IACANA — Lat. *Iacana*; Piſon. Marcg. Ionſt. Willugh. *Rai.* & Briſſ. Tom. V. pag. 123. ſp. 2. — *Habitat in paluſtribus Braſiliae locis.*
9. GALLINELLA detta IACANA armata — Lat. *Iacana armata*; Briſſ. Tom. V. pag. 123. ſp. 2. — *Habitat in paluſtribus Braſiliae locis.*

10. GAL-

10. GALLINELLA detta IACANA armata nera — *Iacana armata nigra*; Briſſ. Tom. V. pag. 124. ſp. 3. — *Habita in paluſtribus Braſiliae locis*.
11. GALLINELLA detta IACANA armata ſcura — Lat. *Iacana armata fuſca*; Briſſ. Tom. V. pag. 125. ſp. 4. — *Habitat in Braſilia, Mexico, & Dominicenſi Inſula*.

T. CCCCLXXXV. B. — 11. 2.

POLLO SULTANO — Lat. *Porphyrio*; Geſn. Aldrov. Willugh. Rai. & Briſſon. Tom. V. pag. 522. ſpec. 1. — *Porphyrion*; Geſn. Ionſt. & Charleth. — *Rallus aquaticus roſtro, fronte, pedibuſque rubris; reliquo corpore cyaneo, ſub cauda plumis albis*; Klein. — *Fulica fronte calva corpore violaceo; digitis ſimplicibus, Porphyrio*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 82. ſp. 3. — Gall. *Le Poule-Sultane*.

COſe mirabili ci vengono narrate dagli Autori del Pollo Sultano, e particolarmente dall' Aldovrando al Tom. III. Cap. XXVIII. pag. 437., le quali quaſi tutte noi abbiamo per finte e favoloſe, e quelle particolarmente, che con tante lodi ſono dette intorno alla di lui pudicizia.

Che il Pollo Sultano ſia Uccello Acquatico abbaſtanza lo dimoſtra la lunghezza delle ſue gambe. Egli abita ſecondo il Briſſon nell' Indie Orientali, e in varie parti dell' America poſte ſotto la Zona torrida. Queſto Uccello ſolo, eccettuato il Pappagallo, ſi ſerve dei piedi, come di mano, mentre con eſſi prende dell' acqua, e del cibo, e ſe lo arreca al becco, ed in queſta forma ſi nutriſce. Scrive Callimaco, ſulla teſtimonianza di Ateneo, che egli non ſoffre la viſta di alcuno, mentre mangia, e che molto inveiſce contro quegli, che in tal tempo gli ſi accoſtano.

Cibaſi di peſci e degli alimenti più umidi; imperciocchè per la lunghezza ed anguſtia del ſuo collo difficilmente inghiottiſce delle coſe aride.

Eliano ci avverte che i Greci ed i Romani ſi aſtenevano dalla carne del Pollo Sultano; e che appreſſo di loro, atteſa la di lui bellezza e coſtumi morigerati, veniva nutrito per piacere nelle magnifiche Abitazioni, o come coſa ſacra cuſtodito ed alimentato in qualche Tempio.

I caratteri con i quali è diſtinto il Pollo Sultano, ſono, quattro dita prive di membrane, tre anteriori, ed uno poſteriore; le gambe nella parte inferiore ſpogliate di piume; il becco di figura conica, lateralmente compreſſo, e la fronte calva.

Mirabilia de Porphyrione narrantur apud Authores, & praeſertim Aldovrandum T. III. Cap. XXVIII. pag. 437., quae fere omnia tamquam ſimulata habemus & fabuloſa, eaque inprimis, quae de ipſius pudicitia ſummis laudibus praedicantur.

Porphyrionem Avem eſſe aquaticam longitudo crurum ſatis indicat: eumque in Indiis Orientalibus, & variis Americae Regionibus ſub Zona torrida poſitis habitare, teſtatur Briſſonius. Hic ſolus, praeter Pſittacum, pede ſuo inſtar manus aquam ſuſcipiens ad roſtrum differt, & potat, ſeque humano modo paſcit. Tradit Callimachus, Atheneo referente, nullius aſpectum pati cum comedit, illiſque, qui propius ad cibum ſuum accedunt infenſum eſſe.

Piſcibus veſcitur, & humidioribus alimentis; nam ob colli longitudinem & anguſtiam difficulter arida devorat.

Graecos, & Romanos a Porphyrionis eſu abſtinuiſſe innuit Aelianus; ipſius enim pulcritudine compoſitiſque moribus in magnificis aedibus pro delectatione, vel in Templo aliquo, utpote ſacer, tantummodo nutriebatur.

Porphyrionis characteres ſunt: digiti quatuor membranis deſtituti, tres ſcilicet antici, poſticus unus; crura in parte inferiore plumis denudata; roſtrum conicum, lateraliter compreſſum; calvitium in fronte.

T. CCCCLXXXVI. B. — 11.

POLLO SULTANO volgarmente CIMANDORLO, ed in Toſcana FIUMALBO — Lat. *Porphyrio ex viridi nigricans — An Porphyrio minor?* Briſſ. Tom. V. pag. 526. ſpec. 2. — Gall. *la petite Poule-Sultane — Craſſitie Limoſam circiter aequat. Habitat in America & India Orientali.*

T. CCCCLXXXVII. B. — 11. —

POLLO SULTANO della ſpecie antecedente, Femmina — Lat. *Porphyrio antecedentis ſpeciei, Foemina*; Gerin. Ornith. N. 518.

4. Pollo Sultano col capo nero — Lat. *Porphyrio melanocepholos*; Briſſ. Tom. V. pag. 526. Var. A. — *Magnitudine & craſſitie Porphyrionem communem aemulatur. Cum illo coloribus quoque convenit, & ab eo non diſcrepat niſi capite nigro. Habitat in America.*
5. Pollo Sultano verde — Lat. *Porphyrio viridis*; Briſſ. Tom. V. pag. 529. ſp. 3. — *An Porphyrio olivarius, pedibus leucophaeis?* Barr. — *Porphyrioni ex viridi nigricanti paululum craſſitie cedit. Habitat in India Orientali.*
6. Pollo Sultano di color foſco — Lat. *Porphyrio fuſcus*; Briſſ. Tom. V. pag. 531. ſp. 4. — *Gallinulae aquaticae ſecundum genus, quod* Glutt *nominant, quaſi* Glottidem; Geſn. — *Gallinula Chloropos Ornithologi, quam apud Germanos* Glutt *quaſi* Glottidem *vocari ait*; Aldrov. — *Gallinula Chloropos tertia*; Ionſt. — *Habitat in Germania, ~~ibique~~ lacuum, & piſcinarum ripas frequentat.*
7. Pollo Sultano roſſiccio — Lat. *Porphyrio rufeſcens*; Briſſ. Tom. V. pag. 533. ſp. 5. — *Gallinula terreſtris*; Aldrov. Ionſt. & Willugh. — *Gallinula terreſtris, quae vulgo Germanis* Hegeschara *dicitur*; Geſn. — *Trochilus terreſtris vel Rallus terrenus*; idem — *Habita in Germania.*
8. Pollo Sultano roſſeggiante — Lat. *Porphyrio rufus*; Briſſ. Tom. V. pag. 134. ſp. 6. — *Gallinulae aquaticae quartum genus,* Schmirring *dictum; nobis Ochropus magnus*; Geſn. — *Gallinula Ochropus major*; Aldrov. & Ionſt. — *Gallinula Ochropus major Geſnero, Aldrovando*; Willugh. — *Gallinula aquatica Ornithologis; Trochilus aliis Glareola*; Rzac. — *Gallinula aquatica quarta Geſneri; Ochropus magnus ejuſdem; Glareola tertia Schwenckfeldii*; idem. — *Glareola tertia*; Schwenck. — *Glareola tertia Schwenckfeldii*; Klein. — *Habitat in Germania.*
9. Pollo Sultano della Baja d'Hudſon — Lat. *Porphyrio Freti Hudſonis*; Briſſ. Tom. V. pag. 541. ſp. 9. — *Rallus Carolinus*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 83. ſp. 5. — *Habitat in Freto Hudſonis.*
10. Pollo Sultano del Maderaſpatan — Lat. *Prophyrio Maderaſpatanus*; Briſs. Tom. V. pag. 543. ſp. 10. — *Crex Indica ex albo cinerea, nigroque mixta*; Rai. — *Circa Maderaſpatanum habitat.*

T. CCCCLXXXVIII. B. — 11. 2.

COMBATTENTE detto dai Franceſi PAVONE DI MARE — Lat. *Avis pugnax*; Ionſt. Charlet. Marſil. Willugh. Rai. & Rzac. — *Avis quaedam, quam in Belgio* Kemperken, *ideſt Pugnacem vocant.* Aldrov. — *Glareola pugnax*; Klein. — *Philomacus*; Moehr. — *Tringa pedibus rubris, rectricibus tribus lateralibus immaculatis, facie papillis granulatis carneis. Pugnax*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 78. ſp. 1. — *Tringa pugnax*; Briſſ. Tom. V. pag. 240. ſp. 18. — Gall. *Le Combattant ou Paon-de-mer* — Angl. *Ruffe* (Maſ) *Reeve* (Foemina).

SIffatti Uccelli hanno ottenuto il nome di Combattenti per ragione che tra i maſchi ſi oſſerva altercazione così grande, che continuamente combattono, e ſcambievolmente ſi uccidono, fintantochè ſieno divenuti di numero eguale colle loro femmine. Eglino ripoſano di notte con ſomma quiete, e di giorno volano a branchi, ed ivi toſto ſi azzuffano, dove calano a terra. Tra le femmine però non naſce conteſa alcuna.

Eſſi ſi raggirano lungo le rive del mare, frequentano le paludi, ed i confini generalmente delle acque; dove ancora coſtituiſcono i loro nidi.

Ogn'anno appariſcono in gran numero in tempo di eſtate, venendo dal Settentrione, nelle Paludi della Provincia di Lincoln, ove ſi trattengono, e nidificano; nell'autunno poi partono, e non ſi sà verſo qual parte.

I Combattenti ſono del genere di Culbianco o Beccaccino, e perciò dagli Ornitologi vengono diſtinti con i medeſimi caratteri di quello.

HUjuſmodi Aves Pugnacium *nomen ſunt adeptae, quia inter mares tanta obſervatur contentio, ut continuo pugnent, & ſeſe mutuo occidant, donec cum foeminis numero pares evaſerint; ipſae enim noctu quiete conſident, interdiu turmatim volitant, illico dimicantes ubi ſe in terram demittunt. Inter foeminas vero nulla differentia eſt.*

Juxta maris littora, paludes, & aquarum confines verſantur, & nidificant.

Quotannis aeſtate immenſo numero e ſeptentrione in paludes Agri Lincolnienſis advolant, ibique nidulantur, & autumno diſcedunt, & quo peregrinentur ignotum eſt.

Pugnaces Aves ſunt ex genere Tringae, ideoque characteribus Tringae ab Ornithologis diſtinguuntur.

L'Al-

Octo

L'Aldrovando riporta e descrive otto generi, o sieno piuttosto forme di questi Uccelli, che ancor noi riportiamo in Catalogo dopo la seguente Tavola.

Octo ipsarum genera, seu formas potius descripsit & depingi curavit Aldrovandus, quas infra post sequentem Tabulam reportamus.

T. CCCCLXXXIX. B. — 11. 2.

COMBATTENTE Indiano nominato in Francia UCCELLO BIANCO, e più comunemente IL GOBBO, e nell'Indie RUPIE — Lat. *Avis pugnax Indica* — Gall. *Oiseau blanc, & plus communement le Bossu*, in Indiis vero *Rupie*.

Hujus generis Avis sive Europeae, sive Indicae originis sequentes habentur apud Authores varietates.

3. Prima *Perdicis instar toto corpore maculis respergitur. Caput Galeritae velut apice insigne est. Rostrum exile, in extremitate nonnihil recurvum. Caput, cervix, dorsum, alae, venter, & femora ex luteo ad castaneae fere colorem tendunt, & maculis, quae in capite adeo exiguae sunt, ut exigua punctula potius videantur, respergunntur.*
4. Altera *cristam quoque in vertice gerit. Ventre nigricat, candicat pectore. Mentum macula nigricans, ceu barba quaedam exornat. In fronte albicat; in occipite, & in reliquis partibus ex albo ad fuscum vergit.*
5. Tertia *tota fere est rufa, nigris maculis lunam aemulantibus undique, excepta cervice, insperſa, apice caret. Femora, & infernum uropygium colore sunt baetico. Alarum pennae majores nigrae, in fine et ad latera fere croceae.*
6. Quarta *colore fere cum ista convenit, nisi quod venter sit fuscus, podex albicans, alas subalbicantes maculae multae, magnae, transversales, tortuosae transcurrunt. Caput nigrum magnae pennae velut galeam eleganter exornant, quas procul dubio dimicatura gerit.*
7. Quinta *ejusdem fere est coloris, sed pennas eas, quas erigit dimicatura majores, candidas, & in extremitatibus suis nigras habet.*
8. Sextae *pennae illae sunt candidae, color plurimum diversus. Toto enim corpore fusca est, exceptis femoribus, & cauda, quae sunt colore baetico. Ante albas illas in collo surrectas alias habet in vertice, quae minores sunt & nigrae. Caput ex cinereo flavescit.*
9. Septima *pennis omnibus variat, viridibus, albis, rubris, amethystinis, luteis, & quod observatu dignum est, nulla earum alterius colore permiscetur.*
10. Octavam *auritam Natura fecit. Rostro est gracili & oblongo; a capite per collum pennae undequaque pendent, magnitudine aequales, sed in quibus varios cernere est colores, qui velut varios torques formant, modo ferrugineos, modo rubros, modo albos. Collum habet longum, valde gracile, tenue, ad latera caudicans, caetera lutescens, lineolis longis undequaque consperſum. Caput ad latera maculam miniaceam magnam habet, in qua oculi siti sunt; aures Asininis non dissimiles; crura duplo quam praecedentibus breviora; digitum posticum admodum brevem.*

T. CCCCLXXXX. B. — 6. 1.

MERLA acquatica, o ACQUAIOLA comune — Lat. *Merula aquatica, vel Rivalis*; Gesn. — *Merula aquatica Ornithologi*; Aldrov. — *Turdus aquaticus*; Gesn. & Aldrov. — *Cornix aquatica*; Gesn. — *Trynga*; Charlet. — *Merula aquatica*; Gesn. Schwenck. Ionst. Willugh. Rai. Charlet. & Briss. Tom. V. pag. 252. sp. 19. — *Sturnus niger, pectore albo, Cinclus*; Linn. Syst. Nat. Gen. 94. sp. 4. — Gall. *Le Merle-d'eau* — Angl. *Water-Ouzel*.

LA Merla acquatica, o Acquajola comune è quasi eguale in grandezza alla Merla volgare; raggirasi intorno ai fiumi, ed ai rivi, il cui letto sia ripieno di sassi. Nelle Alpi degli Svizzeri è molto frequente. Sebbene non sia Uccello *palmipede*, tuttavia s'immerge alle volte sott'acqua. Và in traccia di piccoli pesci, nè ricusa cibarsi d'insetti. E' Uccello solitario, e soltanto nel tempo della generazione vola di concerto colla sua femmina. Essa è del genere dei Beccaccini, e perciò con i medesimi caratteri di questi viene ancora distinta.

Magnitudine Merulae vulgari suppar est. Versatur circa fluvios, & rivos, quorum alvei saxis pleni sint. In Alpibus Helveticis multo frequentes. Quamquam palmipes *non sit, sub aquis tamen nonnumquam se mergit. Pisces praedatur, nec insecta aversatur. Avis est solitaria, & pariendi tantum tempore cum foemina volat. Merula aquatica, vel rivalis inter Tringas reponitur, eisdem ideo characteribus, quibus Tringa, distinguitur.*

T. CCCCLXXXXI. B. — 6. —

MERLA acquatica di petto ceruleo scuro — *Merula aquatica pectore caeruleo fusco*; Gerin. Ornith. N. 520.

T. CCCCLXXXXII. B. — 6. 1.

MERLA acquatica nera — Lat. *Merula aquatica nigra*; Gerin. Ornith. N. 522.

T. CCCCLXXXXIII. B. — 6. —

ISPIDA volgarmente Uccello S. MARIA, o Uccello PESCATORE — Lat. *Ispida*; *Alcyon Fluviatilis*; *Alcyon Riparia*; *Alcedo*; *Avis S. Mariae, vulgo Regis Piscator*; *Ploumbina*; *Martinus Piscator*; Rzac. — *Ispida*; Gesn. Aldrov. Ionst. Willugh. Rai. Sibbad. Moehr. & Briss. Tom. IV. pag. 571. sp. 1. — *Ispida nostras*; Klein. — *Alcyon*; Gesn. Aldrov. & Charlet. — *Alcyon & Alcedo*; Ionst. — *Picus Marinus*; Gesn. — *Alcedo branchyura, supra caerulea, subtus fulva, Ispida*; Linn. Syst. Nat. Gen. 56. sp. 1. — Gall. *Le Martin-pescheur* — Angl. *King-Tisher*.

L'Ispida è Uccello solitario, e trovasi nei maggiori rigori dell'inverno alle rive congelate dei siumi: nell'estate poi raggirasi nei luoghi ombrosi vicino ai siumi, ed ai rigagnoli. Fa il suo nido nella rena, o in qualche scoglio vicino all'acqua; e lo costruisce di pappi di canne, dandogli una forma rotonda, coll'apertura da una parte; partorisce alle volte fino a nove pulcini. Cibasi di piccoli pesci e d'insetti.

Ispida Avis solitaria est, & media hyeme circa fluminum ripas glacie concretas reperitur; aestate vero in locis umbrosis prope flumina ac rivos versatur. In arena vel scopulo aliquo juxta aquam nidificat. Nidum forma rotundum, foramine in angulo ex pappis arundinum construit; pullosque interdum novem fovet. Piscciculis & insectis victitat.

La sua pelle conservata insieme colle penne vien riputata un possente riparo dalle Tignuole. Alcuni più per ischerzo, che per fiducia hanno creduto essere illesa dal fulmine quella casa, dove rimanga sospeso il suo nido. L'Aldrovando redarguisce come cosa falsa, che la sua pelle conservata appesa muti ogn'anno le penne, come se fosse nel proprio Individuo vivente.

Pellis ejus cum pennis asservata peculiari vi adversus tineas pollere creditur. Non tangi fulgure domum, in qua ejus nidus sit suspensus, nugantur quidam. Suspensam pellem pennas quotannis tamquam in vivo corpore mutare falsum comperit Aldrovandus.

Quest' Uccello nutrito in gabbia vive da quattro in cinque anni secondo l'assistenza del suo Alimentatore.

Avis haec in cavea enutrita juxta altoris curam quatuor vel quinque annos vivit.

I caratteri dell'Ispida sono, quattro dita prive di membrane, tre anteriori ed uno posteriore; le gambe ricoperte di piume fino al calcagno; il becco dritto, alquanto lungo, grosso ed acuto.

Ispidae characteres sunt: digiti quatuor membranis destituti, tres scilicet antici, posticus unus: crura ad calcaneum usque plumosa: rostrum rectum, longiusculum, crassum, acutum.

2. ISPIDA di Bengala — Lat. *Ispida Bengalensis*; Klein, & Briss. Tom. IV. pag. 475. sp. 2. — *Crassitie Ficedulam non antecellit. Habitat in Bengalensi Regno.*
3. ISPIDA minore di Bengala — Lat. *Ispida Bengalensis minor*; Briss. Tom. IV. pag. 471. sp. 3. — *Praecedenti nonnihil crassitie cedit. Habitat in Bengalensi Regno.*
4. ISPIDA Indiana — Lat. *Ispida Indica*; Briss. Tom. IV. pag. 579. sp. 4. — *Speciem istam Brissonio videre non contigit; ipse enim illius descriptionem desumpsit ex icone a D. Poivre in India depicta. Vide Brissonium loco citato.*
5. ISPIDA col collare Indiana — Lat. *Ispida torquata Indica*; Briss. Tom. IV. pag. 481. sp. 5. — *Hanc pariter non vidit Brissonius, qui eam desumpsit, et aere insculpendam curavit ex icone in India a D. Poivre depicta.*
6. ISPIDA col ciuffo dell'Isole Filippine — Lat. *Ispida Philippensis cristata*; Briss. Tom. IV. pag. 481. sp. 6. — *Ispida rostro luteo*; Klein. — *Alcedo Amboinensis cristata*; Sebb. — *Crassitie Ficedulam non multum antecellit. Habitat in Amboinensi et Philippensibus Insulis.*
7. ISPIDA del Senagal — Lat. *Ispida Senegalensis*; Briss. Tom. IV. pag. 485. sp. 7. — *Cum Ispida nostrate crassitie circiter convenit. Habitat in Senegalensi Regione.*
8. ISPIDA del Capo di Buona Speranza — Lat. *Ispida Capitis Bonae Spei*; Briss. Tom. IV. pag. 488. sp. 8. — *Merulam crassitie paululum antecellit. Habitat in Capite Bonae Spei.*
9. ISPIDA verde d'America — Lat. *Ispida Americana viridis*; Briss. Tom. IV. pag. 490. sp. 9. — *Ispidae nostrati crassitie cedit. Habitat in America.*

10. Ispida dell' Iſola di Cajenna — Lat. *Iſpida Cayanenſis*; Briſſ. Tom. IV. pag. 492. ſp. 10. — *Ad Sturni craſſitiem accedit. Habitat in Cayana.*
11. Ispida maggiore del Senagal — Lat. *Iſpida Senegalenſis major*; Briſſ. Tom. IV. pag. 494. ſp. 11. — *Praecedentem craſſitie circiter adaequat. Habitat in Senegalenſi Regione.*
12. Ispida di color celeſte del Madagaſcar — Lat. *Iſpida Madagaſcarienſis caerulea*; Briſſ. Tom. V. pag. 496. ſp. 12. — *Craſſitie praecedentem multum antecellit. Habitat ad ripam fluminis Gambenſis, et in Madagaſcaria.*
13. Ispida di Smirne — Lat. *Iſpida Smyrnenſis*; Briſſ. Tom. IV. pag. 499. ſp. 13. — *Praecedenti paulum craſſitie cedit. Habitat circa Smyrnam.*
14. Ispida maggiore di Bengala — Lat. *Iſpida Bengalenſis major*; Briſſ. Tom. IV. pag. 501. ſp. 14. — *Cum Iſpida Madagaſcarienſi caerulea craſſitie circiter convenit. Habitat in Bengalenſi Regno.*
15. Ispida col collare di Bengala — Lat. *Iſpida Bengalenſis torquata*; Briſſ. Tom. IV. pag. 503. ſp. 15. — *Iſpidam noſtratem craſſitie circiter aemulatur. Habitat in Bengalenſi Regno.*
16. Ispida di color celeſte Americana — Lat. *Iſpida caerulea Americana*; Briſſ. Tom. IV. pag. 505. ſp. 16. — *Iſpida roſtro albo*; Klein. — *Alcedo Americana, ſeu Apiaſtra*; Sebb. — *Praecedenti craſſitie cedit. Habitat in America.*
17. Ispida Indiana col ciuffo — Lat. *Iſpida Indica criſtata*; Briſſ. Tom. IV. pag. 506. ſp. 17. — *Iſpida criſtata*; Klein. — *Alcedo criſtata Orientalis elegantiſſime picta*; Sebb. — *Cum praecedente craſſitie circiter convenit. Habitat in India Orientali.*
18. Ispida del Madagaſcar — Lat. *Iſpida Madagaſcarienſis*; Briſſ. Tom. IV. pag. 508. ſp. 18. — *Iſpidam Philippenſem criſtatam circiter aequat. Habitat in Philippenſibus Inſulis et Madagaſcaria.*
19. Ispida del Braſile — Lat. *Iſpida Braſilienſis*; Briſſ. Tom. IV. pag. 510. ſp. 19. — *Avis Anonyma prima*; Marcg. et Ionſt. — *Magnitudine et craſſitie cum Iſpida noſtrate circiter convenit. Habitat in Braſilia.*
20. Ispida del Braſile col ciuffo — Lat. *Iſpida Braſilienſis criſtata*; Briſſ. Tom. IV. pag. 511. ſp. 20. — *Alcedo muta, cirrata, ſubviridis*; Barr. — *Turdelam craſſitie circiter aequat. Piſcibus victitat. Habitat in Guiana et Braſilia.*
21. Ispida col ciuffo della Carolina — Lat. *Iſpida Caroliuenſis criſtata*; Briſſ. Tom. IV. pag. 115. ſp. 21. — *Craſſitie Merulam paululum antecellit. Lacertis, ſicuti et piſcibus victitat. Habitat in Carolina.*
22. Ispida col ciuffo dell'Iſola di S. Domingo — Lat. *Iſpida Dominicenſis criſtata*; Briſſ. Tom. IV. pag. 115. ſp. 22. — *Cum praecedente craſſitie circiter convenit. Habitat in Dominicenſi Inſula, in Freto Hudſonis, et in variis Americae Regionibus.*
23. Ispida col ciuffo del Meſſico — Lat. *Iſpida Mexicana criſtata*; Briſſ. Tom. IV. pag. 518. ſp. 23. — *Avis torquata*; Cuſ. — *Avis piſcium vibratrix*; Ionſt. Willugh. & Rai. *& craſſitie Picam nonnihil antecellit. Habitat in Mexico, et Martinica.*
24. Ispida di color nero e bianco variato — Lat. *Iſpida ex albo et nigro varia*; Klein. & Briſſ. Tom. IV. pag. 520. ſp. 24. — *Iſpida ex albo et atro varia*; Sloane. — *Cum Iſpida Madagaſcarienſi caerulea craſſitie circiter convenit. Habitat in Iamaica, Aſia et Africa. A Capite Bonae Spei in Muſeum Realmurianum miſſa eſt, ex qua Briſſonius deſcriptionem deſumpſit.*
25. Ispida picchiettata del Braſile — Lat. *Iſpida Braſilienſis naevia*; Briſſ. Tom. IV. pag. 524. ſp. 25. — *Magnitudine et craſſitie cum Sturno convenit. Candam habet duos pollices et ſex lineas longam. Habitat in Braſilia.*
26. Ispida dell'Iſola di Ternate — Lat. *Iſpida Ternatana*; Briſſ. Tom. IV. pag. 525. ſp. 26. — *Avis Paradiſiaca Ternatana*; Sebb. — *Pica Ternatana*; Klein. — *Pyrrhocorax*; Moehr. — *Cum Sturno craſſitie circiter convenit. Habitat in Ternata ex Moluccis Inſulis una.*

T. CCCCLXXXXIV. B. — 8. 1.

MEROPE volgarmente in Toſcana TORDO MARINO, e nel Bologneſe DARDANO — Lat. *Merops ſive Apiaſter*; Willugh. & Rai. — *Merops*; Geſn. Aldrov. Ionſt. & Moehr. — *Merops ſimpliciter*; Klein. — *Merops flaveſcens*; Rzac. — *Merops Apiaſter dorſo ferrugineo, abdomine caudaque viridi-caeruleſcente, rectricibus duabus longioribus*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 57. ſp. 1. — *Apiaſter*; Briſſ. Tom. IV. pag. 532. ſp. 1. — Gall. *Le Gueſpier*. — Angl. *Bee-Cater*.

IL Tordo Marino detto Merope dagli Ornitologi abita la parte meridionale d'Europa, e le provincie meridionali della Francia. Nell' Iſola di Candia è frequentiſſimo; nell'Italia, e particolarmente nella Campagna di Roma non è ſenza dubbio Uccello molto raro; non così però accade in Inghilterra, dove egli non trovaſi in maniera alcuna. Cibaſi di Api; e perciò Virgilio proibiſce che ſieno gli alveari coſtruiti vicino al di lui nido. Si paſce ancora di Cicale, Scarafaggi, ed altri inſetti, come ancora di ſemi di Lampſana, Caucalide e Rape; e per la molta ſomiglianza, che ha coll' Iſpida,

MErops Ornithologis in Meridionali Europae Regione, & quidem in Meridionalibus Galliae Provinciis habitat. In Creta Inſula tam vulgaris eſt, ut paſſim in ea conſpiciatur. In Italia, praeſertim in Agro Romano non admodum infrequens eſt; in Anglia vero non invenitur. Victitat apibus; ideo Virgilius Meropis nidum prope alvearia prohibet. Verum non apibus tantum, ſed & cicadis, ſcarabaeis, aliiſque veſcitur inſectis: nec lampſanae, caucalidis, & raparum ſeminibus abſtinet: quin ob exactam ejus convenientiam cum Iſpida, ſuſpicamur eam piſces pariter praedari. Nidificat in cavernulis, in-

da, ſoſpettiamo che ſi cibi egualmente di peſci. Nidifica nelle buche profonde ora all'altezza di ſei, ora di quattro piedi, e partoriſce ſei o ſette pulcini. Suol volare a branchi intorno ai monti doviziosi di timo; e tramanda una voce ſimile in certa maniera a quella d'un Uomo, che canti fiſchiando colla bocca ſocchiuſa e rotondata.

Il Tordo Marino differiſce ſoltanto nei caratteri dall'Ispida; perchè queſta ha il becco dritto, alquanto lungo, groſſo ed acuto; e quello lo ha ſoltanto acuto ed inarcato.

interdum ad ſex, interdum ad quatuor pedum altitudinem defoſſis; & ſex, aut ſeptem pullos parit. Gregatim volat circa montes, qui tymum ferunt. Vocem inſtar hominis quodammodo edit, qui ore in rotundum clauſo ſibilans caneret.

Merops ab Iſpida tantum in characteribus diſcrepat; quod iſta roſtrum habet rectum, longiuſculum, craſſum, acutum; illa acutum tantummodo & arcuatum.

2. Merope col capo giallo — Lat. *Apiaſter Icterocephalos*; Briſſ. Tom. IV. pag. 537. ſp. 2. — *Merops alter*; Geſn. Aldrov. & Klein. — *Merops alter, ſeu Meropi congener Aldrovandi*; Willugh. — *Merops alius*; Ionſt. — *Magnitudine et craſſitie praecedentem antecellit. Habitat in variis Europae Regionibus.*
3. Merope gialliccia — Lat. *Apiaſter flavicans*; Briſſ. Tom. IV. pag. 539. ſp. 3. — *Manucodiata capite albo, maculis fulvis*; Barr. — *Manucodiatae ſecunda ſpecies*; Aldrov. — *Manucodiata ſecunda Aldrovandi*; Willugh. Rai. & Klein. — *Manucodiatae altera ſpecies*; Ionſt. *Praecedentem multum craſſitie et magnitudine ſuperat. In qua Regione habitet prorſus nos latet.*
4. Merope del Braſile — Lat. *Apiaſter Braſilienſis*; Briſſ. Tom. IV. pag. 540. ſp. 4. — *Merops Braſilienſis*; Klein. — *Pica Braſilienſis*; Seb. — *Ardeae affinis*; Moehr. *& Apiaſtrum noſtratem craſſitie circiter aemulatur. Habitat in Braſilia.*
5. Merope del Meſſico — Lat. *Apiaſter Mexicanus*; Briſſ. Tom. IV. pag. 541. ſp. 5. — *Merops cinereus*; Klein. — *Curruca*; Moehr. — *Alaudam craſſitie non ſuperat. Habitat in Mexico.*
6. Merope dell' Iſola di Francia — Lat. *Apiaſter ex Franciae Inſula*; Briſſ. Tom. IV. pag. 543. ſp. 6. — *Alaudam criſtatam non multum craſſitie ſuperat; ſed corpore donatur multo magis elongato. Habitat in Franciae Inſula.*
7. Merope del Madagaſcar — Lat. *Apiaſter Madagaſcarienſis*; Briſſ. Tom. IV. pag. 546. ſp. 7. — *Craſſitie praecedentem paululum antecellit. Habitat in Madagaſcaria.*
8. Merope del Madagaſcar col collare — Lat. *Apiaſter Madagaſcarienſis torquatus*; Briſſ. Tom. IV. pag. 449. ſp. 8. — *Paſſerem craſſitie non excedit. Habitat in Madagaſcaria.*
9. Merope di Bengala col collare — Lat. *Apiaſter Bengalenſis torquatus*; Briſſ. Tom. IV. pag. 552. ſp. 9. — *Cum Apiaſtro Madagaſcarienſi craſſitie circiter convenit. Habitat in Bengalenſi Regno.*
10. Merope minore dell' Iſole Filippine — Lat. *Apiaſter Philippenſis minor*; Briſſ. Tom. IV. pag. 555. ſp. 10. — *Apiaſtrum Madagaſcarienſem torquatum craſſitie circiter aemulatur. Habitat in Philippenſibus Inſulis.*
11. Merope d'Angola — Lat. *Apiaſter Angolenſis*; Briſſ. Tom. IV. pag. 558. ſp. 11. — *Hanc Apiaſtri ſpeciem nunquam Briſſonio videre contigit: ipſius deſcriptionem deſumpſit ex icone ad Avem ipſam depicta a D. Poivre, et ſic eam aeri inſculpendam curavit. Praecedenti craſſitie cedit. Habitat in Angolenſi Regno in Africa.*
12. Merope maggiore dell' Iſole Filippine — Lat. *Apiaſter Philippenſis major*; Briſſ. Tom. IV. pag. 560. ſp. 12. — *Apiaſtro noſtrati nonnihil craſſitie cedit. Habitat in Philippenſibus Inſulis.*
13. Merope Indiana — Lat. *Apiaſter Indicus — Apiaſter Indicus erythrocephalos*; Briſſ. Tom. IV. pag. 563. ſp. 13. — *Apiaſtrum Angolenſem craſſitie paululum ſuperat. Habitat in India Orientali.*

T. CCCCLXXXXV. *B.* — 15. 2.

AVOSETTA, o BECCOSTORTO, ed in qualche luogo d'Italia SPINZAGO d'ACQUA. — Lat. *Avoſetta, ſeu Recurviroſtra*: Geſn. & Charlet. — *Avoſetta Italis dicta*; Aldrov. — *Avoſetta Italorum*; Ionſt. — *Recurviroſtra*: Willugh. Rai. Marſ. & Rzac. — *Recurviroſtra ſubtus alba, ſuperne nigricans, pedibus cyaneis*; Barr. — *Plotus recurviroſter*; Klein. — *Recurviroſtra, Avoſetta, albo nigroque varia*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 80. ſp. 1. — *Avocetta*; Briſſ. Tom. VI. pag. 538. ſp. 1. — Gall. *L'Avocette* — Angl. *Scooper*.

IL Willughby oſſervò queſt' Uccello tanto in Roma, come in Venezia, eſſendo molto frequente in Italia. Approſſimandoſi l'inverno le Avoſette volano a branchi nei lidi Occidentali dell'Inghilterra; e dopo uno, o al più due meſi partono, forſe in cerca di ſpiagge meno ſoggette al rigore del freddo; lo che rapporta ed atteſta il Charleton. Crede l'Aldro-

AVem hanc Willughbejus tum Romae, tum Venetiis vidit; nam in Italia multum frequens eſt. Accedente hyeme Avoſettae gregatim convolant in Occidentalia Angliae littora, & poſt menſem unum, aut alterum diſcedunt, in oras forſan frigori minus obnoxias. Author eſt Charletonius. Aves eſſe ex Pugnacium *genere credit*

Al-

van-

vando che le Avosette sieno Uccelli del genere dei *Combattenti*, e che esse combattino con parecchi Uccelli del genere Tordino e Passerino.

I Caratteri dell' Avosetta sono quattro dita, tre anteriori collegate fra di loro con membrane intiere, ed uno posteriore, sciolto: le gambe nella parte inferiore spogliate di piume, poste circa la metà del corpo, fuor dell' addome, e più lunghe del corpo stesso; il becco senza dentatura, sottile, molto lungo, orizzontalmente compresso, e superiormente inarcato.

* *Aldrovandus, easque cum nonnullis ex Turdino & Passerino genere Avibus pugnare.*

Avosettae characteres sunt digiti quatuor, tres scilicet antici membranis integris inter se connaexi, posticus solutus: crura in infima parte plumis denudata, circa corpus medium & extra abdomen posita, corpore breviora: rostrum edentulum, gracile, satis longum, horizontaliter compressum, sursum arcuatum.

T. CCCCLXXXXVI. B. 1. 12. —

FENICOTTERO, altrimenti FIAMMINGO e DAMIGELLA DELL' INDIE — Lat. *Phoenicopterus*; Gesn. Aldrov. Ionst. Willugh. Raj. Sloane & Charlet. — *Phoenicopterus Authorum*; Moehr. — *Phoenicopterus Plinii, Aldrovandi*; Klein. — *Phoenicopterus Americanus*; Seb. — *Phoenicopteros Avis*; Mus. Worm. — *Avis, quam Hispani* Flamenco *vocant*; Ioan. de Laet. — *Phoenicopterus ex cinereo puniceus, minori rostro*; Barr. — *Phoenicopterus roseus*; idem. — *Phoenicopterus ruber*: Linn. Syst. Nat. Gen. 72. sp. 1. — *Phoenicopterus coccineus*; Briss. Tom. VI. pag. 532. sp. 1. — Gall. *Le Flamant*. — Angl. *Flamengo, e Phenicopter*.

IL Fenicottero inoltrandosi nell' età, varia di colore, come ha notato M. Brisson, che per tal riflesso ne ha insieme riportate tre varietà. Abita per lo più in mezzo agli stagni marittimi, cibandosi di pesci e chiocciole. Mentre mangia, in tal maniera contorce il capo ed il collo, che perviene a toccare il terreno colla parte appianata della mandibula superiore; dipoi ora in questa, ora in quella parte stranamente volgendo il capo, prende cibo.

Abita quest' Uccello nell' America, ed alcune volte si è veduto in Francia nei lidi meridionali. Le sue gambe sono di tanta lunghezza, che mentre egli cova, non può ristringerle, e collocarle dentro del nido; onde costruisce il suo nido sopra dei monticelli situati nell' acqua, e vi cova colle gambe pendenti dall' una e dall' altra parte.

Distinguesi il Fenicottero da quattro dita, tre anteriori collegate fra di loro da membrane intiere, ed uno posteriore, sciolto; dalle gambe nella parte inferiore spogliate di piume, poste circa la metà del corpo, fuor dell' addome, e lunghissime; dal becco dentato, e verso la metà della lunghezza inferiormente incurvato; e dalla mandibula inferiore notabilmente più larga della superiore.

* *PHoenicopterus, aetate provehundo, colore variat, ut Brissonius notavit, illiusque tres varietates descripsit. In mediis stagnis marinis degit, piscibus & cochleis vescitur. Dum edit, collum caputque ita contorquet, ut mandibulae superioris pars plana terram attingat; dein caput hinc inde motitat, & sic cibum arripit.*

Habitat in America; quandoque in Gallia juxta maris littora Meridionalia versatur. Ipsius crura tanta longitudine pollent, ut dum incubat, ea in nido collocare nequeat; & ideo supra monticulos in aqua sitos nidum construit, ibique insidet cruribus uno in uno latere, alio in altero pendulis.

Distinguitur Phoenicopterus digitis quatuor, tribus anticis membranis integris inter se connexis, postico soluto; cruribus in parte infima plumis denudatis, circa corpus medium, & extra abdomen positis, longissimis; rostro denticulato, mediam versus longitudinem deorsum incurvo; mandibula inferna notabiliter superna latiore.

T. CCCCLXXXXVII. B. 1. 4. —

PINGUINO maggiore — Lat. *Alca major, Nautis Anglicis* Pinguin. — *Alca impennis, roſtro compreſſo-ancipiti ſulcato, macula ovata utrinque ante oculos*; Linn. Syſth. Nat. Ed. 10. Gen. 63. ſp. 2. — *Anſer Magellanicus*; idem ibidem Ed. 6. Gen. 52. ſp. 2. — *Alca torquata, ſubtus albicans, ſuperne nigricans*; Barr. — *Pingnin*; Mus. Worm. — *Pinguin Nautibus noſtratibus dicta*; Willugh. & Raj. — *Chenalopex*; Moehr. — *Mergus Americanus*; Cluſ. Willugh. & Charlet. — *Pinguin Arcticus*; Edward. Tom. III. Tab. 147. — *Alca maior*; Briſſ. Tom. VI. pag. 85. ſp. 1. — Gall. *le grand Pingoin* — Angl. *Northern Penguin*.

ABitano queſti Uccelli i Mari Settentrionali, e le Regioni Meridionali dell' America, e particolarmente frequentano lo Stretto Magellanico. Riferiſce Frezier che ſono ſconoſciuti in Affrica, eccettuato che nelle adjacenze di una piccola Iſola vicino al Capo di buona Speranza, la quale prende il ſuo nome da quello di queſti Uccelli. Eſſi vengono a terra in gran numero nel tempo della cova, ſcavando il terreno come fanno i Conigli, e devaſtano con buche quaſi interamente le Iſole, a ſegno che ſi rende difficile ai Viaggiatori il caminarvi ſenza dar dentro co' piedi in qualche ſcavo. Le loro Uova ſono molto più piccole di quelle dell' Oca: incominciano a covare ſulla fine di Settembre, ovvero ſul principio d' Ottobre, e ſe ne ſono trovati ſpeſſe volte quattro, o cinque, che covavano inſieme nella medeſima buca.

Allorchè eſſi ſono a terra ſembrano eſtremamente gravi e peſanti a cagione delle lor gambe collocate vicino all'ano, e naſcoſte dentro l'addome; ſi ſoſtengono però in un' attitudine affatto dritta; per lo che alcuni Viaggiatori, veggendogli da lontano, gli hanno preſi per Pigmei. Nuotano nell' acqua con una velocità grandiſſima. Cibanſi ordinariamente di peſci, ed alcune volte di erbe, come le Oche. La loro carne è molto graſſa, ed ha il ſapore di peſce. I Viaggiatori ſogliono ſalarla, e mangiarla in viaggio ridotti alle ultime neceſſità. Il nome di queſto Uccello, è *Pinguin* atteſa la ſua *pinguedine*. *Penguin* è voce corrotta. Alcuni ſi ſono immaginati eſſere un' antica parola celtica che ſignifica *Teſta bianca*; ma le principali Specie di queſto Genere hanno la teſta nera ſecondo le relazioni degli Autori e Viaggiatori più accreditati.

AVes hae in Septentrionalibus Maribus, ac in Americae Meridionalibus Regionibus habitant, ac reperiuntur praecipue in Freto Magellanico. Ait Frezierus minime frequentes eſſe in Africa, excepta Inſula non procul a Capite bonae Spei, quae illis abundat, atque ab illis nomen habet. Incubatus tempore magno numero terram petunt, & Cuniculorum inſtar Inſulas effodiunt; totum ſolum adeo cavum interdum efficientes, ut per Inſulas Viatores gradientes ſaepiuſcule genu tenus in eas foveas incidant. Earum Ova Anſerinis minora ſunt. Incubare incipiunt Septembris ſub fine, vel Octobris initio: & interdum quaternas, aut quinas in una ſcrobe latere, compertum eſt.

Cum humi conſiſtunt, ſummi ponderis ac admodum graves videntur, quod accidit ratione crurum ad podicem poſitorum, conditorumque intra abdomen; at erectae & ſublimi capite incedunt, ut procul Viatoribus intuentibus homunculi, aut Pygmaei viſae ſunt. Velociter in aquis natant. Saepiſſime piſcibus victitant, quandoque herbis inſtar Anſerum. Earum caro ſatis pinguis piſce ſapit. Viatores illam ſale condiunt, atque in itinere edunt, cum maior fit ciborum inopia. Avis haec a pinguedine Pinguin *dicta eſt:* Penguin *corruptum nomen. Nonnulli crediderunt celticam vocem eſſe ac vetuſtam,* Caput Album *ſignificantem; at huiuſmodi Generis praecipae Species caput habent nigrum, quod celebriores Viatores Authoreſque teſtati ſunt.*

2. PINGUINO. comune — Lat. *Alca vulgaris — Alka*; Clus. Euſ. Mus. Worm. & Ionſt. — *Alka Hoieri*; Sibbald. Rzac. & Willugh. — *Planus tonſor*; Klein. — *Alca Hoieri, Clusii, Wormii Muſei*; Raj — *Alca roſtri ſulcis quatuor; linea utrinque alba a roſtro ad oculos. Torda*; Linn. ſyſth. Nat. Gen. 63. ſp. 1. — *Alca*; Briſſ. Tom. VI. pag. 89. ſp. 2. — *Anati domeſticae paululum craſſitie cedit. Habitat in Septentrionalibus Regionibus. Iuxta Maris Littora in Gallia quandoque verſatur. In rupium foraminibus inacceſſis nidificat: ova ponit candida, maculis nigris inſignita.*

3. PINGUINO

3. Pinguino minore — Lat. *Alca minor*; Briſſ. Tom. VI. pag. 92. ſp. 3. — *Æthia*; Bell. — *Mergus Bellonii*, Aldrov. Willugh. & Raj. — *Praecedenti paululum craſſitie cedit: juſta Maris littora verſatur. Huius generis Avium characteres ſunt: digiti tres antici, membranis integris inter ſe connexi; digitus poſticus nullus: Crura ad podicem poſita, & intra abdomen condita: roſtrum lateraliter planum, tranſverſim ſtriatum, cujus longitudo craſſitiem ſuperat.*
4. Pinguino detto da Linneo Fetonte Demerso, e dal Briſſon Catarractes e Gorfou — *Lat. Alca*; Phaëthon Demerſus *Linnei*, Catarractes & Gorfou *Briſſonii*. — *Phaëthon alis impennibus, roſtro mandibulis edentulis, digito poſtico diſtincto; Phaëthon demerſus*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 67. ſp. 2. — *Catarractes*, Briſſ. Tom. VI pag. 102. ſp. 1. — *Penguin*; Edward. Tom. I. pag. 49. — *Briſſonius Avem hanc diverſi generis habet, illiq. diſſimiles tribuit caracteres; nempe digitos quatuor, tres ſcilicet anteriores membranis integris inter ſe connexos, poſticum ſolutum: crura ad podicem poſita, & intra abdomen condita: roſtrum rectum, apice mandibulae ſuperioris aduncum, inferioris rotundatum. Anſerem domeſticum magnitudine, & craſſitie circiter aemulatur. Habitat in Mari Meridi nali.*
5. Pinguino detto Patagone — Lat. *Alca Patagonica*: — *Pinguinus Patagonicus D. Thomae Pennant*; Rozier. Obſerv. ſuper Phys Hiſt. Nat. & Artes Tom. 1. Par. 1. pag. 200. — *Habitat in Inſula Patagonica*: Patagonici *nomen adeptus eſt, non ſolum quia in Inſula ſic dicta frequens, verum etiam quia magnitudine omnes hujus generis ſpecies ſuperat, ut a Patagonicis homines alii ſuperantur.*

T. CCCCLXXXXVIII. B. 1. 6. —

Diomedea o Sfenisco Brizzolato — Lat. *Diomedea, vel Spheniſcus naevius*; — *Diomedea alis impennibus, pedibus tetradactylis. Diomedea demerſa*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 65. ſp. 2. — *Spheniſcus naevius*; Briſſ. Tom. VI. pag. 99. ſp. 2. — *Penguin ex Oceano Auſtrali pedibus nigris*; Edward. Tom. II. pag. 94. — Gall. *Le Manchot tacheté.*

ABitano queſti Uccelli nel Mare Meridionale, e particolarmente vicino al Capo di Buona Speranza. Il deſcrittoci da Edward varia dal noſtro nei colori; mentre in quelle parti, dove queſto è affatto nero, quello è ſcuro, ſenza eſſer macchiato di alcuni punti, che dal bianco tendono al cenerino. Nel rimanente nulla differiſce; e forſe la ſola differenza procede dalla varietà del ſeſſo.

Il Briſſon ci dà un'altra ſpecie di queſto genere, che chiama ſemplicemente *Sfeniſco*, la qual frequentemente dagli Autori vien confuſa col *Pinguino maggiore*.

I caratteri dello Sfeniſco ſono quattro dita, tre anteriori collegati fra di loro con membrane intiere, ed uno poſteriore, libero: le gambe collocate all'ano, e naſcoſte dentro l'addome: il becco dritto: la punta della mandibula ſuperiore ripiegata, e quella dell'inferiore quaſi troncata.

AVes hae habitant in Mari Meridionali, & praecipue prope Caput Bonae Spei. Illa, cuius deſcriptionem dedit Edwardus, ab iſta coloribus diſcrepat. Omnibus in locis, in quibus nuper deſcripta nigricat, illa fuſceſcit, & punctulis cinereoalbis nunquam variegatur. In reliquis cum iſta perfecte convenit. Forſan ab ea ſexu ſolummodo differt.

Briſſonius alteram huius generis ſpeciem habet, quam ſimpliciter Spheniſcum *appellat, quamque cum* Alca maiore *paſſim Authores confundunt.*

Spheniſci characteres ſunt; digiti quatuor, tres ſcilicet anteriores membranis integris inter ſe connexi; poſticus ſolutus: crura ad podicem poſita, & intra abdomen condita: roſtrum rectum: apex mandibulae ſuperioris aduncus, inferioris quaſi truncatus.

T. CCCCLXXXXIX. B. 2. 6. 2.

Onocrotalo, o ſia Pellicano — Lat. *Onocrotalus, ſive Pelecanus*; Aldrov. Willugh. Ionſt. Raj. & Marſil — *Onocrotalus*; Geſn. Bell. Charlet. Moeher. & Briſſ. Tom. VI. pag. 520. ſp. 1. — *Onocrotalus, Truo*; Schwenck. — *Onocrotalus Avis*; Bont. — *Onocrotalus Plinio, Pelicanus Bellonio, Aldrovando, Truo Feſto*; Rzac, — *Plautus Gulo*; *Onocrotalus albus*; Klein. — *Pelecanus gula ſaccata. Onocrotalus*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 66, ſp. 1. — Gall. *le Pelican* — Angl. *Pelecane.*

L'Onocrotalo ſupera per il doppio la groſſezza di un Cigno. Si raggira intorno ai lidi del Mare, e frequenta i Laghi, ed i Fiumi maggiori. Nell'Egitto ſono abbondanti, e trovanſi ancora in gran copia nella Moſcovia. L'Imperator Moſcovita, mandati avendo ai

DUplicem fere Cygni craſſitiem obtinet Onocrotalus. Iuxta Maris littora verſatur, & Flumina magna, Lacuſque frequentat. In Egypto hujuſmodi Aves ſatis frequentes ſunt, inveniuntur & etiam abundanter in Moſcovia: Imperator enim Moſcoviticus Willughbei temporibus,

ai tempi del Willughby degli Ambaſciatori al Re d'Inghilterra, tra le altre più prezioſe e rare coſe, che fece a quello preſentare, gli donò due Uccelli di queſto Genere, che toſto ebbero luogo nel Vivajo di S. Giacomo preſſo Venſmiſter. Frequentano ancora le parti ſettentrionali della Francia, e i Luoghi marittimi della Toſcana preſſo Orbetello.

Cibanſi di peſci, e queſti non piccoli; imperciocchè un Peſce di cinque libbre non è per loro un gran paſto. Formano il nido di ramoſcelli, e lo coſtituiſcono alle rive di qualche fiume, o ſtagno, ed ivi depongono tante uova, quante depor ne ſuole il Cigno, ed eguali in groſſezza a quelle dell'Oca.

Volano alle volte ſoli, alle volte a branchi, e fanno volando dello ſtrepito grandiſſimo colle ali. Hanno una voce ſimile al ragghio Aſinino. Trovanſi aver queſti uccelli di particolare, che le loro oſſa ſono traſparenti, ſolide, e prive affatto d'ogni midollo. Eſſi ſecondo gli Ornitologi pervengono ad un'eſtrema vecchiezza; ſopra il qual punto veggaſi la Diſſertazione da noi premeſſa al Tom. IV. che ha per titolo *Dell'Età degli Uccelli*.

I Caratteri dell'Onocrotalo ſono quattro dita, tutte fra di loro collegate con membrane intiere: le gambe poſte circa la metà del corpo, fuor dell'addome, e più corte del corpo ſteſſo: il becco dritto, orizzontalmente piano, e ritorto in punta: la gola munita di una borſa membranacea: e le narici in niuna maniera viſibili.

* *bus, miſſis ad Anglorum* Regem *Legatis, inter alia munera pretioſa et rarieta, duabus hujus generis Avibus eum donavit, quae locum obtinuere in Vivario S. Iacobi dicto prope Veſtmonaſterium. Reperiuntur quoque in* Gallia Septentrionali, *& in Etruriae maritimis* Locis *prope Orbetellum.*

Piſcibus victitant non exiguis; quinque enim librarum piſcis haud magna ipſis eſca eſt. Nidum ex ramulis ad ripam fluminis alicujus, vel ſtagni ponunt, ibique tot Ova Anſerinis ſimilia, quot Cygnus ſolet, edunt foetuſque enutriunt.

Volant nonnunquam ſoli, nonnunquam gregatim, & cum volant, maximum alarum ſonum cient. Vox ipſis ruditui Aſini ſimilis. Singulare in hac Ave eſt, quod oſſa pellucida, ſolida, omni omnino medulla carent. Maximam Onocrotalis longevitatem tribuunt Ornitologi; de qua vide Diſſertationem, cui titulus De Aviurn Aetate, *quam Tom. IV. praemiſimus.*

Onocrotali characteres ſunt digiti quatuor omnes membranis integris inter ſe connexi: crura circa corpus medium & extra abdomen poſita, corpore breviora: roſtrum rectum, horizontaliter planum, apice aduncum: guttur burſa inſabili inſtructum; nares nequaquam conſpicuae.

T. D. B. 2. 7. —

ONOCROTALO, o PELLICANO d'America — Lat. *Onocrotalus ſive Pelecanus Americanus.* — *Onocrotalus, ſive Pelecanus fuſcus*; Sloane & Raj: — *Pelecanus ſub fuſcus, gula diſtenſili*; Browne — *Plancus Gulo, Onocrotalus fuſcus*; Klein. — *Pelecanus Gula ſaccata; Onocrotalus ſive Pelecanus fuſcus*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 66. ſp. 1. Var. A. — *Onocrotalus fuſcus*, Briſſ. Tom. VI. pag. 524. ſp. 2. — Gall. *Le Pelican brun.* — Angl. *Pelecane.* — *Habitat in America, ubi vivere* 40. *&* 50. *annos dicitur.*

3. Onocrotalo, o Pellicano del Meſſico — Lat. *Onocrotalus Mexicanus — Onocrotalus roſtro denticulato*; Briſſ. Tom. VI. pag. 523. Var. A. — *Ab Onocrotalo communi ſolummodo differt roſtro denticulato, & croceo colore imbuto. Habitat in Mexico.*
4. Onocrotalo, o Pellicano dell'Iſole Filippine — Lat. *Onocrotalus Philippenſis*; Briſſ. Tom. VI. pag. 527. ſp. 3. — *Onocrotalum Americanum multum craſſitie ſuperat. Habitat in Philippenſibus Inſulis.*

T. DI. B. 1. 5. 1. ½

MARANGONE, o ſia CORVO ACQUATICO — Lat. *Phalacrocorax ſive Corvus Aquaticus — Phalacrocorax*; Geſn. Ionſt. Charlet. & Briſſ. Tom. VI. pag. 511. ſp. 1. — *Phalacrocorax, ſive Corvus aquaticus Plinii*; Aldrov. — *Corvus Aquaticus*; Geſn. Aldrov. Ionſt. Willugh. Raj. Sibbald. & Marſil. — *Corvus aquaticus major, ſeu Mergus magnus niger Geſneri.* Rzac. — *Corvus lacuſtris, aquaticus, Geſneri: Plancus*; Klein. — *Corvus lacuſtris*; Schwenck. — *Corvus Sinarum Marinus*; Eus. — *Carbo aquaticus*; Geſn. — *Pelecanus, Carbo, cauda aequali, corpore nigro, roſtro edentulo*; Linn. Syſth. Nat.

Nat. Gen. 66 ſp. 3. — *Mergus Magnus niger, nonnullis*; Geſn. Schwenck. & Klein. — *Morſex*; Geſn. Aldrov. Ionſt. & Charlet. — Gall. *Le Cormoran* — Angl. *Cormorant*. —

IL Marangone, o ſia Corvo Aquatico frequenta i lidi del Mare e le Paludi. Nidifica ora nelle Rupi, ora negli alberi più alti, ed ivi depone due, o tre uova alla volta; lo che è degno di qualche oſſervazione: non eſſendoſi fino ad ora conoſciuto, fuor di queſto, altro uccello *palmipede*, che non ſolo non nidifichi, ma neppure ſi poſi negli alberi. Egli ſolleva molto in alto il ſuo volo. I ſuoi Pulcini tolti dal nido pochi giorni innanzi, che incomincino a volare, così facilmente ſi addomeſticano, che volano alla campagna, e quindi tornano.

Cibanſi di ranocchi, cavellette, grilli, e particolarmente di peſci.

Sogliono gl'Ingleſi aſſuefare queſti uccelli alla Peſca, la quale viene diffuſamente deſcritta dal Willughby alla pag. 248. della ſua Ornitologia.

I Caratteri del Marangone ſono quattro dita, tutte fra di loro collegate con membrane intiere; l'unghia del dito di mezzo delle tre dita anteriori internamente dentata a guiſa di ſega: le gambe poſte circa la metà del corpo, fuor dell'addome, e più corte del corpo ſteſſo; il becco dritto, quaſi cilindrico e piegato in punta.

Iuxta Maris littora verſatur Phalacrocorax, paludeſque frequentat. Modo in rupibus, modo in arboribus excelſis nidificat, ibique bina, aut terna ova ponit; quod notatu dignum eſt, cum propter hanc, nullam hactenus palmipedem *Avem novimus, quae arboribus inſidere, nedum in iis nidulari conſueverit. Altiſſime volat. Pulli diebus aliquot antequam volare poſſint, nidis exemti, ita facile cicurantur, ut in agros evolent, & ſubinde revertantur.*

Veſcuntur ranis, locuſtis, gryllis, & praecipue piſcibus.

Solent Angli hujuſmodi Aves ad piſcium praedam aſſuefacere, quam piſcationem peculiariter deſcribit Willughbejus Ornith. pag. 248.

Phalacrocoracis characteres ſunt: digiti quatuor, omnes membranis integris inter ſe connexi: trium digitorum anticorum medii unguis interius, ſerrae inſtar denticulatus: crura circa copus medium, & extra abdomen poſita corpore breviora: roſtrum rectum, ſubcylindricum, apice aduncum.

T. DII. B. 1. — —

MARANGONE affatto nereggiante, oſſia CORVO ACQUATICO minore — Lat. *Phalacrocorax penitus nigricans, ſeu Corvus aquaticus minor.* — *Gracculus palmipes Ariſtotelis, ſeu Corvus aquaticus minor*; Aldrov. & Ionſt. — *Gracculus palmipes, Corvus marinus, Mergus magnus niger*; Charlet. — *Corvus aquaticus minor, Gracculus palmipes dictus*. Raj. — *Plancus, Corvus minor & aquaticus*; Klein. — *Phalacrocorax minor*; Briſſ. Tom. VI. pag. 516. ſp. 2. — Gall. *Le petit Cormoran* — Angl. *Shag.* — *Praecedenti multum craſſitie cedit, ac illius inſtar modo in rupibus, modo in arboribus nidificat.*

T. DIII. B. 1. 3. —

MARANGONE di becco, e piedi gialli — Lat. *Phalacrocorax roſtro & pedibus luteis*. Gerin. Ornith. N. 533.

T. DIV. B. 1. 4. —

MARANGONE volgarmente in Toſcana PERDIGIORNO — Lat. *Phalacrocorax vulgo in Etruria* Perdigiorno *dictus*; Gerin. Ornith. N. 534. — *Ratione roſtri pertineret ad aliud genus, nempe ad inſequens Merganſeris, ſed ſtructura pedum, ſive digitorum hic referri debuit.*

T. DV. B. 1. 4. —

MERGO maggiore, volgarmente SMERGO, o COLIMBO MASSIMO del Geſnero — Lat. *Mergus maior*; *ſeu Colymbus maximus Geſneri*; Willugh. — *Avis Fluder dicta, ſeu Colymbus maximus*; Aldrov. — *Quaedam Avis Colymbis congener, quae in Acronio Lacu reperitur*; Geſn. — *Colymbus maximus*; idem, Ionſt. & Klein. — *Mergus maior*; Briſſ. Tom. VI. pag. 105. ſp. 1. — Gall. *Le grand Plongeon*.

TUtti gli Uccelli di queſto Genere hanno il becco dritto ed acuto, ed i piedi molto lateralmente compreſſi. Il loro dito intimo per tutta la lunghezza della parte interiore viene orlato di membrana. Raggiranſi intorno ai Laghi ed ai Fiumi, e ritrovanſi particolarmente nel Lago di Coſtanza. Vivono di peſci. La loro carne viene molto ſtimata, per eſſer certamente di buon ſapore.

OMnes huius Generis Alites roſtrum habent rectum & acutum, pedeſque valde lateraliter compreſſos. Ipſorum digitus intimus per totum lateris interioris longitudinem membranula donatur. Circa Lacus & Amnes verſantur, & praecipue in Brigantino Lacu reperiuntur. Piſcibus victitant. Earum caro in cibis commendatur, eſtque ſaporis non iniucundi.

T. DVI. B. 1. 2. —

MERGO o SMERGO maggiore forſe Femmina dell'antecedente ſpecie — Lat. *Mergus major, an antecedentis ſpeciei Foemina?* Gerin. Ornith. N. 537.

T. DVII. B. 1. 3. 1.

MERGO o SMERGO maggiore brizzolato, o ſia MERGO ARTICO — Lat. *Mergus major naevius, ſive Arcticus — Mergus maximus Farrenſis;* Muſ. Worm. — *Mergus maximus Farrenſis, ſive Arcticus;* Cluſ. Euſ. Jonſt. Willugh. Raj. & Klein. — *Mergus Arcticus, ſeu Farrenſis;* Charlet. — *Colymbus maximus ſtellatus noſtras;* Sibbald. — *Mergus major naevius;* Briſſ. Tom. VI. pag. 120. ſp. 6. — Gall. *Le grand Plongeon tacheté* — Angl. *Greateſt Diver*, e *Greateſt Loon*.

IL Mergo maggiore brizzolato ſupera in groſſezza l'Anatra domeſtica. Abita nei Mari di Sententrione, e particolarmente nell'Iſola Farrenſe, che è tra l'Islandia, e la Novergia. Nidifica nei ſtagni, e depone due uova alla volta, alquanto più groſſe di quelle dell'Oca, di color verde, e ſparſe di macchie di color di ruggine.

Fa colle ali volando grande ſtrepito, e preſagiſce la pioggia, e la tempeſta; onde è manifeſto che il Cluſio foſſe poco informato, ſcrivendo non eſſerſi mai veduto volare queſt' Uccello, nè avere l'uſo delle ali per il volo. Egli ha le ali molto grandi, proporzionate al ſuo corpo, e che ſembrano non eſſergli dalla Natura invano contribuite.

Qualora vien preſo contraſta con gran forza, e col ſuo becco ferocemente inveſte la mano del Predatore. Se accade che prendaſi la Femmina, il Maſchio ſeguita a covar le uova, le difſerra, ed alimenta i Pulcini. La ſua caccia ſi fa con dei lacci teſi intorno al ſuo nido.

MErgus maior naevius craſſitie Anſerem domeſticam antecellit. Habitat in Maribus Septentrionalibus, & praecipue circa Farrenſem Inſulam, quae inter Norvegiam, & Iſlandiam ſita eſt. In ſtagnis nidificat, & duo ponit ova Anſerina magnitudine pene ſuperantia, quae viridi ſunt colore, ferrugineis ſparſim aſperſa maculis.

Inter volandum alis tinnitum edit, pluviamque & tempeſtates praeſagit; unde patet, Cluſium minus bene informatum eſſe, cum ſcribit, volantem nunquam eſſe conſpectam, nec alarum uſum habere ad volandum. Alae enim magnae ſunt, corpori Avis proportionatae, ut illi non videantur fruſtra datae a Natura.

Cum capitur, maximis viribus reluctatur, hominemque roſtro acutiſſimo ferociſſime petit. Si Foeminam capias, ovis incubat Maritus, excludit, & pullos educat. Laqueis capitur circa nidum extenſis.

4. MERGO minore — Lat. *Mergus minor;* Briſſ. Tom. VI. pag. 108. ſp. 2. — *Mergus maximus;* Klein. — *AEtyia;* Geſn. — *Cepphus;* Moehr. — *Colymbus maximus caudatus;* Willugh. & Raj. — *Colymbus maximus ſtellatus;* Willugh. — *Craſſitie Anatem moſchatam paululum antecellit. Lacus frequentat.*
5. MERGO di gola roſſa — Lat. *Mergus gutture rubro.* Briſſ. Tom. VI. pag. 111. ſp. 3. — *Mergus roſtro nigro, capite & lateribus colli plumbeis, cervice & lateribus thoracis nigris lineolis variegatis: gula cum inferiori collo rubris; internis digitis lobus anguſtus additus;* Klein. — *Anatem domeſticam craſſitie paululum antecellit. Habitat in Mari Septentrionali. Supra loca paululum excelſa in fluminibus poſita nidificat, & ova ſolummodo bina ponit.*
6. MERGO di gola nera — Lat. *Mergus gutture nigro;* Briſſ. Tom. VI. pag. 115. ſp. 4. — *Mergus Arcticus ſimplici-*

ſpliciter; Klein. — *Colymbus Arcticus* Lumme *Wormio dictus*; Willugh. Raj. & Sibbald. — *Colymbus Arcticus Wormii & Willughby*; Rzac. — *Lumme*; Muſ. Worm. — *Singularis Hirundinis aquaticae exoticae ſpecies*; Muſ. Beſl. — *Hirundo exotica aquatica*; Ionſt. — *Colymbus Arcticus*; Linn. Syſth. Nat. Genn. 68. ſp. 1. — *Magnitudine & craſſitie praecedentem aemulatur. Habitat in Mari Septentrionali.*

γ. MERGO picchiettato — Lat. *Mergus naevius*; Briſſ. Tom. VI. pag. 117. ſp. 5. — *Colymbus maximus caudatus circa Inſulam Iarſey occiſus*; Willugh. — *Colymbus maximus caudatus alius*; Raj. — *Mergum gutture rubro paululum craſſitie ſuperat. Habitat in Mari Septentrionali.*

T. DVIII. B. 1. 1. —

MERGO-OCA, detto anche OCA MARINA — Lat. *Merganſer*; Geſn. Aldrov. Ionſt. Sibbald. Charlet. & Marſil. — *Merganſer Geſneri*: Muſ. Worm. — *Merganſer Aldrovandi*; Willugh. Raj. & Rzac. — *Mergus cirrhatus. ſive longiroſter major*; Geſn. — *Mergus cirrhatus*; Ionſt. & Barr. — *Mergus ſerratus longiroſter major Geſneri, Aldrovandi*; Raj. — *Serrator ſimpliciter*; Klein. — *Anas raucedula*; Geſn. — *Anas raucedula, ſeu Mergus raucedulus*; Aldrov — *Mergus raucedulus*; Ionſt. — *Merganſer*; Briſſ. Tom. VI. pag. 231. ſp. 1. — Gall. *L'Harle* — Angl. *Gooſander*.

TUtti gli Ueeelli di queſto genere hanno il beeco dentato a guiſa di una ſega, quaſi eilindrico, e la mandibula ſuperiore ripiegata in punta. Trovanſi alle rive del mare, dove cibanſi di peſci.

Il Maſehio e la Femmina molto fra di loro differiſcono per i eolori; onde è che Geſnero, e l'Aldrovando gli abbiano dati per diverſe ſpeeie, ehiamando la Femmina *Mergo ricciuto, o ſia di becco lungo maggiore*. Queſta varietà di eolori veggaſi appreſſo il Briſſon al luogo eitato, ed appreſſo il Willughby alla pag. 253. dalla ſua Ornitologia.

OMnes huius generis Aves roſtrum habent ſerrae inſtar denticulatum, ſubcylindraceum, mandibulamque ſuperiorem apice aduncam. Circa Maris littora verſantur, ubi piſcibus victitant.

Sexus in hac Ave coloribus mirum in modum inter ſe differunt; adeo ut Geſnerus & Aldrovandus pro diverſis ſpeciebus eos exhibuerint, Foeminam Mergum cirrhatum, ſeu longiroſtrum maiorem *appellantes. Hanc colorum varietatem vide apud Briſſoninm loco citato, & Willughbejum* Ornith. pag. 253.

T. DIX. B. 1. — —

MERGO-OCA di becco lungo col ciuffo, e petto roſſiccio. Maſchio. — Lat. *Merganſer longiroſter criſtatus criſta & pectore rufeſcente, Maſ.* — *Mergus, quem Bellonius gallice* Harle *vocat*; Ionſt. — *Mergus cirrhatus fuſcus*; Willugh. — *Mergus cirrhatus fuſcus, Anas longiroſtra Geſneri*; *Serula Venetorum*; Rzac. — *Mergus longiroſter minor*; Geſn. — *Mergus longiroſtrus*; Ionſt. — *Mergus longiroſtrus Ionſtonii*; Barr. — *Anas longiroſtra*; Geſn. — *Anas longiroſtra, ſive Mergus longiroſter*; Aldrov. — *Anas longiroſtra prima*; Schwenck. — *Anas longiroſtra ſecunda*; idem. — *Serrator cirrhatus*; Klein. — *Mergus Serrator criſta dependente, capite nigro maculis ferrugineis*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 62. ſp. 3. — *Merganſer criſtatus*; Briſſ. Tom. VI. pag. 237. ſp. 2. — Gall. *L'Harle huppé* — Angl. *Leſſer Cormorant*.

GLi Uecelli di queſta ſpeeie frequentano il Mare, i fiumi, le paludi ed i ſtagni: amano tutta via le praterie ed i luoghi ſeminati. Hanno per eoſtume d' immergerſi, e molto trattenerſi ſott' acqua; oltre di ehe ſono peritiſſimi nel nuoto; ergendo un' ala al vento, della quale ſi ſervono come di vela. Cibanſi di anguille, e di altri lubriei peſci. Nidificano negli ſeogli marittimi ſul principio della primavera, e per lo più depoſitano due, o tre uova. I loro Puleini toſto eſciti dall' uovo ſono, per quanto diceſi, così robuſti, che da loro ſteſſi ſi procaeeiano il eibo. Alcuni hanno ereduto, che queſti Uccelli non tramandino alcun ſuono di voce.

HUjuſmodi Aves verſantur in Mari, Fluminibus, ſtagnis, & Paludibus: amant tamen aprica & ſata loca. Diutiſſime in aquis, dum ſe immergunt, morantur, & ſumma natandi pollent peritia; alam namque alteram ſaepius ad ventum erigunt, & eiuſdem tanquam veli adminiculo navigant. Anguillas aliosque lubricos piſces deglutiunt. Nidificant in maritimis ſcopulis ineunte vere; ova ut plurimum bina, ternave ponunt. Pullos ab ovis excluſos, ſi matrem perdiderint, adeo validos eſſe aiunt, ut ipſi cibum ſibi comparent. Nullam eas vocem emittere nonnulli arbitrati ſunt.

T. DX. B. 1. 2. —

MERGO-OCA di becco lungo, col vertice e collo rossegiante, forse la Femmina dell' antecedente specie — Lat. *Merganser longirostер vertice & collo rubentibus: an antecedentis speciei Foemina?* Gerin. Ornith. N. 543.

T. DXI. B. — 14. —

MERGO-OCA cenerino di capo rosficcio, e di becco minore — Lat. *Merganser cinereus capite rufescente, brevirostер*; Gerin. Ornith. N. 541.

T. DXII. B. — 18. —

MERGO-OCA nero e bianco, detto volgarmente in Toscana DOMENICANO, ed altrove in Italia MERGONE, GARGANELLO, e POLONO — Lat. *Merganser superne niger, inferne albus. — Mergus alter*; Aldrov. — *Aliud Mergi genus*; Gesn. — *Anas longirostra sexta*; Schwenck. — *Merganser Leucomelanus*; Briss. Tom. VI. pag. 250. sp. 4. — Gall. *L' Harle blanc & noir. — Cum Merganser cristato crassitie circiter convenit. Habitat in Germania, ibique Piscinas frequentat.*

T. DXIII. B. — 15. —

MERGO-OCA minore altrimenti detto MONACA BIANCA, e volgarmente in Toscana SMERGO DOMENICANO minore — Lat. *Merganser minor, a quibusdam Monialis alba dictus, & vulgo in Etruria Mergus Dominicanus minor. — Mergus Rhenanus, quibusdam Monialis alba*; Ionst. & Charlet. — *Mergus major varius, vulgo Mergus Rheni, & Monialis alba*; Gesn. — *Mergus Rheni Ornithologi*; Aldrov. — *Mergus Rheni Gesnero, Aldrovando*; Willugh. & Raj. — *Mergus varius, qui Monialis fusca dicitur; Mergus Argentinensis*; Gesn. — *Mergus varius, quem circa Argentoratum Germani Monialem fuscam appellant*; Aldrov. — *Anas Albella*; Klein. — *Serrator minimus*; idem. — *Albellus aquaticus*; Aldrov. & Ionst. — *Albellus alter Aldrovandi*; Willugh. — *Mergus, Albellus, crista dependente subtus nigra, corpore albo, dorso nigro, alis variegatis*; Linn. Syst. Nat. Gen. 62. sp. 4. — *Merganser cristatus minor, sive Albellus*; Briss. Tom. VI. pag. 243. sp. 3. — Gall. *Le petit Harle hupé, ou la Piette* — Angl. *White Nun-diver — Juxta Maris littora versatur; fluviosque & piscinas frequentat, piscibus & insectis aquaticis vescitur.*

T. DXIV. B. — 13. 1.

MERGO-OCA minore, Femmina dell'antecedente specie — Lat. *Merganser minor, antecedentis speciei Foemina*; Gerin. Ornith. N. 540. — *Merganser cristatus minor, sive Albellus, Foemina*; Briss. Tom. VI. pag. 243. sp. 3. — *Foemina a Mare discrepat, quod crista, & macula per oculos nigroviridescente non donatur.*

8. MERGO-OCA nero — Lat. *Merganser niger*; Briss. Tom. VI. pag. 251. sp. 5. — *Mergus niger*; Gesn. Aldrov. & Ionst. — *Mergus niger Ionstonii*; Barr. — *Anas longirostra tertia*; Schwenck. — *Magnitudine & crassitie Anatem domesticam circiter aemulatur. Habitat in Germania, ibique flumina & piscinas frequentat.*
9. MERGO-OCA stellato — Lat. *Merganser stellatus*; Briss. Tom. VI. pag. 252. sp. 6. — *Mergus albus*; Gesn. Aldrov. & Ionst. — *Alterum Mergi varii genus*; Gesn. — *Tertium Mergi varii genus, seu Mergus Glacialis*; Aldrov. — *Mergus glacialis*; Ionst. Willugh. Charlet. & Raj. — *Anas stellata*; Klein. — *Mergus capite griseo laevi: Mergus minutus*; Linn. Syst. Nat. Gen. 62. sp. 5. — *Cum Querquedula crassitie circiter convenit. Fluvios & piscinas frequentat.*
10. MERGO-OCA cenerino — Lat. *Merganser cinereus*; Briss. Tom. VI. pag. 255. sp. 7. — *Mergus vertice & collo rubentibus*; Barr. — *Mergus ruber*; Gesn. Aldrov. Ionst. & Charlet. — *Castor seu Fiber Bellonii*; Aldrov. — *Crassitie Anatem domesticam paululum antecellit. Piscibus vescitur. Fluvios, piscinasque frequentat.*
11. MERGO-OCA col ciuffo della Virginia — Lat. *Merganser Virginianus cristatus*; Briss. Tom. VI. pag. 258. sp. 8. — *Serratur cucullatus*; Klein. — *Mergus crista globosa utrinque alba, corpore supra fusco, subtus albo, Mergus cucullatus*; Linn. Syst. Nat. Gen. 62. sp. 1. — *Anati domesticae paululum crassitie cedit. Habitat in Virginia, Carolina, & Mexico, ubi flumina & stagna frequentat.*

T. DXV. B. 1. 12. —

SULA dell' Iſola di Baſſa, altrimenti OCA BASSANA — Lat. *Sula aliis Anſer Baſſanus*. — *Sula Hoieri*; Cluſ. — *Sula Hoieri, Cluſii*; Willugh. & Raj. — *Anſer cinereus, oblongo craſſoque capite*; Barr. — *Anſer Baſſanus ſive Scoticus*; Geſn. Aldrov. & Ionſt. — *Anſer Baſſanus vel Scoticus*; Geſn. — *Anſer Baſſanus*; Willugh. Raj. Charlet. & Sibbald. — *Plancus Anſer Baſſanus*; Klein. — *Graculus*; Moher; — *Pelecanus cauda cuneiformi, roſtro ſerrato; remigibus primioribus nigris Baſſanus*; Linn. Siſth. Nat. Gen. 66. ſp. 4. — *Sula Baſſana*; Briſſ. Tom. VI. pag. 503. ſp. 5. — Gall. *le Fou de Baſſan*. — Angl. *Soland Gooſe*.

IL ſoggiorno di queſt' Uccello in tempo di eſtate è l'Iſola di Baſſa, onde ha ottenuto il nome di Oca Baſſana; ivi nidifica nelle Rupi, e traſporta al luogo del ſuo nido tanto legname per coſtruirvelo, che in queſta parte ne rimangono abbondantemente provveduti per tutto l'anno quegl' Iſolani. Manda fuori le Uova premendole con un piede ſovrapoſto all'altro. Nutriſce i ſuoi Pulcini con i peſci più delicati; e tanta abbondanza di Peſci vien rigettata da queſti Uccelli, che i Preſidiarj del Luogo gli raccolgono, e ſe ne cibano.

SUla Baſſana in Inſula ciuſdem nominis habitat aeſtate; ibique in rupibus nidulatur, & in conſtruendo nido tantam lignorum copiam adportat, ut auferentibus, qui illic habitant, habunde in annum ex ea parte proſpectum ſit. Ova pede ſuper alterum poſito excludit. Pullos delicatiſſimis piſcibus nutricat. Tanta autem ab his Avibus piſcium evomitur copia, ut & Praeſidiariis Oppidi in cibum cedant.

2. SULA comune — Lat. *Sula vulgaris* — *Anſeri Baſſano congener fuſca Avis*; Sloane — *Mergus Americanus fuſcus, ſtultus vulgo dictus*, Barr. — *Anas anguſtiroſtra, ſtultus vulgo dicta*; idem. — *Plancus Morus ſimpliciter*; Klein. — *Pelecanus cauda cuneiformi, roſtro ſerrato, remigibus omnibus nigris. Piſcator*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 66. ſp. 5. — *Sula*; Briſſ. Tom. VI. pag. 495. ſp. 1. — *In Africa & America maris littora frequentat. Longe etiam a littoribus quandoque diſcedit. Sulae Characteres ſunt: digiti quatuor, omnes membranis integris inter ſe connexi: crura circa corpus medium, & extra abdomen poſita, corpore breviora: roſtrum rectum, conicum, apice adunc um. In pleriſque huius generis Avibus mandibula ſuperior pluribus conflatur partibus prope caput ſimul iunctis, quibus ope oris rictus fit valde intenſus, Pleraeque Aves iſtae roſtro quoque donantur ad margines minute, & haud multum conſpicue denticulato. Naribus conſpicuis carent; ſed earum loco in utroque mandibulae ſuperioris latere ſulcus extat per totam fere illius longitudinem productus. Ipſarum lingua valde brevis eſt. Trium digitorum anticorum medii unguis eſt interius ſerrae inſtar denticulatus.*

3. SULA maggiore — Lat. *Sula major*; Briſs. Tom. VI. pag. 497. ſp. 2. — *Plancus congener Anſeri Baſſano*; Klein. — *Magnitudine & craſſitie Anſerem circiter aemulatur. In Florida maris littora frequentat; juxta majorum fluminum oſtia quoque verſatur.*

4. SULA ſcura — Lat. *Sula Fuſca*; Briſſ. Tom. VI. pag. 499. ſp. 3. — *Larus piſcator cinereus*; Barr. — *Anſeri Baſſano congener, Avis cinereo-albus*; Sloane. — *Anſeri Baſſano affinis. Avis cinereo-alba*; Raj. — *Craſſitie Anatem domeſticam non multum antecellit. Habitat in Africa & America.*

5. SULA bianca — Lat. *Sula alba* — *Sula candida*; Briſſ. Tom. VI. pag. 501. ſp. 4. — *Circa Africae & Americae maris littora verſatur.*

T. DXVI. B. 1. 11. —

FETONTE, altrimenti UCCELLO DE' TROPICI — Lat. *Phaethon, ſive avis Tropicorum* — *Avis Tropicorum* Willugh. — *Plancus Tropicus*; Klein. — *Avis Tropicorum noſtratibus Nautis*; Raj. — *Lepturus*; Moehr. & Briſſ. Tom. VI. pag. 480. ſp. 1. — *Phaethon rectricibus duabus longiſſimis, roſtro ſerrato, digito poſtico adnato*; *Phaethon aethereus*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 67. ſp. 1. — Gall. *Fetu en cul ou Oiſeau du Tropic.* — Angl. *Tropick Bird.*

QUeſt' Uccello chiamaſi Uccello de' Tropici, perchè abita fra i due Tropici, nè altrove ritrovaſi. I ſuoi Caratteri ſono, quattro dita tutte fra loro collegate con membrane intiere: le gambe nel inferior parte ſpogliate di piume, poſte circa la metà del corpo fuori dell' addome, e più corte del corpo ſteſſo; il

AVis haec Tropicorum dicitur, quia binos inter Tropicos habitat, nec alibi invenitur. Ejus ſunt characteres: digiti quatuor, omnes membranis integris inter ſe connexi: crura in infima parte plumis denudata, circa corpus medium & extra abdomen poſita, corpore breviora: roſtrum acutum, deorſum modice inflexum, &

il becco acuto, ed alquanto al di ſotto inſenſibilmente incurvato. ed ai margini minutamente dentato; e due rettrici lunghiſſime.

& ad margines minute denticulatum: rectrices binae longiſſimae.

2. FETONTE bianco — Lat. *Phoethon albus — Lepturus candidus* Briſſ. Tom. VI. pag. 485. ſp. 2. — *Columbam Romanam craſſitie circiter aequat. Praecedentis inſtar inter binos Tropicos habitat.*
3. FETONTE roſſiccio — *Phoethon fulvus — Lepturus fulvus* Briſſ. Tom. VI. pag. 489. ſp. 3. — *Praecedenti multum craſſitie cedit. Binos inter Tropicos ſimiliter habitat.*

T. DXVII. B. — 9. —

COLIMBO minore detto volgarmente in Toſcana TUFFETTO o TUFFOLINO — Lat. *Colymbus minor* Geſn. Aldrov. Ionſt. Charlet. & Klein. — *Colymbus, ſive Podicipes minor* Willugh. Raj. Sibbald. Sloan. & Marſil. — *Colymbus minor pullus, digitis inferne connexis, ſuperne marginatis*; Browne — *Colymbus auritus pedibus lobatis, capite nigro, auribus criſtato ferrugineis;* Linn. Syſt. Nat. Gen. 68. ſp. 3. — *Colymbus cornutus minor*; Briſſ. Tom. VI. pag. 50. ſp. 5. — Gall. *La Petite Grebe cornue* — Angl. *Didapper*:

SCrive il Bellonio che il Colimbo minore cibaſi volentieri di peſci; ma il Willughby avendo aperto il ventricolo di uno di queſti uccelli lo ritrovò pieno di gramigna e di altre erbe. Egli ha il dito poſteriore piccolo con membrana ſmerlata da ambe le parti a foggia di penna, e le coſce muſcoloſe e robuſte, coll'ajuto delle quali nuota velociſſimamente, ſcorrendo la ſuperficie dell'acqua, o immergendoſi fino al fondo; tuttavìa per la conformazione delle ſue parti, più facilmente ſembra che poſſa muoverſi ſott'acqua, che nella ſuperficie di eſſa, o ſopra terra. Suole con ſtento levarſi a volo dall'acqua, ma levato che ſia in aria può lungo tempo continuare nel ſuo volo. Circa a mezzo Agoſto, atteſa la muta delle penne, non ha forze baſtanti per volare. Riferiſce Oppiano che i Colimbi ſempre nuotano, e che mai non vengono a terra, neppure per ragione di prender ripoſo e cibarſi ſennonchè nel tempo del loro parto, e che i medeſimi nuotano contro vento per non eſſere dalla forza di queſto alcuna volta involontariamente traſportati nel continente.

COlymbum minorem piſcibus libentiſſime veſci ſcribit Bellonius; at Willughbeius illius ventriculum diſſectum gramine aliiſque herbis repletum invenit. Poſticum habet digitum parvum, utrinque membrana pinnata circumdatum, & femora valida, muſculoſa, quorum ope celerrime natat, & vel fundum, vel ſuperficiem aquae petit. Ex partium conſtitutione multo facilius ſub aquis, quam in earum ſuperficie vel ſuper terram movetur. Egre ab aquis ſe levat, ſed quando in aere eſt, volatum diu continuare poteſt. Circa medium Auguſtum propter pennarum mutationem volare nequit. Refert Oppianus, Colymbos ſemper natare, & ne ſomni quidem, vel cibi gratia in continentem exire, niſi partus tempore; eoſdem adverſus ventis natare, ne illorum vi aliquando inviti in terram extrudantur.

T. DXVIII. B. — 10. —

COLIMBO maggiore cenerino — Lat. *Colymbus an cinereus major?* Raj. — *An Colymbus, ſeu Podicipes cinereus D. Brown?* Willugh. — *Avis haec vulgari Colymbo tam criſtato, quam non criſtato differt colore corporis cinereo, eſtque apud nos rarior multo. Icon tranſmiſſa plumas in vertice extantes exhibet, criſtam aemulantes.* Willugh. Ornith. §. IV. pag. 257.

T. DXIX. B. — 8. 2.

COLIMBO minore nero e roſſo, volgarmente TUFFETTO roſſo — Lat. *Colymbus minor ex nigro & rubro infectus*; Gerin. Ornith. N. 548.

T. DXX.

T. DXX. B. — 16. —

COLIMBO minore con pennacchio dietro all'occhio, volgarmente detto SUASSO TURCO. — Lat. *Colymbus auritus, & cornutus minor*; Edward. Tab. 145. — *Colymbus minor alius*; Aldrov. — *Alterum Merguli genus*; Gesn. — *Mergulus niger*; idem. — *Mergulus*; Schwenck. — *Mergulus niger Schwenckfeldii, seu Colymbus minor*; Rzac. — *Colymbus auritus pedibus lobatis, capite nigro, auribus crista to ferrugineis*; Linn. Syst. Nat. Gen. 68. sp. 3. — *Colymbus auritus*; Briss. Tom. VI. pag. 54. sp. 6. — Gall. *la Grebe a oreilles*.

I Colimbi di questa specie abitano egualmente le acque dolci che le marittime. In qualunque tempo del Anno sieno presi e mangiati, sempre hanno un sapor salvatico poco grato, benchè nell'inverno sieno molto pingui; nella quale stagione ancora se ne veggono in maggior numero. Abitando essi continuamente nell'acqua sono stati dalla natura muniti di una piuma molto morvida e densa. Aprendosi il loro ventricolo, trovasi sempre pieno di ogni genere di pesci; mentre di questi comunemente si cibano, e qualche volta di semi di erbe; questi ultimi però mangiano di mala voglia, e quando vi sono forzati dalla fame e dalla mancanza di altro cibo.

Nidificano vicino a terra in qualche cespuglio palustre, e costituiscono il loro nido in maniera, che non sia cosa si facile il rinvenirlo.

Colymbus auritus in aquis salsis & dulcibus sine discrimine degit. Quocunque anni tempore capiatur, atque comedatur, ferini nescio quid ingrati resipit, licet hiberno tempore admodum sit pinguis: quo etiam tempore majori numero adparet. Cum perpetuo in aquis degat, natura eum adversus frigoris iniuriam plumis mollibus densisque munivit. Si quis illius dissecet ventriculum omni piscicolorum genere refertum inveniet; piscibus enim victitat; invitus autem, & nonnisi alterius cibi inopia & famis incitamento herbarum seminibus nutritur.

Prope terram nidificat in cespite aliquo palustri, nidumque non facile inveniendum construit.

T. DXXI. B. 1. 2. 1.

COLIMBO crestato maggiore altrimenti SUASSO comune Maschio — Lat. *Colymbus major cristatus*; Aldrov. Willugh. Klein. Rzac. & Marsil. — *Colymbus major Bellonii*; Ionst. — *Uria Bellonii*; Aldrov. — *Colymbus subtus albus, superne fuscus, rostro & pedibus virescentibus*; Barr. — *Avis quaedam, Anate paulo major, mergendo victum querens*; Charlet. — *Colymbus cristatus*; Briss. Tom. VI. pag. 38. sp. 2. — Gall. *la Grebe hupée* — Angl. *Great.-Diver.* — *Avis haec semper in mediis lacubus natando, & urinando versatur. Vocem habet horridam sed ad sui tutelam utilem.*

T. DXXII. B. — 18. —

COLIMBO crestato maggiore, volgarmente SUASSO comune, Femmina — Lat. *Colymbus cristatus major, Foemina*; Gerin. Ornith. N. 552. — *Haec apud Blentinensem Lacum in Etruria frequens, ubi vulgo* Astrolaga *nuncupatur. Credimus Brissonium sexum non animadvertentem dissimilem hujus speciem effor-masse sub titulo Colymbi cornuti* Tom. VI. pag. 45. sp. 4.

T. DXXIII. B. — 13. 1.

COLIMBO giovane dell'antidetta specie — Lat. *Colymbus superioris speciei, sed adhuc ob aetatem non consuetis pennis obductus*; Gerin. Ornith. N. 551.

I Caratteri, onde dagli Ornitologi vengono distinti i Colimbi, sono quattro dita, tre cioè anteriori collegate fra di loro con membrane fesse fino al mezzo, ed uno posteriore libero: le gambe poste all'ano, e nascoste dentro l'addome, il becco dritto ed acuto.

Characteres, quibus ab Ornithologis distinguntur Colymbi, sunt digiti quatuor, tres scilicet anteriores membranis semifissis inter se connexi, posticus solutus: Crura ad podicem posita, & intra abdomen condita: rostrum rectum, acutum.

Tut-

Om-

Tutti gli Uccelli di queſto genere ſono privi di coda, ed hanno i piedi lateralmente molto piatti: le cui ſquamme, dalle quali vengono ricoperti, formano nella parte poſteriore una doppia ſerie di denti eguali a quelli di una ſega. L'unghie poi ſono ancor eſſe piane e ſimili a quelle dell'Uomo.

Omnes hujus generis Aves cauda carent. Ipſarum pedes ſunt lateraliter valde plani; & ſquamae, quibus cooperiuntur, in ipſorum poſteriore parte duplicem dentium effformant ſeriem, ſerrae denticulorum aemulorum. Ungues ſunt quoque plani, & unguibus humanis ſimiles.

8. Colimbo di Fiume — Lat. *Colymbus Fluviatilis*, — Briſſ. Tom. VI. pag. 59. ſp. 9. — *Colymbus cinereus, roſtro & pedibus nigris*. Barr. — *Pullum Gallinaceum minorem craſſitie circiter aequat. Flumina, piſcinaſque frequentat. Huius eſt varietas Colymbus fluviatilis nigricans eiuſdem Briſſonii* ibidem pag. 62. var. A.
9. Colimbo dell'Iſola di S. Tommaſo — Lat. *Colymbus Inſulae S. Thomae*; Briſſ. Tom. VI. pag. 58. ſp. 8. — *Craſſitie Gallinam juniorem adaequat. Habitat in Inſula S. Thomae in America.*
10. Colimbo di Fiume della Carolina — Lat. *Colymbus Fluviatilis Carolinenſis*; Briſſ. Tom. VI. pag. 63. ſp. 10. — *Colymbus pedibus lobatis, corpore fuſco, roſtro faſcia ſeſquialtera. Podiceps*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 68. ſp. 4. — *Colymbus fuſcus*; Klein. — *Habitat in Carolina, ibique piſcinas frequentat.*
11. Colimbo di Fiume dell'Iſola di S. Domingo — Lat. *Colymbus fluviatilis Dominicenſis*; Briſſ. Tom. VI. pag. 64 ſp. 11. — *Colymbo fluviatili noſtrati multum craſſitie cedit. Habitat in Dominicenſi Inſula.*

T. DXXIV. B. — 16. —

FOLAGA maggiore detta dai Franceſi DIAVOLO di MARE — Lat. *Fulica maior, quam Galli Diabulum Marinum appellant — Fulica maior*; Briſſ. Tom. VI. pag. 28. ſp. 2. — *Alia Fulicae ſpecies, quam Galli* Macroule, vel Diable de Mer *appellant*; Aldrov. — *Fulica, quam Pariſienſes* Diabolum Marinum *vocant*. Ionſt. — *Fulica maior Bellonii*; Willugh. Raj. & Klein. — *Fulica craſſo corpore, aterrima*; Barr. — *Fulica aterrima*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 71. ſp. 2. — Gall. *la grande Foulque, ou la Macroule, ou Diable de Mer* — Angl. *Bald. Coot.*

La Folaga maggiore detta dai Franceſi *Diavolo di Mare* ha per coſtume di ſempre immergerſi nelle acque dolci, ed è di un colore così elegantemente nero, che ſembra eſſerle ſopra ſtato diſteſo col pennello. La macchia bianca ch'ella ha nel capo, è più larga, che quella della Folaga comune, ed è ancora alquanto più groſſa di queſta: Per ragione dell'oſcuriſſimo colore delle ſue penne ha ottenuto appreſſo i Franceſi, il nome di *Diavolo di Mare*.

Aquis ſeſe dulcibus ſemper immergit, & colore eſt tam exquiſite nigro, ut penicillo inductus ei videatur. Alba capitis macula latior eſt quam in Fulica communi; imo et paulo major corpore eſt. Ex ſuo pennarum aterrimo colore Diaboli Marini nomen apud Gallos obtinuit.

T. DXXV. B. — 13. —

FOLAGA comune — Lat. *Fulica vulgaris — Fulica nigricans, ſincipite glabro*; Barr. — *Fulica*; Geſn. Aldrov. Schwenck. Ionſt. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Proſp. Alp. Marſil. Moehr. & Briſſ. Tom. VI. pag. 23. ſp. 1. — *Fulica Recentiorum*; Klein. — *Fulica, Fulix Latinis*; Muſ. Worm. — *Fulica, ſive Fulix*; *Phalaris Varroni*; *Mergus niger Alberto M.* Rzac. — *Phalaris*; Geſn. Aldrov. & Ionſt. — *Fulica atra, fronte calva, corpore nigro, digitis lobatis*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 82. ſp. 1. — Gall. *la Foulque, ou Morelle* — Angl. *Bald Coot.*

Le Folaghe ſi raggirano nei luoghi paluſtri e ſtagnanti, e particolarmente frequentano i Fiumi. Rare volte ſi poſano ſugl' Alberi. Cibanſi di erbe e di ogni genere di ſemi. Partoriſcono nella ſtate delle uova eguali in groſſezza a quelle di Gallina. Il loro nido coſtruito di foglie di gramigna canne ec. va galleggiando

Fulicae paluſtribus & ſtagnantibus locis, & precipue fluminibus delectantur. Raro Arboribus inſident. Herbis & quovis ſeminum genere veſcuntur. Ova ponunt aeſtate magnitudine Ovorum Gallinaceorum. Ipſarum nidus, qui quidem graminis, arundinum &c. foliis conflatur, in ſummis aquis fluitat, ut una cum aqua attollatur, vel ſubſi-

do alla ſuperficie delle acque, e rimane a ſeconda di queſte: ma nel tempo ſteſſo è ſoſtenuto dalle canne, acciò non venga via traſportato dalla rapidità del Fiume.

Tutti gli Uccelli di queſto genere hanno quattro dita, tre anteriori, ed uno poſteriore, ricreſciuti per tutta la lunghezza da membrane feſſe e ſmarginate: il becco di figura conica, e lateralmente compreſſo: la fronte calva, e coperta di una membrana calloſa: e le gambe nell' inferior parte ſpogliate di piume.

ſubſidat, eumque arundines ſiſtunt, ne cum flumine devehatur.

Omnes huius Generis Aves digitos habent quatuor, tres anticos, poſticum unum, per totam longitudinem membranis ſiſſis, emarginatis auctos; roſtrum conicum, lateraliter compreſſum; frontem plumis denudatum, & craſſiſſima membrana obductam; crura inferiore parte plumis quoque denudata.

3. Folaga del Meſſico — Lat. *Fulica Mexicana; Briſſ.* Tom. VI. pag. 31. ſp. 3. — *Fulicae Mexicanae altera ſpecies*; Raj. — *Magnitudine & craſſitie Fulicam majorem primam circiter aemulatur, & cum illa forma convenit. Habitat in Mexico.*

T. DXXVI. B. — 9. 1.

GABBIANO Corallino-Cenerino — Lat. *Larus cinereus roſtro & pedibus rubris*; Gerin. Ornith. Num. 556. — *Larus cinereus alter, roſtro & pedibus rubris*; Aldrov. Rzac. & Raj. — *Larus cinereus Ornithologi, Aldrovandi*: Willugh. — *Larus cinereus tertius*; Jonſt. — *Larus major cinereus*; Schwenck. — *Cephus Turneri*; Geſn. — *Pipixcan, ſeu Avis furax*; Fern. — *Larus Gavia ridibunda phoenicopos*; Briſſ. Tom. VI. pag. 196. ſp. 14. — Gall. *La Mouette rieuſe a pattes rouges* — Angl. *Black-Cap.*

I Gabbiani ſono caratterizzati da quattro dita, tre anteriori collegate fra di loro con membrane intiere, ed uno poſteriore ſciolto: dalle gambe poſte circa la metà del corpo, fuori dell' addome, e più corte del corpo medeſimo; dal becco ſenza dentatura, lateralmente compreſſo, e ripiegato verſo la punta; dalla mandibula inferiore per di ſotto angolare, e dalla parte infima delle gambe ſpogliata di piume. Il Gabbiano, che viene quì da noi rappreſentato è diſtinto dal Briſſon coll' aggiunto di *ridibondo*, e ciò perchè colla ſua voce ſembra in certa maniera, che contraffaccia il riſo umano. Raggiraſi intorno ai Lidi del Mare, e frequenta anche i Fiumi, e le peſchiere.

Omnium hujus Generis Avium character eſt: digiti quatuor, tres ſcilicet antici membranis integris inter ſe connexi, poſticus ſolutus; crura circa corpus medium, & extra abdomen poſita, corpore breviora; roſtrum edentulum lateraliter compreſſum, verſus apicem aduncum: mandibula inferior infra anguloſa: pars crurum infima plumis denudata. Larus hic a Briſſonio ridibundus dicitur, quia voce humanum riſum quodammodo aemulatur. Juxta Maris littora verſatur, & flumina piſcinaſque frequentat.

T. DXXVII. B. — 11. 2.

GABBIANO detto volgarmente Moretta, ed anche Maschera Corallina — Lat: *Larus cinereus capite ex virdi nigricante, roſtro & pedibus rubris*; Nobis — *Larus minor, capite nigro, roſtro rubro*; Klein. — *Larus major cinereus Baltneri*; Raj. & Willugh. — *Larus major cinereus Baltneri apud Willugh.* — *Gavia piſcator*; Rzac. — *Larus albus, capite, alarumque apicibus nigris, roſtro rubro. Atricilla*. Linn. Syſth. Nat. Gen. 96. ſp. 5. — *Larus Gavia ridibunda*; Briſſ. Tom. VI. pag. 192. ſp. 13. — *Gall. La Mouette rieuſe* — Angl. *Laughing Gull.* — *Foemina hujus ſpeciei a maſculo diſcrepat capite cinereo non ita ſaturate tincto, & parte capitis anteriore, guttureque albo maculatis.*

T. DXXVIII. B. — 13. 1

GABBIANO detto Corallina Cenerina ſpruzzata — Lat. *Larus cinereus pedibus rubris, roſtro ex nigro rubroque maculato.* Nobis. — *Adeſt error in Tabula ubi legitur* Gabbiano detto volgarmente Moretta — Lat. *Larus*

Larus cinereus capite ex viridi nigricante: Avis enim illa tantummodo ſub hoc nomine hic illi impoſito agnoſcatur, & ipſemet lector errorem benigniſſime corrigat.

T. DXXIX. B. — 13. 1.

GABBIANO detto volgarmente TERRAGNOLA, e GALETRA — Lat. *Larus maxima ex parte albicans, remigibus extimis, nec non extremitate rectricum terreo ac ferme nigro colore infectis, roſtro vero toto ac pedibus fuſcis*; Nobis. — *Larus cinereus Bellonii*; Willugh. & Raj. — *Larus cinereus Piſcator* Sibbald. — *Larus cinereus major Bellonii*; *Hirundo marina*; *Vultur piſcarius*; *Gyr-falco marinus aliquibus dictus*; Marſil. — *Larus albo cinerous torque cinereo*; Aldrov. & Willugh. — *Larus albus*; Jonſt. — *Larus Gavia cinerea naevia*; Briſſ. Tom. VI. pag. 185 ſp. 11. — Gall. *La Mouette cendrée tachetée*.

IL Gabbiano frequenta gli Stagni, i Fiumi, ed i Luoghi marittimi, quando particolarmente ſia inſorta qualche gran tempeſta. Oltre di Peſci ſi ciba ancora di Lombrichi, e di Chiocciole, ch' egli ſcaglia, dopo averne fatta preda, ſopra dei ſaſſi, come ancora di Cavallette, e Falangi, o ſieno Tarantole, dalle quali ripurga le Campagne Tarentine. Avidamente anche ſi paſce dei Delfini traſportati al lido dalla tempeſta. Coſtruiſce il ſuo nido negli ſcogli marini, ed in quelli particolarmente donde ſcaturiſce qualche vena di acqua bevibile, e vi depone in tempo di Eſtate due o tre Uova. Il ſuo volo è precipitoſo, facile, e leggiero.

FRequens Larus in ſtagnis, fluminibus, & maritimis locis, praecipue cum ingens aliqua tempeſtas ſuborta eſt, conſpicitur. Praeter piſces lumbricis etiam, cochleis, quas ſurſum raptas ad ſaxa demiſſas confingit, locuſtis, & phalangiis, a quibus Tarentinos agros repurgat libenter veſcitur. Delphinos etiam in littora dejectos devorat. Nidulatur in ſaxis maritimis, in iis ſignanter a quibus potabilis aqua manat, & bina, ternave ova aeſtate parit. Volatum habet praecipitem, facilem, levemque.

T. DXXX. B. — 13. 1.

GABBIANO detto ZAFFERANO cenerino, e in qualche luogo d' Italia GAVINA — Lat. *Larus cinereus roſtri extremitate, & pedibus croceis*; Nobis. — *Larus cinereus*; Geſn. — *Larus cinereus major*; Aldrov. — *Larus cinereus primus*: Jonſt. & Barr. — *Larus cinereus, ſeu Gavia cinerea Aldrovandi*; *Hirundo marina Geſneri*; Rzac. — *Larus albus major*; Aldrov. — *Larus albus major Bellonii*; Willugh. & Raj. — *Larus major albus*; Sibbald. — *Larus marinus albus*; Geſn. — *Larus marinus*; Rzac. — *Larus Gavia cinerea minor*; Briſſ. Tom. VI. pag. 178. ſp. 9 — Gall. *La petite Mouette cendrée* Angl. *Secob*.

QUeſti Uccelli ſono molto frequenti nel Genoveſato, dove apportano grandiſſimo pregiudizio agli Ulivi; imperciocchè quando ſotto all' inverno cadono da tali alberi i frutti, o ſieno le ulive, eſſi vi ſi riducono in gran numero dal vicino mare, a ſegno che i Contadini con degli ſchiamazzi, e con delle ſcariche di archibuſi appena poſſono difendere le proprie poſſeſſioni dalle loro rapine. Eſſi ſono Uccelli voraciſſimi e rapaciſſimi, ed avidi particolarmente di peſci, onde neppure hanno timore delle tempeſte; anzi ſi rallegrano nel ſuſcitarſi che queſte fanno, forſe perchè in tal tempo più facilmente ſi porge loro la maniera di predare dei peſci: ſono velociſſimi nel nuoto, nè in ciò vi è altro Uccello, che poſſa con loro paragonarſi, e queſto forſe per la leggerezza del loro corpo.

HUjuſmodi Aves in Liguria admodum frequentes ſunt, ubi maxime Oleis perniciem afferunt: nam ſub hyeme cum Olearum baccae ex arboribus decidunt, magnus earum numerus a proximo Mari illuc ita devolat, ut Ruſtici vix ingenti clamore & ſcloporum etiam exploſionibus ſua rura ab illarum rapinis tueri queant. Sunt enim inſigniter voraces & rapaces Aves, piſciumque praeſertim avidae; quare nec tempeſtates horrent, ſed iis obortis ſummopere laetantur, forte quod tunc facilius piſces captent. Velociſſimae in natando ſunt, nec altera adeſt Avis, quae cum eis in natatu contendere valeat, forte propter corporis earundem levitatem.

T. DXXXI. B. — 15.

GABBIANO detto volgarmente in Toſcana MEZZA MOSCA — Lat. *Larus ex cinereo, albo, fuſco, & nigricante inſectus & maculatus, vulgo in Etruria Mezza Moſca dictus*, Gerin. Ornith. Num. 566. — *Larus cinereus major*; Willugh. Raj. Sibbald. Charlet. & Klein — *Larus Gavia cinerea major*; Briſſ. Tom. VI. pag. 182. ſp. 10. — *Gall. la grande Mouette cendrée* — Angl. *Common ſea Mew*, ovvero *Leſſer Grey Gull.* — *Larum cinereum vulgo in Italia* Gavina *paululum craſſitie ſuperat; Flumina, Maria, Piſcinaſque frequentat*,

T. DXXXII. B. — 16. 2.

GABBIANO detto ZAFFERANO MEZZO MORO — Lat. *Larus candidus, dorſo, ac remigibus uſque ad apicem nigris, roſtro, pedibuſque flavis*; Nobis. — *Larus ingens marinus*; Clus. — *Larus maximus ex albo & nigro, ſeu caeruleo nigricante varius*; Willugh. & Sibbald. — *Larus maximus ex albo & nigro, ſeu ceruleo nigricante varius Willughbeii*. Klein. — *Larus marinus albus, dorſo nigro*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 69. ſp. 3. — *Larus niger*; Briſſ. Tom. VI. pag. 158. ſp. 1. — Gall. *le Goiland noir* — Angl. *Great Black, and White Gull.* — *Larorum omnium ſpecies haec major & craſſiſſima eſt, & juxta Maris littora verſatur*.

T. DXXXIII. B. 1. — —

GABBIANO REALE, o ſia MARINO PESCATORE, *volgarmente appreſſo di noi* ZAFFERANO CENERINO — Lat. *Larus cinereus maximus, Marinarius Piſcator*; Marſil. — *Larus cinereus maximus*; Iloane. Willugh. Raj. & Sibbald. — *Plautus Proconſul*; Klein. — *Larus albus, dorſo fuſco. Larus fuſcus*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 69. ſp. 4. — *Larus griſeus*; Briſſ. Tom. VI. pag. 162. ſp. 3. — Gall. *le Goiland gris* — Angl. *Herring Gull.* — *Cum Anate domeſtica craſſitie circiter convenit. Juxta Maris littora, & Lacuum ripas verſatur, Apud Danubium in Germania frequens*.

T. DXXXIV. B. 1. 12. —

GABBIANO picchiettato, volgarmente MOSCATONE — Lat. *Larus univerſo corpore maculis muſcas ferme referentibus & fuſcis variegatus*; Nobis. — *Larus*; Ionſt. — *Larus minor*; Aldrov. — *Larus major Aldrovandi, hybernus Baltneri*; Raj. — *Larus major Aldrovandi, Larus hybernus Leonardi Larus major Aldrovandi, hybernus Baltneri*; Willugh. — *Larus griſeus maximus*; Klein. — *Larus cinereus major*; Charlet. — *Skua*; Clus. Ionſt. & Willugh. — *Larus varius ſive Skua*; Briſſ. Tom. VI. pag. 167. ſp. 5. — Gall. *le Goiland varié, ou le Griſard.* — Angl. *Great Grey Gull.* — *Poſterior hujus Lari digitus ſatis conſpicuus eſt, ungue etiam armatus, Maris littora frequentat*.

T. DXXXV. B. — 12. —

GABBIANO volgarmente GUAIRO, forſe lo ſteſſo detto da alcuni GABBIANO D' INVERNO — Lat. *Larus noſtratibus vulgo* Guairo, *a nonnullis forte Larus hybernus — Larus fuſcus ſeu hybernus*; Willugh. & Raj. — *Larus hybernus*; Klein. — *Larus albicans, dorſo caneſcente, rectricibus, excepto extimo nigris, pedibus tridactylis*; *Larus tridactylus*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 69. ſp. 1. — *Larus Gavia hyberna*; Briſſ. Tom. VI. pag. 189. ſp. 12. — Gall. *la Mouette d' Hyver* — Angl. *Winter Mew.* — *Prata humida, paludeſque frequentat, & juxta fluviorum ripas verſatur*,

11. GABBIANO d' America — Lat. *Larus Americanus* — *Larus Americanus minor ſtolidus, corpore fuſco rubente, vertice albo*; Sloane & Raj. — *Larus Americanus, caſtaneus, capite albo*; Barr. — *Larus Gavia fuſca*. Briſſ. Tom. VI. pag. 199. ſp. 15. — *Habitat in America ſeptentrionali. Mare frequentat; quandoque procul a littore diſcedit; &: Piſcibus victitat*.

12. GABBIANO dell' Iſola di S. Domingo — Lat. *Larus Dominicenſis* — *Gavia ridibunda*; Briſſ. Tom. VI. pag. 192. ſp. 13. — *Habitat in Dominicenſi Inſula; ibique juxta Maris littora verſatur*.

T. DXXXVI. B. — 16. 2.

PUFFINO, altrimenti PROCELLARIA EQUINOZIALE, e volgarmente BERTA maggiore — Lat. *Puffinus, ſive Procellaria Aequinotialis* — *Puffinus* Ionſt. — *Puffinus Anglorum*; Willugh. Raj. & Sibbald. — *Larus piger, cunicularis*; Klein. — *Sterna media, dorſo fuſco, ventre, uropygio, & fronte albidis*; Browne. — *Diomedea Avis*; Geſn. — *Avis Diomedea*; Aldrov. Ionſt. Willugh. & Charlet. — *Avis Diomedea Aldrovandi & Geſneri*; Raj. — *Shear-Water, id eſt Aquae ſuperſi-*

perſiciem radens; Raj. & Willugh. — *Puffinus*; Briſſ. Tom. VI. pag. 131. ſp. 1. — Gall. *le Puffin.* — Angl. *Manks Puffin.*

IL Puffino è Uccello marino *ſecondo il Geſnero e l' Aldrovando*. Egli è privo di penne, ed ha il corpo veſtito ſoltanto di piume a guiſa di lanugine, ond'è che non può volare. Qualora pertanto queſt' Uccello vuol mutar di luogo, appoggiandoſi all' eſtremità delle ali, e dei piedi, celeramente quaſi ſtriſciando trapaſſa le acque. Cibaſi di alga, e chiocciole marine. Abita nei Mari Settentrionali. Queſti Uccelli vengono conditi col ſale, e così mangiati in Inghilterra.

I caratteri del Puffino ſono di avere quattro dita, tre cioè anteriori collegati fra di loro con membrane intiere, ed uno poſteriore libero: il dito di dentro nel lato interiore, e quello di fuori nel lato eſteriore per tutta la ſua lunghezza orlato di membrana: le gambe nell' inferior loro parte ſpogliate di piume, collocate circa la metà del corpo, fuori dell' addome, e più corte del medeſimo corpo: il becco ſenza dentatura, e quaſi cilindrico: e l' apice dell' una e dell' altra mandibula adunco. Le ſue narici, le quali coſtano di due tubi cilindrici, ſono poſte ſopra la maſcella ſuperiore vicino al capo.

PUffinus Avis eſt marina iuxta Geſnerum & Aldrovandum; *pennis carens, ſed plumis tantum, ceu lanugine quadam veſtitur: itaque ſubvolare non poteſt: quando itaque locum mutare inſtituit, alarum pedumque extremitatibus nixus, aquas celeriter, quaſi prorepens praeterlegit. Alga & Cochleis victitat. In Septentrionalibus Maribus habitat. Sale conditur, & ſic editur in Anglia.*

Puffini characteres ſunt; digiti quatuor, tres ſcilicet antici, membranis integris inter ſe connexi: poſticus ſolutus; digitus intimus in latere exteriore per totam longitudinem membranula donatus. Crura in parte infima plumis denudata, circa corpus medium & extra abdomen poſita, corpore breviora; roſtrum edentulum *ſubcilindraceum: apex utriſque mandibulae* aduncus. *Nares, quae binis conſtant tubulis cylindraceis, ſupra mandibulam ſuperiorem prope Caput poſitae ſunt.*

T. DXXXVII. B. — 12. —

PUFFINO minore, volgarmente BERTA minore — Lat. *Puffinus minor, vulgo in Etruria* Berta minore *dictus*; Gerin. Ornith. Num. 559. — *Puffinus ſuperne fuſcus, inferne albidus, roſtro nigricante, pedibus rubeſcentibus*; Nobis. — Gall. *le petit Puffin* — Angl. *The leſſer Puffin.*

QUeſti Uccelli ſono molto frequenti nell' Iſola di Mona, ſituata tra l' Inghilterra e l' Irlanda, dove ancora nidificano. Depongono un ſolo uovo alla volta, benchè volgarmente ſi creda che ſempre ne partoriſchino due, uno de quali non ſi rende mai fecondo. I loro Pulcini eſciti dall' uovo maravigliosamente ingraſſano. Le loro Madri di buon mattino gli abbandonano, e conſumano tutto il giorno in mare peſcando, nè fanno ritorno ſe non a notte. Ciocchè eſſe hanno mangiato di peſci o altro cibo, lo convertono per un innato calore del loro ventricolo in una certa ſoſtanza oleoſa, colla quale nutriſcono di notte i loro Pulcini, che perciò molto ingraſſano.

Quanto ſcrive il Geſnero, e l' Aldrovando, come abbiamo notato nella Tavola an-

INſula Monae, quae Angliam inter & Hiberniam ſita eſt, hujuſmodi Aves multo frequentes ſunt, ibique nidificant. Ovum unicum una vice pariunt, quamvis vulgo perſuaſum ſit, eas duo ſemper ova ponere, quorum alterum perpetuo ſit infaecundum. Pullos excluſos mirum in modum ſaginant. Mares ſummo mane nidos, & pullos, ipſamque Inſulam deſerunt, totumque diem in Mari piſcando impendunt, nec unquam ante noctem redeunt. Quidquid piſcium, aliuſque eſculenti per totam diem deglutiverint, innato ventriculi calore in ſubſtantiam quamdam oleoſam commutant, cuius bonam partem in Pullorum ora evomunt, qui eo enutriti ſupra modum pingueſcunt.

Quod Geſnerus, eumque ſecutus Aldrovandus, ut in antecedenti Tabula adnotavimus, ſcribit

anteeedente, cioè che ſieno privi di penne, e veſtiti ſoltanto di piume a guiſa di una lanugine, e che perciò non poſſano volare, ſi è ritrovato affatto falſo, mentre ſono muniti di coda, ed ali lunghe, e volano velociſſimamente.

bit, eos ſcilicet pennis carere, & plumis tantum ſeu lanugine quadam veſtiri, ideoque volare non poſſe, omnino falſum eſt, nam alis & cauda ſatis longis inſtructi ſunt, & quam citiſſime volant.

3. Puffino cenerino — Lat. *Puffinus cinereus*; Briſſ. Tom. VI. pag. 134. ſp. 2. — *Puffinum majorem craſſitie circiter aequat. In Septentrionalibus Regionibus habitat.*
4. Puffino del Capo di Buona Speranza — Lat. *Puffinus Capitis Bonae Spei*; Briſſ. Tom. VI. pag. 137. ſp. 3. — *Procellaria fuſca immaculata, roſtro flavo. Procellaria aequinoctialis*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 64. ſp. 2. — *Sterna major fuſca humile volans*; Browne — *Plautus Albatroſs ſpurius major*; Klein. — *Corvum craſſitie circiter aemulatur. Habitat in Capite Bonae Spei.*
5. Puffino del Braſile — Lat. *Puffinus Braſilienſis*; Briſſ. Tom. VI. pag. 138. ſp. 4. — *Magnitudine & craſſitie Anſerem circiter aemulatur; Habitat in Braſilia. Circa Fluviorum oſtia in mari vivit; & in littoribus nidificat.*

T. DXXXVIII. B. — 5. 2.

PROCELLARIA, o ſia UCCELLO di TEMPESTA, detto anche FRINGUELLO di MARE — Lat. *Procellaria, Fringilla Marina etiam dicta — Plautus minimus procellarius*; Klein. — *Stromſinck*; Cluſ. Nieremb. & Willugh. — *Procellaria nigra, uropygio albo. Procellaria pelagica*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 64. ſp. 1. — *Procellaria*; Briſſ. Tom. VI. pag. 140. ſp. 1. — Gall. *Le Pétrel* — Angl. *Petteril.*

LA Procellaria abita nel Mare Settentrionale, ed ivi coſtruiſce il ſuo nido nelle rupi. S'inoltra ſpeſſiſſimo in alto mare, e con velocità incredibile di piedi oltrepaſſa ſopra le onde, e non ſenza ammirazione ſi traſporta come un vento; e però l'è ſtato dato dai Franceſi il nome di *Pétrel*, come ſe in queſto imitaſſe *S. Pietro*, che camminò ſopra le acque. All'apparire di queſti Uccelli i Marinari predicono ſenza dubbiezza la tempeſta. Quando eſſi ſi avvicinano a turme verſo le Navi, conoſcono ſubito eſſer tempo di abbaſſare le vele; e perciò ſono da alcuni ſtati chiamati *Uccelli di tempeſta*. Per tutto il tempo che dura la tempeſta eſſi ſi ricoverano ſotto il timone della Nave, nè ſi partono da tal poſto fino a tanto che non ſia quella diſſipata.

La Procellaria differiſce ſoltanto nei caratteri dal Puffino, per aver eſſa la punta della mandibula ſuperiore adunca, e l'inferiore quaſi troncata, mentre il Puffino ha la punta dell'una e dell'altra mandibula ripiegata.

PRocellaria habitat in Mari Septentrionali, ibique in rupibus nidificat: ſaepiſſime Mare plenum petit, & ſuper fluctus incredibili pedum velocitate tranſcurrit, ac non ſine admiratione nimbi inſtar ſe fert, ideoque ipsi a Gallis Pétrel *nomen donatum eſt, cum* Divum Petrum *per aquam ambulantem ſic imitetur. Ex harum avium adventu Nautae tempeſtatis prognoſticum faciunt. Catervatim enim cum Navibus appropinquent, deponenda eſſe ſubito vela intelligentes norunt; quare* Procellariae Aves *a nonnullis dictae fuerunt. Procella permanente, ſub Navis gubernaculo Aves hae ſeſe recipiunt, ibique permanent, donec tempeſtas diſſipetur.*

Procellaria a Puffino in characteribus tantum differt; quod illa apicem mandibulae ſuperioris aduncum, inferioris quaſi truncatum habeat, iſte utriuſque mandibulae aduncum gerat.

2. Procellaria cenerina — Lat. *Procellaria cinerea*; Briſſ. Tom. VI. pag. 143. ſp. 2. — *Craſſitie Anatem domeſticam circiter aequat. In rupibus nidificat. Habitat in Mari Septentrionali.*
3. Procellaria brizzolata — Lat. *Procellaria naevia*; Briſſ. Tom. VI. pag. 146. ſp. 3. — *Procellaria albo ſuſcoque varia. Procellaria Capenſis*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 64. ſp. 3. — *Plautus Albatroſs ſpurius minor, e nigro & albo varius*; Klein. — *Cum Columba Romana circiter craſſitie convenit. Habitat in Capite Bonae Spei.*

T. DXXXIX. B. 1. 3. —

STERCORARIO di coda lunga, altrimenti detto UCCELLO ARTICO — Lat. *Stercorarius longicaudus, alias Avis Arctica dictus* — *Plautus Stercorarius*; Klein. — *Sterna rectricibus maximis nigris*; Linn. Faun. Svec. N. 129. — *Larus rectricibus duabus intermediis longissimis, Larus parasiticus*; Linn. Syst. Nat. Gen. 69. sp. 6. — *Larus subfuscus major, vertice nigro, ventre albido, rectricibus intermediis longissimis*; Browne. — *Stercorarius longicaudus*; Briss. Tom. VI. pag. 155. sp. 3. — *Avis Arcticus, sive Larus cauda duabus pennis longissimis donata*; Edward. Tom. III. pag. 148. — Gall. *Le Stercoraire a longue queue* — Angl. *Arctick-Bird.*

QUello che quivi si rappresenta è creduto certamente il Maschio. La Femmina è descritta dall' Edward alla Tav. 149., e dal Brisson alla p. 152. sp. 2. sotto il nome di *Stercorario striato*.

Gli Uccelli di questo genere abitano nei Paesi Settentrionali. Per la debolezza delle loro gambe, e per la lunghezza delle loro ali frequentemente stanno più in aria, che sulla terra. Nutrisconsi di pesci morti, che galleggiano per il mare.

Differisce lo Stercorario nei caratteri dal Puffino, e dalla Procellaria, per aver la punta della mascella superiore adunca e ripiegata, e quella dell'inferiore rotondata.

Species haec pro Masculo Habetur. Foemina ab Edwardo describitur Tab. 149. & a Brissonio pag. 152. sp. 2. sub titulo Stercorarii Striati.

Hujus generis Aves in Septentrionalibus Regionibus habitat. Suorum crurum debilitate, & alarum longitudine plus aerem quam terram frequentant. Mortuis piscibus victitant per mare natantibus.

Stercorarius a Puffino & Procellaria tantum discrepat in characteribus, ob apicem scilicet mandibulae superioris adunçum, inferioris rotundatum.

2. STERCORARIO SCURO — Lat. *Stercorarius fuscus*; Briss. Tom. VI. pag. 150. sp. 1. — *Crassitie Puffinum cinereum nonnihil antecellit. In septentrionalibus Regionibus habitat.*

3. STERCORARIO STRIATO — Lat. *Stercorarius Striatus*. Briss. Tom. VI. pag. 152. sp. 2. — *In septentrionalibus Regionibus pariter habitat, & pro Foemina* Stercorarii longicaudi *sub Tab. antecedente descripti habetur.*

T. DXL. B. — 16. 2.

STERNA maggiore — Lat. *Sterna major*; Briss. Tom. VI. pag. 203. sp. 1. — *Sterna*; Gesn. Aldrov. & Jonst. — *Sterna Turneri*; Willugh. — *Hirundo marina*. Ejusd. Willugh. Raj, & Sibbald. — *Hirundo marina major*; Raj. — *Hirundo marina, Sterna Turneri*; Rzac. — *Larus minor, Sterna, vel Stirna*; Gesn. — *Larus albicans*; Marsil. & Klein. — *Larus*; Moehr. — *Sterna cauda forcipata, rectricibus duabus extimis albo, nigroque dimidiatis. Hirundo Marina*; Linn. Syst. Nat. Gen. 70. sp. 2. — Gall. *La grande Hirondelle-de-Mer* — Angl. *Sea Swallow.*

REalmente questi Uccelli sono del genere dei *Gabbiani*; e perciò dal *Gerini* nella sua Raccolta vengono descritti sotto il titolo di *Gabbiani minori*; ma attesa la lunghezza delle loro ali, la piccolezza dei loro piedi, il biforcamento della loro coda, il loro continuo volo, e tutta finalmente la figura del loro corpo, meritamente sono stati detti dai Latini *Sternae*, e dai Francesi *Rondini marine*.

Tutti gli Uccelli di questo genere si distinguono per avere quattro dita, tre anteriori collegate insieme con membrana, ed uno posteriore sciolto: per le gambe poste circa la metà del corpo, fuori dell'addome, più corte del corpo stesso, e nell'inferior parte spogliate

REvera Aves hae sunt ex Larorum genere; ideoque a Gerinio *in sua Avium Collectione sub titulo* Larorum minorum *describuntur; at ob alas longas, pedes parvos, caudam forcipatam, volatum continuum, totius denique corporis figuram* Sternae *a Latinis; a Gallis vero* Hirundines marinae *& quidem merito nuncupantur.*

Omnes hujus generis Aves distinguuntur digitis quatuor, tribus scilicet anticis membranis inter se connexis, postico soluto; cruribus circa corpus medium, & extra abdomen positis, corpore brevioribus, & in infima parte plumis denudatis; cauda bifurca; rostro edentulo, recto, late-

te di piume: per la coda biforcata; per il becco ſenza dentatura, dritto e lateralmente piatto, e per l'una e l'altra mandibula di egual lunghezza.

teraliter plano, mandibula utraque aequalis longitudinis.

T. DXLI. B. — 7. —

STERNA *minore* — Lat. *Sterna minor*; Briſſ. Tom. VI. pag. 206. ſp. 2. — *Larus ſubcinereus, roſtro & pedibus croceis*, Barr. — *Larus piſcator*; Geſn. Aldrov. Jonſt. & Charlet. — *Larus piſcator Aldrovandi & Geſneri*; Willugh. & Klein. — *Larus minor cinereus*: Schwenck. — *Larus minor cinereus Schwenckfeldii*; *Larus piſcator Geſneri*; *Gavia minor*; Rzac. — *Larus fluviatilis, ſeu Gavia, Geſnero piſcator*; Ejuſd — *Larus albus minor*; Aldrov. & Jonſt. — *Larus albus minor Bellonii*; *Fiſcherlin Leonardi Baltneri*; Willugh. — *Sterna cauda ſubforficata, corpore cano, capite roſtroque nigro, pedibus rubris. Sterna nigra*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 70. ſp. 3. — Gall. *La petite Hirondelle-de-mer*, — Angl. *Leſſer Sea-Swallow*.

LA Sterna minore frequenta i fiumi, le peſchiere, e i lidi del Mare. Coſtruiſce il ſuo nido di canne, e vi depone quattro o cinque Uova alla volta. Può molto queſt'Uccello nel volo: ſi ciba di piccoli peſci, e per prenderli ſuole ancora immergerſi ſott'acqua. Di queſti Uccelli trovaſene gran copia appreſſo Caldey Iſola della Provincia Meridionale di Galles.

STerna minor Fluvios, Piſcinas, Mariſque littora frequentat. Ex arundinibus nidum conſtruit, tria quaternaque ova uno incubitu ponit. Multum volatu poteſt haec Avis: Piſciculis victitat, illoſque dum captat etiam in aquam ſe mergit. Prope Caldejum Inſulam Valliae Meridionalem ſatis frequens obſervatur.

T. DXLII. B. — 9. —

STERNA cenerina detta in Toſcana COLOMBINO, MIGNATTONE, e PANNELBAGIO, e dai Bologneſi RONDONE MARINO — Lat. *Sterna cinerea*; Briſſ. Tom. VI. pag. 210. ſp. 3. — *Larus ſidipes alius alis brevioribus*; Aldrov. — *Larus ſidipes alter*; Jonſt. — *Larus ſidipes alter alis brevioribus, Aldrovandi*; Raj. — *Larus cinereus minor*; Marſil. — Gall. *L'Hirondelle-de-mer cendrée*.

LA Femmina di queſta ſpecie non è dal Maſchio per i colori punto diſſimile; differiſce ſoltanto nella grandezza, nella quale è minore. Queſt'Uccello vola continuamente e con grandiſſima rapidità: frequenta i lidi del Mare, e ſi ripoſa alcune volte ancora ſulla ſuperficie delle acque. In Italia è molto frequente ſulle ſpiagge del mare Adriatico.

HUjus ſpeciei Foemina coloribus cum Mare ſatis bene convenit; diſcrepat vero magnitudine, qua ei cedit. Avis haec celeriter, & quotidie volitat. Maris littora frequentat, & ſuper aquarum ſuperficies aliquando conſiſtit. Ad littora maris Adriatici multum in Italia frequens.

T. DXLIII. B. — 10. —

STERNA cenerina di teſta nera — Lat. *Sterna cinerea atricapilla — Sterna atricapilla ſuperne ſaturate cinerea, inferne alba; capite, collo & pectore ſupremo nigris; oculorum ambitu cinereo-albo; rectricibus ſaturate cinereis, utrinque extima exterius alba, ſaturate cinereo marginata, cauda maxime bifurca; parte crurum plumis denudata, pedibus & digitis, ſicuti & ipſorum membranis obſcure rubris, unguibus vero nigricantibus*; Briſſ. Tom. VI. pag. 214. ſp. 5. — *Goiland, ſive Larus albo niger Hirundinis cauda*: Fevillée — Gall. *L'Hirondelle-de-mer à tête noire, ou le Gachet*.

T. DXLIV. B. — 8. 1.

STERNA nera — Lat. *Sterna nigra — Larus niger*, Gesn. Aldrov. Jonst. & Charlet. — *Larus niger Gesneri*, Raj. — *Larus niger Gesneri, Aldrovandi*; Willugh. — *Larus minor niger Schwenckfeldii, Gesneri, Meva nigra*, Rzac. — *Larus minor niger, Meva nigra*; Rzac. — *Larus fidipes primus* Jonst. — *Larus niger fidipes*, Aldrov. — *Larus niger fidipes, alis longioribus Aldrovandi*: Willugh. — *Larus niger fidipes noster*, idem. — *Larus niger fidipes noster*, Raj. — *Larus Pyrenaicus totus ater*, Raj. — *Larus minor niger*; Klein. — *Sterna nigra*; Briss. Tom. VI. pag. 211. sp. 4. — Gall. *L'Hirondelle de mer noire, ou l'Epouvantail* — Angl. *Scare-Crow., or Black Headed Gull, or Shear Water.*

T. DXLV. B. — 15. —

STERNA mezzana, di becco, piedi, e occipite di color nero — Lat. *Sterna media rostro, pedibus, & occipite nigro*; Nobis — *Larus minor medius*, Gerin. Ornith. N. 575.

T. DXLVI. B. — 8. 1.

STERNA volgarmente detta in Toscana PETTO BIANCO — Lat. *Sterna vulgo in Etruria* Petto-bianco *dicta*. — *Larus minor pectore albo*, Gerin. Ornith. N. 570.

TUtti gli Uccelli di questo genere vengono dagli Ornitologisti annoverati tra quegli di passaggio. E' stato osservato da parecchi Inglesi Ornitologi, che i medesimi s'inoltrano in alto mare a cinquanta leghe presso l'estremità d'un Promontorio dalla parte Occidentale dell'Inghilterra nominato *Sunds-End*; ove da principio si radunano, ed in seguito vanno a cercare le Isole Madere sul Mare Atlantico, e poco lontane dalle Canarie. Volano ancora n'll'Isole deserte nominate dai Francesi *Salvages*, ove nidificano, partoriscono, e si moltiplicano in gran copia.

Riferisce il Seba di aver veduto in Olanda di queste Sterne, o sieno Rondini Marine, che tramandavano un odore gratissimo d'ambra grigia.

OMnes hujus Generis Aves ab Ornithologis inter Migratorias reponuntur. A nonnullis inter Anglos Ornithologos observatum est sternas mare plenum petere, ac quinquaginta leucarum iter conficere usque ad extremitatem Promontorii quod ex Angliae Occidentali parte assurgit, quodque Angli Sundf-End *appellant. Hic primum se aggregant, inde Maderae Insulas in Mare Atlantico non procul a Canariis consequuntur. Advolant quoque in Insulas desertas, quas Galli* Salvages *dicunt. ubi nidulantur, pariunt, magnoque numero multiplicantur.*

Refert Seba nonnullas ex his Sternis, seu Marinis Hirundinibus, in Hollandia observasse ambrae griseae gratissimum odorem spirantes.

8. STERNA brizzolata — Lat. *Sterna naevia*; Briss. Tom. VI. pag. 216. sp. 6. — *Larus cinereus fissipes rostro ac pedibus rufescentibus*, Marsil. — *Rallus cinereus facie Lari*, Klein — *Rallus Lariformis*, Linn. Syst. Nat. Gen. 83. sp. 2. — *Cum Sterna cinerea atricapilla crassitie circiter convenit. Juxta Maris littora versatur, stagna quoque & flumina frequentat.*
9. STERNA scura dell'Isola di S. Domingo. — Lat. *Sterna Dominicensis fusca*; Briss. Tom. VI. pag. 220. sp. 7. — *Crassitie praecedentem paululum antecellit. Habitat in Dominicensi Insula.*

T. DXLVII. — 8. —

GLAREOLA, altrimenti RONDONE MARINO, e anche PERNICE di MARE — Lat *Glareola*, Gerin. Ornith. N. 577. & Briss. Tom. V. pag. 141. sp. 1. — *Glareola secunda*, Schwenck. — *Hirundo marina*; Ionst. & Charlet. — *Hirundo marina Avis*, Aldrov. — *Hirundo marina Aldrovandi*, Willugh. & Raj. — *Hirundinis ripariae species*, Marsil. — *Pratincola*, Kramer. — Gall. *Perdrix-de-mer.*

LA

LA Glareola eſſendo del genere dei Gabbiani, dovea giuſtamente tra quelli aver luogo; ma per la ſimilitudine, che ha colla Sterna, abbiamo giudicato opportuno il collocarla qui ſubitamente dopo le Sterne.

Queſt' Uccello frequenta i Fiumi, gli Stagni, ed i lidi particolarmente del Mare, dove nidifica, e depone per lo più ſette uova alla volta, *di* figura molto lunga.

I Caratteri della Glareola ſono, avere quattro dita prive di membrane, tre cioè anteriori, ed uno poſteriore: le gambe nell' inferior parte ſpogliate di piume: ed il becco al di ſopra ritorto, ed in punta lateralmente compreſſo.

GLareola inter Laros, cum ex Larorum genere ſit, iure meritoque reponenda erat; at ob convenientiam quam habet cum Sterna, hic ſtatim poſt Sternas collocandum judicavimus.

Avis haec Flumina, ſtagna, & praecipue Maris littora frequentat, ibique nidificat, & ova ponit ut plurimum ſeptem oblonga.

Glareolae characteres ſunt digiti quatuor, membranis diſtituti, tres ſcilicet antici, poſticus unus: Crura in parte inferiore plumis denudata: roſtrum ſuperne convexum, apice lateraliter compreſſum.

2. GLAREOLA col collare — Lat. *Glareola torquata*; Briſſ. Tom. V. pag. 145. ſp. 2. — *Glareola quinta*; Klein. & Schwenck. — *Praecedenti multum craſſitie cedit. In arenis ad littora fluviorum nidificat, nec littora unquam deſerit.*
3. GLAREOLA del Senegal — Lat. *Glareola Senegalenſis*; Briſſ. Tom. V. pag. 148. ſp. 4. — *Glareolam noſtratem craſſitie circiter aemulatur. Habitat in Senegalenſi Regione, & colore eſt in toto corpore fuſco.*

T. DXLVIII. B. — 18. 1.

RIGOPSALIA, detta dai Franceſi BECCO-A-FORBICE — Lat. *Rygchopſalia*, Roſtrum-inſtar-forficum *a Gallis dicta*. — *Rygchopſalia dorſo nigro, ventre albo*; Barr. — *Rynchops nigra, ſubtus alba, roſtro baſi rubro. Rynchops nigra*, Linn. Syſth. Nat. Gen. 71. ſp. 1. — *Larus piſcator ater, roſtro depreſſo, forfices referente*; Barr. — *Plotus roſtro conico inaequali*; Klein. — *Phalacrocorax*; Moehr. — *Avis Carolinenſis, roſtro cultriformis*. Pitivier. — *Avis Maderaſpatana major novaculae facie*; Raj. — *Rygchopſalia*; Briſſ. Tom. VI. pag. 223. ſp. 1. — Gall. *le Bec-en-ciſeaux* — Angl. *Cut Water*,

PArticolare è il becco di queſto Uccello, e degno inſieme di qualche oſſervazione. Sembra che la Natura ſiaſi ſervita di un ordine affatto contrario a quello ſolito adoprare negli altri Uccelli. La mandibula ſuperiore ſi oſſerva in tutti più lunga dell' inferiore; ma nella Rigopſalia, come riferiſce il Klein è quella più corta di queſta per la miſura di due once Franceſi. Le ſue mandibule ſono ſcannellate, colle punte molto forti, e fatte a guiſa di coltello.

La Rigopſalia volando rade la ſuperficie delle acque, ed introdotta in queſte la mandibula inferiore n'eſtrae per ſuo cibo dei piccoli Peſci, e dei Vermi acquatici. Abita nell' America.

I ſuoi caratteri ſono avere quattro dita, tre anteriori collegate fra di loro con membrane intiere, ed uno poſteriore libero: le gambe nell' inferior parte ſpogliate di piume, poſte circa la metà del corpo, fuori dell' addome, e più corte del corpo ſteſſo: il becco ſenza den-

PEculiare hujus Avis roſtrum, & obſervatione non indignum; nam inverſo ſolito aliarum Avium naturae ordine, quibus plerumque ſuperior mandibula inferiore longior, in hac Ave ſuperior mandibula inferiore ad duas uncias gallicas, ut refert, Kleinius brevior eſt. Acies roſtri valide ſunt, & cultratae mandibulis canaliculatis.

Rygchopſalia volando aquae ſuperficiem radit, & in ea mandibula inferiore introducta, ex illa cibum Piſciculos aquat ſcilicet & vermes acquaticos extrahit. Habitat in America.

Rygchopſalia his diſtinguitur characteribus. Digitos habet quatuor, tres ſcilicet anticos membranis integris inter ſe connexos, poſticum ſolutum: crura in infima parte plumis denudata, circa corpus medium, & extra abdomen poſita, corpore breviora: roſtrum eden-

dentatura, dritto, e lateralmente piatto: e la mandibula inferiore molto più lunga della ſuperiore. Il Rajo poſſedeva il becco di queſt' Uccello avuto dalla Carolina, ed il Petiver ce ne dà una molto buona figura nella ſua Raccolta di coſe naturali, e dell'arte Tab. 76. fig. 2.

tulum, rectum, lateraliter planum: mandibulam inferiorem multò ſuperiore longiorem. Hujus Avis roſtrum a Carolina olim Rajus accepit; cujus icon a Petiverio in Gazophil. Naturae & Artis Tab. 76. fig. 2. accuratiſſime exhibetur.

2. RIGOPSALIA roſſiccia — Lat. *Rygcopſalia fulva*; Brſſ. Tom. VI. pag. 227. Var. A. — *Rygchopſalia fulva, roſtro nigro*; Barr. — *Rygchops fulva roſtro nigro*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 71. ſp. 2. — *Magnitudine & craſſitie praecedentem aemulatur. Ab illa ſolummodo diſcrepat corporis ſuperioris colore fulvo in omnibus partibus, in quibus praecedens ex fuſco nigricat, & roſtro penitus nigro; in reliquis cum illa perfecte convenit. Habitat in Guiana.*

T. DXLIX. B. — 15. 2.

URIA maggiore — Lat. *Uria major — Uria*; Geſn. Aldrov. & Ionſt — *Lomwia*; Cluſ. Nieremb. & Ionſt. — *Lomwia Inſulae Farrae Hoieri*; Sibbald. Willugh. & Raj. — *Jomvia*; Charlet. — *Cataractes*; Moehr. — *Plautus roſtro Larino*; Klein. — *Uria*; Briſſ. Tom. VI. pag. 70. ſp. 1. — Gall. *le Guillemot* — Angl. *Guillam*.

L'Uria maggiore eguaglia quaſi l'Anatra in groſſezza. Abita nelle Provincie Settentrionali, e nidifica nelle rupi inacceſſibili vicino al Mare, deponendo un ſol Uovo alla volta, il quale è groſſo quanto quello di un' Oca, verdaſtro, e aſperſo di macchie nereggianti ed irregolari.

L' Uria vien caratterizzata per avere tre dita anteriori collegate fra di loro con membrane intiere, e per eſſer priva del dito poſteriore: per aver le gambe ſituate nell'addome, e preſſo all'ano: il becco dritto, ed appuntato.

Uria major cum Anate craſſitie circiter convenit. Habitat in Septentrionalibus Regionibus. Prope Mare in rupibus inacceſſis nidificat. Uno incubitu Ovum unicum ponit, Ovum Anserinum craſſitie aequans, virideſcens, maculisque irregularibus nigricantibus aſperſum.

Uriae characteres ſunt: digiti tres antici membranis integris inter ſe connexi; digitus poſticus nullus: Crura ad podicem poſita, & intra abdomen condita: roſtrum rectum, acutum.

T. DL. B. — 8. 1.

URIA minore — Lat. *Uria minor — Alca roſtro laevi conico, abdomine, faſciaque alarum alba, pedibus nigris*; *Alle*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 63. ſp. 6. — *Arctica*; Moehr. — *Mergulus melanoleucos roſtro acuto brevi D. Brown*; Willugh. & Raj. — *Plautus Columbarius*; Klein. — *Uria minor*; Briſſ. Tom. VI. pag. 73. ſp. 2. — Gall. *le petit Guillemot* — Angl. *Greenlande dove; or Sea Turle.*

LA Femmina di queſta ſpecie differiſce dal Maſchio per avere la gola bianca, la qual bianchezza dall'una e l'altra parte ſi diſtende fino all'occipite: la parte inferiore del collo è di un cenerino oſcuro, il qual colore a poco a poco inoltrandoſi verſo il petto ſi rende più dilavato. Tutte le penne, che al di ſotto le ricoprono le ali ſono d'un cenerino foſco. Nel rimanente ſi aſſomiglia affatto al ſuo Maſchio.

Queſt' Uccello s'inoltra per lo più in alto mare, e di rado ſi raggira intorno ai lidi.

Hujus ſpeciei Foemina a Maſculo diſcrepat gutture albo, albedine ſcilicet utrinque verſus occipitium uſque aſcendente; pars colli inferior eſt obſcure cinerea; qui color paulatim verſus pectus procedendo fit dilutior. Pennae omnes alas ſubtus obtegentes ſunt cinereo-fuſcae. In reliquis cum Maſculo perfecte convenit.

Mare plenum plerumque petit haec Avis, & raro juxta littora verſatur.

3. URIA minore, volgarmente detta COLOMBA GROENLANDICA — Lat. *Uria minor, Columba Groelandica vulgo dicta*; Briſſ. Tom. VI. pag. 76. ſp. 3. — *Uria*; Moehr. — *Alca roſtro laevi ſubulato, abdomine, maculaque alarum alba, pedibus rubris; Grylle*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 63. ſp. 5. — *Columba Groenlandica dicta*; Willugh. & Sibbald. — *Columba Groenlandica Hollandis*; Raj. — *Columbus Groenlandicus*; Klein. — *Craſſitie praecedentem paululum antecellit. Habitat in Mare Septentrionale, & precipue in Kilda Inſula.*

4. URIA minore ſtriata — Lat. *Uria minor ſtriata*; Briſſ. Tom. VI. pag. 78. ſp. 4. — *Plautus Columbarius*; Klein. — *Cum praecedente craſſitie circiter convenit. Habitat in Mare Septentrionali.*

T. DLI. B. — 11. 1.

FRATICELLA detta dall' Aldrovando PICA MARINA — Lat. *Fratercula ab Aldrovando Pica marina dicta. — Alca roſtro compreſſo-ancipiti ſulcato ſulcis quatuor, oculorum orbita, temporibuſque albis; Alca Arctica*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 63. ſp. 3. — *Anas Arctica Cluſii*; Muſ. Worm. & Sibbald. — *Anas Artica Cluſii; Pica Marina, vel Fratercula Geſneri, Aldrovandi*, Willugh. & Raj. — *Pica Marina*; Aldrov. — *Plautus Arcticus*; Klein. — *Puffinus*; Charlet. — *Puffinus Anglicus*; Geſn. — *Puffinus vulgo ab Anglis dictus*; idem. — *Sphenicus*; Moehr. — *Lunda*; Cluſ. Nieremberg. Ionſt. — *Fratercula*; Briſſ. Tom. VI. pag. 81. ſp. 1. — Gall. *le Macareux, ou Perroquet de mer* — Angl. *Puffin, Coulterneb.*

ABita queſt' Uccello nelle Provincie Settentrionali, e nidifica tra i rottami delle rupi, deponendo un ſolo Ovo alla volta.

La Fraticella vien caratterizzata per aver tre dita anteriori collegate fra di loro con membrane intiere, e per eſſer priva del poſteriore. Le ſue gambe ſono ſituate nell'addome, e vicino all'ano. La baſe della ſua mandibula ſuperiore reſta munita di una ſoſtanza calloſa, vicino alla quale il becco è tinto di un color livido, e nel rimanente è roſſo. Il becco poi dall'una e l'altra parte viene lineato da tre ſolchi, uno immediatamente poſto vicino alla parte tinta di color livido, e due vicino all'altra di color roſſo. Le Narici ſono molto lunghe ſituate nella parte livida. La maſcella ſuperiore è alquanto piegata in punta. I piedi, le dita, e le loro membrane ſono in alcune d'un elegante color d'arancia, in altre poi roſſe; le unghie finalmente di un celeſticcio tendente al nero.

IN Septentrionalibus Regionibus habitat haec Avis; nidulatur inter Rupium maceries, & Ovum unicum una vice ponit.

Diſtinguitur Fratercula digitis tribus anticis, membranis integris inter ſe connexis, digito poſtico nullo; cruribus ad podicem poſitis, & intra abdomen conditis. In hac Ave Mandibulae ſuperioris baſis ſubſtantia obſita eſt calloſa, prope quam roſtrum tingit color lividus; in reliqua verò longitudine roſtrum rubet. Roſtrum autem tribus utrinque exaratur ſulcis, uno ſcilicet immediate prope, partem livido colore imbutam, duobus vero in parte rubra collocatis. Nares ſunt oblongae, in livida parte poſitae. Mandibula ſuperior eſt nonnihil apice adunca. Pedes, & digiti, ſicut & ipſorum membranae ſunt in aliis eleganter aurantii, in alteris vero rubri; ungues autem nigro-caeruleſcentes.

T. DLII.

ALBATRO — Lat. *Albatrus. — Plautus Albatrus*; Klein. — *Diomedea exulans alis pennatis, pedibus tridactylis*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 65. ſp. 1. — *Albatrus*; Briſſ. Tom. VI. pag. 126. ſp. 1. — Gall. *L'Albatros.*

L'Albatro ſupera un poco, tanto in grandezza, come in groſſezza l'Onocrotalo, o ſia il Pellicano. Il ſuo becco, lo che ſolo è oſſervabile in queſt' Uccello, dalla ſua eſtremità fino agli angoli della bocca ha ſei pollici di lunghezza. Egli ſembra compoſto di più parti fra

MAgnitudine & craſſitie Onocrotalum paulum ſuperat. Roſtrum, quod ſolum in hac Ave obſervatu eſt dignum, ab ipſius extremitate ad oris angulos uſque ſex pollices longum eſt. Pluribus partibus inter ſe connexis conflatum videtur, nonnulliſque ſulcis conſpicuum; lateraliter compreſſum, in

fra di loro conneſſe, viſibilmente ſolcato, lateralmente compreſſo, colla punta della mandibula ſuperiore ritorta, e dell' inferiore quaſi troncata.

Tutti gli Uccelli di queſto genere hanno tre dita anteriori collegate fra di loro con membrane intiere, e ſono privi del dito poſteriore, e ſono nell' uno e nell' altro piede muniti di una piccola membrana, la quale ſcorre per tutta la lunghezza delle parti eſteriori, lo che per anco non è ſtato oſſervato in alcun altro Uccello Aquatico.

L' Albatro ſecondo Edward tiene il primo luogo tra i più grandi Uccelli Aquatici: e la figura del ſuo becco è ſtata data dall' Albino (Vol. III. pag. 76.) Ma queſt' Autore non ha fatta diſtinzione alcuna di queſt' Uccello coll' altro, che nell' Indie Orientali chiamano gl' Ingleſi *Man of War*, ed i Franceſi *Vaiſſeau de Guerre*. Alcuni Viaggiatori deſcrivono l' Uccello *detto Man of War* per molto minore dell' Albatro, e queſto dicono eſſere della prima grandezza trà gli Uccelli Aquatici. Noi ſappiamo di certo non eſiſtere deſcrizione alcuna caratteriſtica del *Man of War*, eccettuate quelle, che hanno dato comunemente alla loro maniera i Viaggiatori, che per la maggior parte ſono generaliſſime, e che non ci danno che delle idee molto imperfette delle coſe naturali.

Abitano queſti Uccelli al Capo di Buona Speranza, e non altrove, per quanto giudica la maggior parte degli Ornitologiſti.

Noi qui riporteremo la deſcrizione dell' Uccello detto dagl' Ingleſi *Man of War* datici dal Cavaliere Hans Sloane nella ſua Storia della Giammaica (Vol. I. p. 30.) acciò ſi renda chiaro quanto eſſa dall' Albatro differiſca.

Queſt' Uccello (dice Sloane) tanto in groſſezza, come in grandezza ſupera l' Aquila Peſcatrice, ed è di color nero; vola molto in alto come quella, e ſembra ſpeſſo ſtare immobile ſopra le acque, per aſpettare ed inveſtire i peſci, che vengono alla ſuperficie. Egli hà le ali appuntate, e la coda biforcata.

Quello però nominato *Fregata* dall' Albino, è certamente, per quanto noi penſiamo, lo ſteſſo che quello detto dagli Ingleſi *Man of War*.

Il becco ed il capo dell' Albatro ſi conſerva nel Gabinetto d' Iſtoria Naturale dell' Uni-

* *in apice mandibulae ſuperioris aduncum, inferioris quaſi truncatum.*

Omnes hujus Generis Aves tres habent digitos anticos, membranis integris inter ſe connexos, poſticum nullum, ac membranula in utroque pede donantur, quae per totam longitudinem externarum partium diſcurrit; quod in alia Aquatica Ave nondum obſervatum eſt.

Albatrus inter grandiores Aquaticas Aves juxta Edwardum primum locum tenet. Ipſius roſtri figuram praebet Albinus (*Vol. III. pag.* 76.) *ſed Avem hanc ab illa non diſtinguit, quam in Indiis Orientalibus Angli* Man of War, *& Galli* Vaiſſeau de Guerre *appellant. Peregrinatores nonnulli Avem* Man of War *dictam multo minorem Albatro deſcribunt, Albatrumque primae magnitudinis inter Aquaticas Aves eſſe dicunt. Nullam* Man of War *diſcriptionem, ejus characteres denotantem, exiſtere certo ſcimus, illis exceptis, quas eorum more Peregrinantes dedere, qui ſaepiſſime generaliter ſe continent, rerumque Naturalium notiones nonniſi imperfectas exhibent.*

In Capite Bonae Spei habitant hujus generis Aves, nullamque aliam Terrarum Regionem frequentant, ut plerique opinantur Ornithologi.

Avis deſcriptionem ab Anglis Man of War *dictae, quam Eques dedit Hans Sloane in ſua Jamaicae Hiſtoria* (*Vol. 1. pag. 30.*) *traſcribendam curamus, ut quantum ille ab Albatro diſcrepet innoteſcat.*

Avis haec (*ait Sloanes*) *craſſitie & magnitudine Aquilam Piſcatricem ſuperat; colore donatur nigro. Ut Aquila Piſcatrix altiſſime volat, & ſuper aquas quaſi immobilis conſiſtere videtur, ubi piſces ad ſuperficiem natantes, raptat. Alas habet acuminatas, caudamque biſurcam.*

Avem Man of War *dictam ab Anglis abſque dubio illam eſſe credimus, quam Albinus nomine* Fregate *inſignivit.*

Albatri roſtrum, & caput in Muſeo Naturalis Hiſtoriae apud Piſanum Lycaeum cuſtoditur,

Università di Pisa, donde già n'ebbe la figura e la descrizione l'Autore della presente Ornitologia.

tur, unde figuram & descriptionem hujus Author obtinuit Ornithologiae.

T. DLIII. B. 1. 19. 1.

CIGNO Reale — Lat. *Cygnus maximus*; Gerin. Ornith. N. 581. — *Anser Cygnus*; Klein. — *Cygnus*; Gesn. Mus. Worm. Ionst. Charlet. Frisch. & Prosp. Alp. — *Cygnus, Cycnus, Olor*; Gesn. — *Cygnus, sive Olor*; Rzac. — *Cygnus mansuetus*; Willugh. Raj. Sibbald. & Marsil. — *Cycnus*; Aldrov. — *Olor*; Schwenck. — *Anas rostro semycylindrico atro, cera flava, corpore albo. Cygnus mansuetus*; Linn. Syst. Nat. Gen. 61. sp. 1. var. 1. — *Anser Cygnus*; Briss. Tom. VI. pag. 288. sp. 11. — Gall. *le Cygne* — Angl. *Teme Swan.*

IL Cigno è Uccello anfibio; ciò non ostante ama più le acque, e soprattutto frequenta gli stagni, o perchè questi sono più quieti, e gli agevolano il nuoto, o perchè hanno le sponde che somministrano maggior quantità di erbe. Il Cigno non cibasi di pesci, ma bensì o di erbe aquatiche insieme colle loro radici e semi, o di piccoli Vermi, Testaccicc. Quando venga alimentato per le Case nidifica tra i sassi vicino a qualche luogo ove sia dell'acqua; quando poi sia libero di se stesso alla campagna aperta, nelle paludi vicino all'erbe secondo il costume di quasi tutti gli Uccelli aquatici. Partorisce soltanto una sol volta all'anno nel principio di Primavera, attesa la sua grossezza e la frigidità del suo temperamento. Depone cinque o sei Uova, e queste grandi, di figura bislunga, e di guscio duro: e quasi per due mesi le continova a covare, vanti che vengano alla luce i Pulcini.

Il Cigno domestico, o sia mansueto, di cui parliamo, facilmente nuota, ma tardamente vola attesa la gravezza del suo corpo. Egli invecchia a tal segno, che credesi dal volgo pervenire fino al trecentesimo anno dell'età sua; il che sembra inverisimile all'Aldrovando; il Willughbj però non stenta a crederlo, certificato da idonei Testimonj, che l'Oca supera l'età di cento anni; ma il Cigno (sono parole del medesimo Willughby) se non costasse per esperienza invecchiare più dell'Oca, molti sono gli argomenti, che lo convincono: cioè, perchè il Cigno nel genere delle Oche è il maggiore; perchè la sua carne è più dura e solida di quella delle Oche, e perchè per più lungo tempo vengono covate le sue Uova, prima che restino esclusi i Pulcini.

Scrive Alberto esser la carne del Cigno nera e dura: difatti nella maniera che il Cigno è assai maggiore dell'Oca, così ancora la

CYgnus Avis est amphibia; maxime tamen aquis delectatur, & stagna praecipue vehementer appetit, seu quod quietiora, nec natatum impediant, seu quod in illis maior herbarum suppetat copia: piscibus enim non vescitur, sed vel herbis in aquis nascentibus, earumque radicibus & seminibus, vel vermiculis, Testaceis &c. Cygnus cum domesticis est in Domibus intra lapides iuxta aquas nidificat; cum vero sui iuris est in paludibus iuxta herbas, sicut fere omnes Aves aquaticae. Semel in anno tantum parit initio Veris propter sui temperamenti frigiditatem & crassitiem. Ova quinque vel sex deponit, illaque magna, oblonga, testa dura obtecta, & per menses fere duos incubatum continuat, antequam Pulli excludantur.

Cygnus domesticus, vel mansuetus, de quo est sermo, faciliter natat, tarde autem ob corporis pondus volat. Vita ei longissima est, ita ut vulgo tercentesimum annum attingere credatur: quod Aldrovando verisimile non est; at Willughbeius id facile credit: nam idoneis testibus ipsi constat Anserem centesimum aetatis annum superare. At Cygnum (sunt eiusdem verba Willughbeii) Ansere magis longaevum esse; si minus experientia constaret, plurima sunt, quae convincunt argumenta, scilicet quod in eodem genere maior sit, quod carne duriori, & solidiori, quodque diutius Ova eius incubentur, antequam excludantur Pulli.

Cygni carnem nigram & duram esse Albertus scribit; revera ut Avis ipsa Ansere longe maior est, ita caro nigrior, durior, &

la ſua carne eſſer deve più nera, dura, e tenace, difficile a digerirſi, e di ſugo malinconico e difettoſo; tuttavia per la rarità egli ha luogo nelle Menſe dei Grandi, ma più per pompa ed ornamento, che per delizia e delicatezza di cibo.

Le pelli dei Cigni, tolte via le penne più dure e rigide, e laſciata ſoltanto la piuma più morvida, o ſia lanugine, ſogliono acconciate eſſer di riparo contro il freddo, formandoſi con eſſe delle palatine, petturine, e manicotti per le ricche e nobili Femmine.

Il Cigno vien diſtinto con i medeſimi caratteri dell' Oca, e differiſce ſoltanto da quella nella baſe del becco. Imperciocchè ſopra l'origine della ſua maſcella ſuperiore s'inalza un tubercolo groſſetto, carnoſo, nero, e piegato per l'indentro. Nell' uno e l'altro lato pure del capo tra il becco e l'occhio eſiſte in lui uno ſpazio triangolare del medeſimo colore del tubercolo, ſpogliato di piume; il quale ſpazio rappreſenta in certa maniera un triangolo iſoſcele, la cui baſe riguarda il becco, e la ſommità riguarda gli occhi.

La Femmina di queſta ſpecie differiſce dal Maſchio per la grandezza, nella quale è minore, e per il ſopraddetto tuberculo, ancor eſſo minore. Nel rimanente perfettamente a quello ſi uniforma.

I Cigni più giovani hanno le penne non affatto bianche, ma piuttoſto meſcolate di grigio, ed il becco tinto di un color di piombo, eccettuata la punta della mandibula ſuperiore, la quale è nera. Hanno ancor di più una faſcia nera dall' una e l'altra parte del becco prolungata dalle narici fino al capo.

tenacior, ad digerendum rebella, ſucci pravi & melancholici eſſe debet. Obrariratem tamen Magnatum Menſis infertur, ad pompam magis & ornatum, quam eſum ſapidum & jucundum.

Cygni pellibus, durioribus & rigidioribus pennis ablatis, relicta pluma molliore, ſeu lanugine, praeparatis utuntur ad frigus depellendum: in primis operimenta pectoris ex eis confici ſolent, & brachialia, a nobilioribus vel ditioribus Matronis expetuntur.

Cum Anſere Cygnus ob characteres perfectè convenit; roſtri baſi tantummodo diſtinguitur. Supra enim mandibulae ſuperioris exortum tuberculum attollitur craſſiuſculum, carnoſum, nigrum, antrorſum inflexum. In utroque inſuper capitis latere roſtrum inter & oculum ſpatium extat triangulare, eodem nigro ac tuberculum imbutum colore, & plumis deſtitutum; quod ſpatium triangulum quodammodo refert iſoſcelem, cujus baſis roſtrum, vertex vero oculos ſpectat.

Hujus ſpeciei Foemina a Maſculo diſcrepat magnitudine, qua ei cedit, & tuberculo non ita craſſo: in reliquis cum illo perfectè convenit.

Hujuſmodi ſpeciei juniores multum griſei admixtum habent; ipſorum roſtrum plumbeo colore imbuitur, excepto mandibulae ſuperioris apice nigro; in utroque roſtri latere tenia quoque extat nigra a naribus ad caput uſque protenſa.

T. DLIV. B. 1. 12. —

CIGNO SALVATICO — Lat. *Cignus ferus — Anſer candidus, pedibus nigris, roſtro luteo, cervice longiori*; Barr. — *Anſer Cygnus*; Klein. — *Cignus ferus*; Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. & Marſil. — *Cygnus*; Aldrov. — *Olor*; Schwenck. — *Anas* Cygnus, *roſtro ſemicylindrico, cera flava: corpore albo.* Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 1. — *Anſer, Cygnus ferus*; Briſſ. Tom. VI. pag. 292. ſp. 12. — Gall. *le Cygne ſauvage* — Angl. *Wild Swan. Elk. Hooper.*

IL Cigno ſalvatico molto cede in groſſezza al domeſtico. Frequenta i Fiumi, i Laghi, e gli Stagni. Abita nelle parti Settentrionali, tanto di America, come di Europa, e particolarmente nella Baja d'Huſdon.

L' aſperarteria di queſt' Uccello ſembra ripie-

PRaecedenti multum craſſitie cedit. Fluvios, Lacus & Stagna frequentat. Americae & Europae in Septentrionalibus Regionibus, & praecipue in Hudſonis Freto reperitur.

In hac Ave aſpera arteria tubae in modum

ripiegata a guisa di tromba, e perciò adatta- ta a modulare qualunque suono; onde quanto gli antichi hanno lasciato scritto del canto dei Cigni, sembra piuttosto convenire al salvatico che al domestico.

Non piccola differenza però insorge tra gli Autori intorno al canto de' Cigni. Alcuni, avendo intesa la lor voce ingrata ed aspra, non attribuiscono soavità alcuna al loro canto. Altri prestando fede alle relazioni di tanti Poeti ed Istorici non ne dubitano punto, gli celebrano per la dolcezza della loro voce, e gli credono senza dubbio canori. L'Aldrovando è di questo parere, persuaso dalla forma dell'asperarteria adattatissima a produrre qualunque suono, a cui ancora aderisce il Wormio, che nel suo Museo (Cap. XIX. pag. 299.) riporta la testimonianza di alcuni, i quali hanno ascoltato cantare i Cigni con soavissima armonia. Ma il Willughby tra gli Ornitologi chiarissimo, e Giulio Cesare Scaligero tra i Critici celebratissimo, ed altri moderni Autori giudicano tutto ciò, che si racconta del canto dei Cigni, affatto falso e favoloso. Noi seguitiamo il parere di questi ultimi, sì perchè l'esperienza c' instruisce, che il Cigno tramanda una voce discorde ed ingrata, sì perchè anche le Grue hanno l' asperarteria conformata come quella dei Cigni, e non vi è stato finora Autore, che abbia queste lodate per la dolcezza del loro canto, e per l' armoniosa modulazione della lor voce.

dum reflexa ad quemcumque sonum a Natura efformandum composita videtur; unde quae veteres de cantatione Cygnea prodiderunt, huic potissimum Avis speciei competere videntur, non vero Cygno mansueto.

De Cygnea cantatione vero lis est inter Authores haud exigua; quibusdam, qui strepetum & ingratum sonum eos quandoque edere animadverterunt, suavitatem nullam eorum cantui tribuentibus, quibusdam tot Poetarum, & Historicorum relationibus fidem adhibentibus de suavitate minime dubitantibus. In hanc sententiam inclinat Aldrovandus, argumento ab asperae arteriae conformatione ducto, ad omnes sonos formandos aptissima; cui etiam favet Olaus Wormius, qui in suo Museo [Cap. XIX. pag. 299.] nonnullorum refert testimonia, qui Cignos suavissimam harmoniam modulantes audivere. At Willughbejus inter Ornithologos clarissimus, & Julius Caesar Scaliger inter Criticos celeberrimus, aliique recentiores id falsum fabulosumque judicarunt. Istorum nos in sententiam descendimus, tum quia experientia constat Cygnum inconcinnam & ingratam edere vocem, tum quia aspera arteria eodem modo conflata Grus donatur; Gruem tamen nemo, quod scimus a cantu aut musica vocis modulatione commendat.

T. DLV. B. 1. 6. 8.

CIGNO DELLA CHINA BIANCO — Lat. *Cygnus Sinensis albus*; Gerin. ornith. Num. 578. —

ABita questo Uccello nella China, ove per antico costume di quegli abitanti suol essere addomesticato, e nutrito nelle loro case, come appresso di noi suol farsi delle Anatre. Egli è dotato di alcuni speciali caratteri, che servono a farlo distinguere da tutte le altre specie di Cigni rammentate e descritte dagli Ornitologi. Le sue piume sono in gran parte bianchissime, o tendenti talvolta al color di perla, specialmente quelle che servono a cuoprire le ali, e la coda. Le palpebre dei suoi occhi sono di un color giallo pagliato con qualche stria sanguigna. Il becco pure è giallo, sparso di macchie, e linee rossiccie; ed alla

HAbitat haec Avis apud Sinenses, qui longo Nationis usu, eam alere & cicurare solent in propriis domibus, uti de Anatibus apud nos fieri solet. Distinguitur illa aliquibus praecipuis characteribus, quibus praedita est, ab omnibus aliis Cygni speciebus, quas Ornithologi describunt, atque commemorant. In hac ave omnes pennae magna ex parte candidae sunt, vel interdum ad subcoeruleum colorem vergunt, signanter tectrices alarum & caudae. Oculorum palpebrae elegantes subflavae sunt, ac striis sanguineis sparguntur. Rostrum pariter flavum, maculis ac lineis rufis pictum, & ad mandibulae superioris basim, tuberculum attollitur erectum, rotundum, & carnosum,

alla baſe della mandibula ſuperiore ſi oſſerva un rilevato tubercolo rotondo, e carnoſo del medeſimo colore, eccettuata la di lui baſe, la quale compariſce più ſcura. Le gambe ſono anch' eſſe di color giallo, come pure i piedi, le dita, e le membrane, che le tengono unite. Queſta ſpecie di Cigno, benchè creduta da alcuni Scrittori l' *Anatra di Moſcovia* deſcritta dal Briſſon, nientedimeno i ſopraccennati caratteri, dei quali ella è dotata, la fanno baſtantemente diſtinguere da tale ſpecie.

noſum, eodem flavo colore ac roſtrum imbutum, attamen in ipſius exortu fuſcum apparet. Crura, pedes, & digiti, ſicuti etiam illorum membranae flaveſcunt. Haec Cygni ſpecies quamvis ab aliquibus ſcriptoribus credita Anas Moſcovitica *Briſſonii, attamen praedicti characteres, quibus praedita eſt, ſatis eam diſcrepare faciunt a memorata Anatis ſpecie.*

T. DLVI. B. 1. 10. —

CIGNO DELLA CHINA FALBO — Lat. *Cygnus Sinenſis ex flavo luteus*; Gerin. Ornith. Num. 579. — *Habitat in Sinenſi Regno, & ejuſdem ſupradictae ſpeciei creditur varietas.*

T. DLVII. B. 1. 13. 1.

CIGNO DELLA CHINA VARIO — Lat. *Cygnus Sinenſis verſicolor*; Gerin. Ornith. Num. 580. — *Habitat in Sinenſi Regno, & eiuſdem pariter creditur ſpeciei, varietas.*

T. DLVIII. B. 1. 6. 8.

OCA comune detta in qualche luogo d'Italia PAPERA, e PAVARA — Lat. *Anſer vulgaris*; Gerin. Ornith. Num. 582. — *Anſer*; Geſn. Rzac. Charlet. & Friſch. — *Anſer domeſticus*; Geſn. Aldrov. Ionſt. Willugh. Raj. Schwench. Sloane, Sibbald. & Proſper. Alp. — *Anſer domeſticus, ruſticus*; Klein. — *Anas*; Moehr. — *Anſer domeſticus*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 7. & Briſſ. Tom. VI. pag. 262. ſp. 1. — *Gall. l' Oye domeſtique*, a nonnullis vero Mas *Jars*, Foemina *Oye*, & Juvenis *Oyſon* — Angl. *Tome Gooſe*.

QUanto ſopra abbiamo detto dei Cigni, il medeſimo ſi può ſimilmente affermare delle Oche, cioè eſſere Uccelli anfibj, e come dice Varrone frequentare non ſolo la terra, ma ancora le acque. Non trovaſi ſulla Terra Paeſe alcuno ſprovveduto affatto di Oche; ſcrive tuttavia Strabone eſſervi nell' Arabia una Provincia verſo mezzo giorno fertile d' ogni genere di Uccelli fuorchè di Oche e di Galline. Appreſſo di noi però ſono eſſe da per tutto in grande abbondanza.

Per quello che appartiene al loro volo, atteſa la gravezza del corpo, mai per l' ordinario non ſi ſollevano appreſſo di noi da terra; quanto meno però hanno poſſanza nelle ali, tanto più poſſono co' piedi, a ſegno che col loro cammino pedeſtre ſi conducono in lontani Paeſi, ed ai tempi di Plinio ſolevano a piedi giungere a Roma fino dalle ultime Fiandre.

La voce dell' Oca è diſgradevole ed aſpra, e come dice Alberto Magno è Uccello clamoroſo che quaſi mai non ſi acquieta; quan-

QUod de Cygnis ſuperius traditum eſt, id modo de Anſeribus ſimiliter eſt aſſerendum, amphibias ſcilicet Aves eſſe, hoc eſt, ut Varro ait, non terram ſolum, ſed et aquas exquirere. Nulla in orbe terrarum Regio eſt, quae Anſeres non alat; ſcribit tamen Strabo, Arabiae partem, quae Auſtrum verſus adſurgit, Aves omnis generis habere, praeter Anſeres ex Gallinas. Apud nos magna eſt ubique eorum copia.

Quod ad volatum attinet; ob corporis gravitatem nunquam fere in noſtris hiſce Regionibus ſe humo tollunt; quanto vero minus alis, tanto magis pedibus valent, ita ut pedeſtri itinere in longinquas Regiones poſſint pervenire; unde Plinii tempeſtate ab extremo Belgio Romam uſque pedibus venire ſolebant.

Anſer ingratam & obſtreperam vocem habet, & ut ait Albertus, clamoſus eſt, & vix un-

quando poi ella si sdegna tramanda un fischio simile a quello dei Serpenti.

Per ciò che appartiene alla loro generazione, esse si congiungono nell' acqua. Una volta i Naturalisti solevano destinare tre Femmine per ciascun Maschio, in oggi gliene assegnano sei. Il tempo adattatissimo per il loro accoppiamento credesi il cuore del verno. Partoriscono le più Giovani senza coito, ma depongono delle Uova sterili. Il principio di Marzo suol essere per lo più il tempo del loro parto. Covano soltanto le Femmine, ne tralasciano di covare, fintanto che non sieno venuti fuori i Pulcini, lo che accade dentro lo spazio di trenta giorni, o di 25. se la stagione sia favorevole.

Cibansi le Oche di erbe, e secondo il Palladio e Columella amano di molto le vecce, il trifoglio, il fieno greco, e la lattuga: a giorni nostri quasi ogni genere di legumi si dà loro a mangiare mescolati con crusca ed acqua tiepida: alcuni fanno cuocere della crusca con le foglie più tenere di Ortica, e danno loro un tal pasto: altri pongono loro innanzi della crusca soltanto, ed alcune volte qualche porzione di Lattuga, Cicoria, e Crescione, e di altre erbe di tal fatta, che giovano molto al difetto del loro palato: ciò fanno la mattina, la sera, ed il mezzo dì; nel rimanente del giorno sono mandate a pascolare per i prati lungo qualche Lago o Fiume sotto la custodia di un Fanciullo, che sia attento a guardare che esse non si allontanino, nè entrino in luoghi piantati, nè si cibino particolarmente di Joscjamo, e Cicuta, erbe a loro molto nocevoli, e produttrici la stessa morte.

L' età delle Oche si distende fino a sessanta anni, se noi crediamo ad Alberto. Il Willughby fu assicurato da un suo Amico degnissimo di fede, che il Padre di questo aveva posseduta un' Oca dell' età di 80. anni, che non ostante la sua vecchiezza non era punto debole o languida, e dimostrava vigore da poter vivere altrettanto, se non fosse stato costretto ad ucciderla a motivo della di lei malizia e arroganza, onde inveiva contro delle Oche più giovani.

La carne dell' Oca è dura e solida, nientedimeno una volta fu molto stimata; a nostri tempi però non è di tal pregio, e si giudica piut-

unquam tacet; cum vero irascitur sibilum edit Serpentis instar.

Quantum ad Generationem, in aqua coeunt. Singulis maribus tres olim a Physicis destinabantur foeminae, sex hodie. Tempus coeundi aptissimum in bruma. Pariunt & juvenes absque coitu, sed Ova deponunt sterilia. Pariunt ut plurimum Kalendis Martii. Incubatus a Foemina duntaxat absolvitur, nec recedit donec Pullos excusserit. Pulli intra triginta dierum spatium excluduntur, & intra viginti quinque si tepidiores dies sunt.

Anser Avis est herbivora, & juxta Palladium & Columellam vicia, trifolio, faeno graeco, & lactuca delectatur. Nostris temporibus plerique omnis ferme generis legumina Anseribus offerunt, furfure & aqua tepida commista: aliqui furfurem cum urticae foliis teneriusculis incoquunt, & simul exhibent: aliqui furfurem tantum, & aliquando lactucae aliquid, cicorii, ac nasturtii, aliarumque id generis herbarum, ad revocandum vitiosum palatum; idque mane, sero, & meridie factitant; reliquis diei horis ad prata mittuntur prope Lacum aliquem, vel Fluvium sub Pueri custodia, qui ne longius evolent observat, & a consitis locis prohibet, cavetque in primis ne Hyoscyamum, & Cicutam devorent: quod tale quid forte gustantes sopore correpti, nunquam deinde excitantur, sed vitam cum morte commutant.

Anserum aetas ad sexaginta annos protenditur, si Alberto credimus. Narravit nobis (ait Willughbejus) Amicus quidam noster fide dignissimus, Patrem suum Anserem habuisse 80. annos natum, qui prae senectute nihilo imbecillior, aut languidior redditus, etiam alios 80. annos supervicturus videbatur, ne ob malitiam ac ferocitatem, qua in Anseres juniores saeviebat, cum occidere coactus fuisset.

Anseris caro dura & solida est, nihilominus olim in cibis valde expetita; nostris temporibus non tam commendatur, & peculiaris Ju-

piuttosto particolar cibo degli Ebrei, i quali in gran copia mangiano di questi Uccelli in diverse maniere accomodati.

I caratteri delle Oche sono di avere quattro dita, tre anteriori collegate fra di loro con membrane intiere, ed uno posteriore sciolto; il dito interno per tutta la lunghezza del lato interiore orlato di membrana; le gambe poste circa la metà del corpo, fuori dell'addome, e più corte del corpo stesso, e nella parte inferiore spogliate di piume; il becco dentato a guisa di una lima, al di sopra convesso, ed alquanto spianato al di sotto, con grossezza eguale alla larghezza, e con la punta ottusa e munita di una piccola unghia.

deorum cibus existimatur, qui his Avibus diversimode praeparatis frequentissime vescuntur.

Anseris characteres sunt: digiti quatuor, tres scilicet antici membranis integris inter se connexi, posticus solutus; digitus intimus per totam lateris anterioris longitudinem membranula donatus: Crura circa corpus medium, & extra abdomen posita, corpore breviora, & in infima parte plumis denudata; Rostrum, limae instar denticulatum, superne convexum, inferne planiusculum, ipsius crassitie latitudinem aequante, apice unguiculato, & obtuso.

T. DLIX. B. 1. 12. — 1. 10. —

O C A di vario colore, detta ancora O C A P A G L I E T A N A — Lat. *Anser versicolor, quem etiam Paglietanum Anserem nonnulli vocant*; Gerin. Ornith. N. 584. — *Anser versicolor non cirratus*; Barr. — *Anser domesticus versicolor*; Briss. Tom. VI. pag. 262. sp. 1. — *Ad Gallo-Pavonis crassitiem iuxta Brissonium accedit. Huius speciei varietas est* Anser cristatus *eiusdem* Briss. pag. 265. Var. A. & *Anser versicolor cirratus* Barr. Ornith. Class. I. Gen. 11. sp. 1., *qui non discrepat nisi pennis summum caput vestientibus reliquis longioribus, & cristam efficientibus.*

T. DLX. B. 1. 10. —

O C A di vario colore detta in Italia O C A L O M B A R D E L L A — Lat. *Anser alius versicolor, quem vulgo in Italia* Lombardella *dicunt*; Gerin. Ornith. N. 583. — *Antecedentis speciei varietas creditur.*

T. DLXI. B. 1. 6. —

O C A salvatica — Lat. *Anser sylvestris.* — *Anser cinereus corpore subrotundo*; Barr. — *Anser sylvestris*; Frisch. & Prosp. Alp. — *Anser ferus, sylvestris, vel immansuetus*; Gesn. — *Anser ferus*; Gesn. Aldrov. Schwenck, Jonst. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Rzac. & Marsil. — *Anser ferus simpliciter*: Klein. — *Anser ferus alius, sive tertius sylvestris*: Aldrov. — *Anser ferus alius, sive Flandricus*; ejusdem. — *Anser palustris noster*, Grey Lagg *dictus*; Raj. — *Anas rostro semicylindrico, corpore supra cinereo, subtus pallidiore, collo striato*; *Anser ferus*; Linn. Syst. Nat. Gen. 61. sp. 7. var. 1. — *Anser sylvestris*; Briss. Tom. VI. pag. 265. sp. 2. — Gall. *L'Oye sauvage* — Angl. *Common Wild Goose.*

L'Oca salvatica tanto nella grossezza, come nella figura del corpo, e nei colori poco o nulla diversifica dall'Oca domestica. Essa per lo più si trattiene intorno alle paludi, ed è Uccello di passo.

Le Oche salvatiche nell'accingersi al loro passaggio fanno grande strepito colle ali e con la voce, forse perchè alcuna di loro non rimanga in Paese. Nell'Etiopia vi passano a branchi, ed in tanto numero, che tutto mettono a guasto col loro morso, e coi lo-

Magnitudine Anserem domesticum aequat, estque figura corporis ei persimilis, nec colore multum abludit.

Locus feris Anseribus maxime circa Paludes est. Migratoriae sunt Aves. Migraturae vociferantur, alisque obstrepunt, forte ne quae earum remaneat. In Aethyopia adeo frequentibus agminibus grassantur, ut tum morsu, tum stercoribus omnia demoliantur. In Septentrione cu-

ba-

loro esercmenti. Nel Settentrione veggonsi in grande abbondanza sul tempo della lor eova circa il principio d'Aprile, facendo allora ritorno dalle parti meridionali. Incominciano a congiungersi dopo il solstizio d'Inverno, e depongono sul principio di Primavera al più sedici Uova. Esse divengono sterili ogni qualvolta sieno prese e rese mansuete.

bationis tempore, quo a meridionalibus plagis redeunt, copiosissime visuntur circa Aprilis initium. Coire post hyemale solstitium incipiunt, initio veris Ova ad summum sexdecim ponunt. Steriles evadunt si mites redditae fuerint.

T. DLXII. B. 1. 1. 1.

OCA settentrionale di piume morvidissime detta dagli Abitanti dell'Isola di Ferroë EIDER — Lat. *Anas septentrionalis plumis mollissimis — Anser plumis mollissimis Willughbeii*; Klein. — *Anas S. Curberti, seu Farnensis*; Willugh. & Raj. — *Eider, Anas plumis mollissimis*; Mus. Worm. — *Eider, Anas plumis mollissimis Wormii*; Willugh. & Sibbald. — *Avis inter Anserem & Anatem feram media*; Mus. Best. — *Anser maior albus, & fuscus*. Edward. Tab. 98. — *Anas rostro cylindrico, cera postice bifida rugosa. Anas mollissima*; Linn. Syst. Nat. Gen. 61. sp. 12. — *Anser Lanuginosus, sive Eider*; Briss. Tom. VI. pag. 294. sp. 13. — Gall. *L'Oye a duvet, ou l'Eider.* — Angl. *Cutbert-Duck.*

TRovansi questi Uccelli nelle Provincie Settentrionali, e particolarmente nell'Isole Ferroensi, e nell'Islanda. La Femmina per la sua grandezza e figura conviene col Maschio, differisce soltanto per il colore, essendo scura, e sparsa di alcune macchie nere. Depongono cinque o sei uova alla volta nel loro nido costruito di muschi, e di lanugine, che ritraggono dal loro corpo medesimo. Questa lanugine, detta dai Francesi *ederdon*, viene raccolta e tenuta in somma stima per formarne dei guancialoni da tenersi sopra i letti per riscaldarsi particolarmente i piedi, detti *Piumini*, e che realmente riscaldano infinitamente, nel tempo che sono leggierissimi.

Se, prima che la Femmina termini di covare, avvengache le si tolga il nido, un altro tosto ne costruisce, e vi depone tre uova; se quindi le si tolga il secondo, ne fabbrica di nuovo un terzo, dove partorisce un sol uovo. Quest'uccello tiene come un luogo di mezzo tra il genere delle Oche e delle Anatre, ma per la figura sembra che più all'Oca, che all'Anatra si assomigli.

IN septentrionalibus Regionibus, ac in Insulis Feroensibus & Islandia hae praecipue reperiuntur Aves. Foemina cum Mare convenit, & ejusdem est magnitudinis, & figurae, sed non nisi unius coloris, fusca, maculis quibusdam nigris hinc inde conspersa. Quinque vel sex ova ponunt in nido, musco, & ipsarum lanugine, ab ipsis-met arrepta conflato. Pretiose autem colligitur ista lanugo, quae Gallice cderdon *vocatur, & ex illa magna pulvinaria, sive stragula, praecipue pro pedum in Lectis tegumento, conficiuntur, quae tegumenta levissima sunt, maximumque calorem producunt.*

Si ante perfectam incubationem nidus arripiatur, foemina alterum construit, ibique tria ova ponit; si secundus nidus iterum arripiatur, tertium aedificat, & in eo ovum unicum ponit. Avis haec inter Anserem & Anatem locum tenet, sed magis ad Anseris, quam ad Anatis figuram accedit.

6. OCA salvatica del Nord — Lat. *Anser Septentrionalis Sylvestris*; Briss. Tom. VI. pag. 269. sp. 3. — *Anas cinerea fronte alba. Anser erythropus*; Linn. Syst. Nat. Gen. 61. sp. 8. — *Cum nostrate crassitie circiter convenit. In Septentrionalibus Regionibus habitat.*
7. OCA salvatica del Canadà — Lat. *Anser ferus Canadensis, Edward. Tab.* 151. — *Anser Canadensis*; Willugh. Raj. & Klein. — *Anser Canadensis Willughbeji*; Sloane — *Anas fusca, capite, colloque nigro, gula alba. Anser Canadensis*. Linn. Syst. Nat. Gen. 61. sp. 9. — *Anser Canadensis Sylvestris*; Briss. Tom. VI. pag. 272. sp. 4. — *Anserem domesticum paululum crassitie superat. Habitat in Americae Septentrionali Regione.*
8. OCA salvatica della Baja d'Hudson — Lat. *Anser sylvestris Freti Hudsonis*; Briss. Tom. VI. pag. 275. sp. 5. — *Anser Canadensis alis caeruleis*; Edward. Tab. 152. — *Anas grisea subtus alba, rectricibus alarum, dorsoque postico caerulescentibus. Anser caerulescens*; Linn. Syst. Nat. Gen. 61. sp. 10. — *Nostratem crassitie circiter aemulatur. Habitat in Freto Hudsonis, & Canada.*
9. OCA di Moscovia — Lat. *Anser Moscoviticus*; Briss. Tom. VI. pag. 277. sp. 6. — *Anser Rusticus*; Klein — *Anser rostro Semicylindrico atro basi gibba, minor: Cygnoides Orientalis*; Linn. Syst. Nat. Gen. 61. sp. 2. Var. 1. — *Anserem domesticum crassitie superat. Habitat in Moscovia.*
10. OCA della Guinea — Lat. *Anser Guineensis*; Briss. Tom. VI. pag. 280. sp. 7. — *Anser Hispanicus, an potius*

tius Guineenſis ; Willugh. & Klein. — *Anſer Hiſpanicus, ſeu Cygnoides* ; Marſil. — *Anſer Cygnus Guineenſis* ; Raj. — *Anſer Chinenſis* ; Friſch. — *Cygnus ſubfuſcus, collo longiori, roſtro latiori baſi gibbo* ; Browne — *Anas roſtro ſemycilindrico baſi gibbo. Cygnoides Auſtralis* ; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 2. — *Cum praecedente craſſitie circiter convenit, Habitat in Guinea.*

11. Oca di Gambia — Lat. *Anſer Gambenſis* ; Willugh. & Briſſ. Tom. VI. pag. 283. ſp. 8. — *Craſſitie Anatem Moſchatam adequat, ſed cruribus donatur magis elongatis. Habitat in Gambenſi Regno verſus Promontorium viride.*

12. Oca ſtata detta da alcuni di Egitto, e da altri di Spagna — Lat. *Anſer aliis Aegyptiacus, nonnullis Hiſpanicus.* — *Anſer Ægyptiacus* ; Briſſ. Tom. VI. pag. 284. ſp. 9. — *Anſer Hiſpanicas parvus* ; Raj. — *Anatem moſchatam craſſitie non multum excedit. Piſcinas frequentat.*

13. Oca Nivale — Lat. *Anſer niveus* ; Briſſ. Tom. VI. pag. 288. ſp. 10. — *Anſer grandinis* ; Shwenck — *Anſer grandinis, nivis, hibernus Schvenckfeldii* ; Klein. — *Cum Anſere Sylveſtri magnitudine & craſſitie circiter convenit. Aeſtate nunquam in conſpectum veniunt hujus ſpeciei Anſeres* ; *hyeme autem gregatim volant.*

14. Oca arborea, detta ancora dagli Autori Bernicla — Lat. *Anſer arboreus, a nonnullis etiam* Bernicla *dictus* ; — *Anſer Brenta* ; Klein — *Anſer Arborum* ; Geſn. — *Anſer arboreus Geſneri* ; Schwenck. — *Anſer arboreus Geſneri* ; *Anas arborea Schvvenckfeldii* ; Rzac. — *Bernicla* ; Charlet. — *Bernicla ſeu Bernacla* ; Raj. Willugh. & Sibbald. — *Bernicla, vel Branta Anglorum* ; Geſn. — *Branta vel Bernicla* ; idem — *Branta, ſeu Bernicla* ; Aldrov. — *Branta, ſeu Bernicla, & Bernichia* ; Jonſt. — *Anas fuſca, capite, collo, pectoreque nigris, collari albo. Bernicla* ; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 11. — *Anſer Bernicla* ; Briſſ. Tom. VI. pag. 300. ſp. 14. — *Anſeri domeſtico multum craſſitie cedit. Juxta Maris littora verſatur.*

15. Oca arborea minore — Lat. *Anſer Arboreus, ſeu Bernicla minor*, — *Anſer Brenta* ; Klein. — *Brenthus* ; Geſn. Aldrov. Jonſt. Willugh. & Raj. — *An Anſer, ſive Anas montana Spitzbergenſis Friderici Martenſii* ; Raj. — *Anſer Bernicla minor* ; Briſſ. Tom. VI. pag. 302. ſp. 15. — *A praecedente multum craſſitie ſuperatur. Juxta Maris littora verſatur, & fluminum oſtia frequentat.*

16. Oca detta comunemente Brenta dagli Autori — *Anſer Ornithologis* Brenta — *Anſer Brenta* ; Klein — *Brenta* ; Willugh. & Raj. — *Branta* ; Charlet. — *Bernicla Authoris* ; Aldrov. — *Bernicla Brenta* ; Jonſt. — *Anas torquata Bellonii* ; Jonſt. & Aldrov. — *Glaucius* ; Friſch. — *Anſer Brenta* ; Briſſ. Tom. VI. pag. 304. ſp. 16. — *Cum Anate Moſchata craſſitie circiter convenit juxta Maris littora verſatur.*

T. DLXIII. B. — 16. —

ANATRA domeſtica di vario colore — Lat. *Anas domeſtica verſicolor* ; Gerin. Ornith. Num. 616. — *Anas verſicolor cauda brevi, acuta, ſurſum reflexa* : Barr. — *Anas* ; Geſn. Aldrov. Rzac. Moehr. — *Anas cicur* ; Geſn. — *Anas domeſtica* ; Aldrov. Schwenck. Jonſt. Charlet. & Proſp. Alp. — *Anas domeſtica vulgaris* ; Willugh. Raj. Sloane, Sibbald. & Klein. — *Anas domeſtica varie variegata, pennis uropygii ſurſum recurvis* ; Browne — *Anas aurantia, Turcica quibuſdam dicta* ; Marſil. — *Anas rectricibus intermediis (Maris) recurvatis, roſtro recto. Anas domeſtica* ; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 34. Var. 1 ; — *Anas domeſtica* ; Briſſ. Tom. VI. pag. 308. ſp. 1. Gall. *Le Canard domeſtique* — Angl. *Common Tame Duck.*

ESſendo le Anatre Uccelli *palmipedi*, coſta per eſperienza, ed è confermato dall' autorità dei più celebri Ornitologi, che eſſe non ſolo dalla terra, ma eziandio dall' acqua ricavano il loro vitto. Riferiſce Alberto, che col becco ſcavano il fango depoſitato nelle acque, dove ritrovano delle radici di erbe, dei ſemi di piante aquatiche, dei vermi, delle uova di Animali parimente aquatici, ed altre coſe di tal fatta. Sonovi ancora Autori, i quali vogliono, che eſſe ſi cibino di piccoli peſci, come anche di fango, e dell' immondezze delle acque, e che neppure ſi aſtenghino dal mangiare animali velenoſi, come ragni, lucerte, roſpi ec. lo che ci viene atteſtato da Giulio Ceſare Scaligero; onde non dobbiamo maravigliarci di Plinio e di Aulo Gellio, e di altri antichi Autori, i quali ſcrivono, che le Anatre del Ponto vivano di veleno. Ordinariamente però ſi paſcono di radi-

ANates cum ſint palmipedes, *non ſolum e terra, ſed etiam ab aqua ſibi victum petere experientia docet, & eſt graviſſimorum Ornithologorum auctoritate confirmatum. Tradit Albertus, roſtro fodere coenum in aquis, ubi reperiunt radices herbarum, & ſemina plantarum aquaticarum, & vermes, & ova animalium aquaticorum, & alia hujuſmodi. Sunt qui piſciculis quoque, & limo, ſordibuſque aquarum veſci velint, nec a venenatis etiam animalibus ſibi temperare, ut araneis, lacertis, bufonibus ec. ut reſtatur Julius Caeſar Scaliger: quare Plinium, Aulum Gellium, alioſque veteres amplius non mirari debemus, qui Anates Ponticas ſcribunt veneno vivere. Communiter autem radicibus herbarum, avena, aliiſque id generis cibis paſci ſolent. Aves vero ſunt admodum voraces, ut quaecumque ipſis occurrunt, ingurgitent.*

radiche di erbe, di avena, e di altri cibi di tal ſorte; sono però Uccelli così voraci, che ingollano senza alcuna diſtinzione tutto eiò che ſi para loro innanzi.

La voce delle Anatre è ſtridula, e lamentevole; onde Giulio Cesare Scaligero chiama l'Anatra *queritatricem* dal verbo *queritor*, che ſignifica *lamentarſi*. Scrive Alberto, che in ogni genere di Anatre la voce della Femmina è più groſſa, e quella del Maſchio più acuta.

Le Anatre domeſtiche non sogliono punto sollevarſi a volo, mentre queſto è soltanto proprio delle salvatiche: ed intorno a ciò che appartiene al loro camminare, correre, e nuotare, ſono pigre nel camminare, tarde nel correre, e veloci nel nuotare.

Per quanto riguarda la loro generazione, eſſe ſono in guiſa luſſurioſe, che molti Maſchi coprendo a gara una ſola Femmina, ſpeſſe volte l'uccidono. Si accoppiano nel Meſe di Marzo o di Aprile.

Partoriſcono vicino alle acque, ed ai rigagnoli: i loro Pulcini appena venuti fuora dall'Uovo, toſto per un certo naturale Inſtinto cercano l'acqua, e ſono di tanta agilità e vigore, che ſebbene venga loro tolta la Madre, vivono e ſi nutriſcono ſenza di eſſa.

Le Anatre molto alle Oche ſi aſſomigliano, e vengono perciò contraſſegnate con i medeſimi caratteri di quelle.

Anatum vox ſtridula, querulaque; quare Julius Caeſar Scaliger queritatricem *Anatem appellat a verbo* queritor, *quod lamentari ſignificat. Scribit Albertus in omni Anatum genere vocem Foeminae craſſiorem eſſe Maris acutiorem.*

Anates domeſticae minime volatu poſſunt; hic tantum Sylveſtribus convenit. Quod vero ad greſſum, curſum, & natatum attinet, in greſſu pigres, in curſu tardae, in natatu veloces ſunt.

Quantum ad generationem, tantae ſunt ſalacitatis, ut plures Mares ſolam Foeminam certatim cocundo ſaepiſſime occidant. Menſe Martio, & in ſequente concumbunt.

Pariunt juxta aquas, & rivulos: Pulli excluſi ſtatim inſita quadam natura aquam proſequuntur, & mox ut ovum exeunt, tanta agilitate vigent, ut etiamsì Matrem mori, vel alienari contigerit, ſine nutricae vivunt.

Anates maxime cum Anſeribus conveniunt, ideoque iiſdem Anſerum characteribus diſtinguuntur.

T. DLXIV. B. — 17. —

ANATRA domeſtica bianca, Femmina — Lat. *Anas domeſtica alba, Foemina*; Gerin. Ornith. N. 617. — *Foemina magnitudine paululum Mari cedit. Illius inſtar colore variat. Ab illo ſolummodo differt quatuor caudae rectricibus intermediis nunquam ſurſum reflexis ut in Mare.*

T. DLXV. B. — 19. —

ANATRA domeſtica di becco incurvato — Lat. *Anas domeſtica roſtro incurvo*; Gerin. Ornith. N. 618. — *Anas adunco roſtro*; Klein. — *Anas roſtro aduncо*; Willugh. — *Anas domeſtica roſtro aduncо*; Raj. — *Anas rectricibus intermediis (Maris) recurvatis, roſtro incurvato. Anas adunca*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 35. — *Anas roſtro incurvo*; Briſſ. Tom. VI. pag. 312. ſp. 2. — Gall. *le Canard a bec courbé* — Angl. *Hook bill'd Duck*. — *Anati domeſticae vulgari externa facie ſimillima eſt; roſtro verò differt, quod latum eſt, longius paulo quam vulgaris, & deorſum modice inflexum ſeu aduncum. Caput quoque (Autore Willughbejo) minus & gracilius eſſe videtur.*

T. DLXVI. B. — 18. —

ANATRA domeſtica di becco incurvato, altra varietà — Lat. *Anas domeſtica alia roſtro incurvo*; Gerin. Ornith. N. 620.

T. DLXVII. B. — 18. —

ANATRA domeſtica ſcura di becco incurvato, Femmina; — Lat. *Anas domeſtica fuſca roſtro incurvo, Foemina*; Gerin. Ornith. N. 619. — *Foemina magnitudine paulum Mari cedit. Illius inſtar colore variat. Ab illo ſolummodo diſcrepat quatuor caudae rectricibus intermediis nequaquam ſurſum reflexis.*

T. DLXVIII. B. 1. 1. —
1. 2. —

ANATRA d'India — Lat. *Anas Indica*; Gerin. Ornith. N. 621. — *Anas maxima capite cera interrupta obducto*; Browne — *Anas moſchata*; Willugh. Raj. & Sloane. — *Anas Americana moſchata*; Barr. — *Anas Cairina*; Aldrov. Jonſt. & Cherlet. — *Anas Moſchata Cairina Aldrovandi*; Marſil. & Willugh. — *Anas peregrina*; Schwenck. — *Anas Moſcovitica*; Charlet. — *Anas Indica*; Geſn. Aldrov. & Charlet. — *Anas Indica Geſneri*; Klein. & Barr. — *Anas Indica Geſneri, Aldrovandi*; Willugh. — *Anas Indica prima*; Jonſt. — *Anatis Indicae rara quaedam ſpecies*; Geſn. — *Anas Indica alia*; Geſn. & Aldrov. — *Anas Indica altera*; Ionſt. — *Anas Indica tertia*; Aldrov. — *Anas Lybica*; Ionſt. & Charlet. — *Anas Lybica Bellonii*; Aldrov. — *Anas Lybica alia*; idem. — *Anas Lybica Aldrovandi*; Ionſt. — *Anas Lybica Aldrovandi, Bellonii*; Willugh. — *Anas ſylveſtris magnitudine Anſeris*; Marcgr. — *Anas ſylveſtris Braſilienſis magnitudine Anſeris*; *Marcgravii*; Willugh. & Raj. — *Anas Moſchata facie nuda papilloſa*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 13. — *Anas Moſchata verſicolor capite papilloſo*; Briſſ. Tom. VI. pag 313. ſp. 3. — Gall. *le Canard muſqué* — Angl. *Muſcovy-Duck*.

IN diverſa maniera, e ſotto nome diverſo viene queſt'Anatra deſcritta dagli Autori. Alcuni la chiamano *Cairina*, alcuni *Moſcata*, altri *Libica*, altri *Indiana*; ma tanto queſta da noi rappreſentata, quanto l'Anatra *Moſcata* del Briſſon e di Linneo, la *Libica* del Bellonio e dell'Aldrovando, la *Cairina* dello ſteſſo, e l'*Indiana* del Geſnero, crediamo non altro eſſere che il medeſimo Uccello. Nè a ciò fa oſtacolo alcuno la varietà dei colori, onde queſte ſono deſcritte dai loro Autori; imperciocchè non ſi danno Uccelli, che tanto nei colori diverſifichino, quanto le Anatre.

Le Anatre di queſta ſpecie ſono munite di un membro genitale di color ſanguigno, della groſſezza di un dito, e di quattro o cinque dita traſverſe di lunghezza.

Se non eſigeſſero molta ſpeſa, in più numero di quello, che ſi ſuole, verrebbero appreſſo di noi alimentate; mentre porgendoſi loro del cibo in ſazietà, partoriſcono molte Uova, ed in breve tempo danno alla luce un numero grande di Pulcini.

La loro voce non aſſomigliaſi a quella delle altre Anatre, ma è rauca, quale ſuol procedere dalle fauci di un qualchè Uomo catarroſo. La loro carne viene giudicata al ſapore eguale affatto a quella dell'Oca, o dell'Anatra domeſtica.

AUthores diverſimode, & ſub diverſo nomine Anatem hanc deſcribunt, alii Cairinam, *alii* Moſchatam, *nonnulli* Lybicam, *nonnulli* Indicam *nuncupantes. At Anatem hanc noſtram, Anatem* Moſchatam *Briſſonii & Linnaei, Anatem* Lybicam *Bellonii & Aldrovandi, Anatem* Cairinam *Aldrovandi*, & Indicam *Geſneri eamdem Avem eſſe opinamur. Nec obſtat colorum varietas, qua depinguntur; Anates enim ſuper omnes alias Aves ſummopere colore variant.*

Hujuſmodi ſpeciei Aves membrum genitale tam magnum habent, ut digiti unius craſſitiem, quatuor vero, aut quinque longitudinem aequet, ſanguis inſtar rubrum.

Niſi magnum requirerent ſumptum, numeroſiores quam ſolent alerentur: ſi etenim cibus ad ſatietatem offeratur, multa pariunt ova, & magnum brevi excludunt Pullorum numerum.

Vox illis non qualis caeteris Anatibus, ſed rauca, qualis humanis faucibus catarrho obſeſſis. Earum caro, quoad ſaporem attinet, neque praeſtantior, neque deterior eſt Anſeris aut Anatis domeſticae.

T. DLXIX. B. 1. 6. 8.

ANATRA d' India bianca, varietà dell' antecedente — Lat. *Anas Indica alba, Antecedentis varietas*; Gerin. Ornith. N. 622.

T. DLXX. B. 1. 2. —

ANATRA salvatica detta GERMANO REALE — Lat. *Anas fera*; Aldrov. Charlet. Rzac. & Briſſ. Tom. VI. pag. 318. ſp. 4. — *Anas fera torquata minor*; Geſn. — *Anas fera prima, ſeu torquata minor*; Schwenck. — *Anas fera, ſive torquata, Mas*; Friſch. — *Anas fera foemella*; idem. — *Anas fera oblongo, & craſſo corpore*; Barr. — *Anas torquata minor Aldrovandi, Boſchas major*; Raj. — *Anas ſylveſtris*; Proſp. Alp. — *Anas ſylveſtris vera Alberti*; *Anas ſylveſtris maior Peuceri*; Klein. — *Boſchas major*; Willugh. & Sibbald. — *Boſchas maior, ſive Anas torquata minor*; Aldrov. — *Anas rectricibus intermediis (Maris) recurvatis, roſtro recto; Boſchas*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 34. — Gall. *le Canard ſauvage* — Angl. *Wild-Duck*.

SAppiamo per aſſerzione dell' Ornitologo, che il Paeſe degli Svizzeri abbonda di molti generi di Uccelli Aquatici, e particolarmente di Anatre ſalvatiche, atteſa la gran quantità dei Laghi, e dei Fiumi, dai quali vienc bagnato, come ancora la Francia, la qualc è dovizioſa di Fiumi, Rivi, e ruſcelli, e di tante paludi, ed acque ſtagnanti.

Nell' Italia ancora in molti luoghi ſono frequenti, e particolarmente nelle Campagne di Ferrara, Mantova e Ravenna, dove trovanſi dei luoghi acquoſi, dei Fiumi, e dei Laghi, che ſecondo Ariſtotile ed altri vengono da loro anzioſamente ricercati. In Toſcana frequentano molto i Laghi di Bientina, e di Fucecchio, e nell' Umbria le rive del Tevere.

Non convengono gli Autori nello ſtabilire ſe eſſe ſieno Uccelli di paſſo; mentre alcuni l' affermano, altri lo negano. L' Aldrovando giudica che di loro natura non ſieno migratorie; al cui parere noi adcriſchiamo; imperciocchè in Italia ſi veggono in ogni ſtagione, e ſe vengono molcſtate dal freddo, o dal caldo intollerabile, o da altro qualunque grave incomodo; cercano dei luoghi migliori ed opportuni: dalla qual mutazione di luogo alcuni ſi ſono perſuaſi della loro migrazione.

Nell' Inverno volano a branchi, e nella Primavera a paja, cioè il Maſchio inſieme colla Femmina. Nidificano in terra appreſſo le acque, e rare volte negli Alberi: e depongono e covano dodici, e quattordici Uova alla volta e non di rado anche più.

I Ma-

Helvetiam plurimis Aquaticarum Avium generibus, Anatibus praeſertim feris abundare tradit Ornithologus propter Lacuum, & Fluviorum copiam, ſicuti quoque & Galliam, quae tot amnibus, tot rivis, rivulis, totque paludibus, aquiſque ſtagnantibus irrigatur.

In Italiae quoque pluribus locis frequens eſt earum numerus, maxime in Ferrarienſi, Ravennate, & Mantuano Agro, ubi nimirum loca ſunt aquoſa, amnes, lacuſque, qualia ipſas amare ex Ariſtotile & aliis fuit annotatum. In Etruria pariter prope Focenſem & Blentinenſem Lacum, & in Umbria iuxta Tyberim ſatis frequentes ſunt.

Diſcrepant Authores de Anatum migratione. Hanc alii affirmant, alii negant. Aldrovandus Aves migratorias ſuapte naturæ eſſe non putat; cuius in ſententiam nos quoque libenter deſcendimus: Nam in noſtris Regionibus omni tempore conſpiciuntur, & ſi frigoris aut caloris intollerabili vehementia, aut alio quopiam gravi incommodo premantur, meliora ac utiliora ſibi loca quærunt; ex qua locorum mutatione nonnulli eas migrare perſuaſi fuerunt.

Hyeme gregatim volant: Vere per paria, Mas ſcilicet & Foemina ſimul. Non procul ab aquis humi nidificant, raro in arboribus. Ova duodecim, vel quatuordecim, & plura etiam una vice ponunt, & incubant.

Ma-

I Maſchi mutano le loro penne, quando le Femmine incominciano à covare: ed alle Femmine queſte non cadono, ſe prima non ſieno i loro Pulcini fatti adulti, e capaci di volare. Le vecchie piume cadono loro dentro lo ſpazio di una ſettimana, e le nuove non rimettono loro ſennon dopo tre ſettimane.

Si può quì a propoſito ricercare, perchè agli Uccelli ogn' anno cadano le piume. Il Willughby giudica che per il medeſimo motivo, onde cadono agli Uomini i capelli, ed i peli agli altri Animali, cadano agli Uccelli le piume. Cadono agli Uomini ed agli altri Animali i peli dopo aver ſofferta qualche febbre, qualche malattìa, o qualche altro lungo incomodo. Negli Uccelli Maſchi l' ardenza del coito può riguardarſi come una febbre, e perciò in Primavera per il frequente uſo della copula eſſi divengono macilenti. Nelle Femmine poi il tempo della loro cova, e dell' allevare dei Pulcini corriſponde come ad una malattìa, e ad un lungo incomodo; di fatti in tal tempo ancor eſſe dimagrano. Paſſati queſti tempi l' uno e l' altro ſeſſo, tutto addetto a riſtabilire i loro corpi, in breve torna nello ſtato di prima ed ingraſſa: e da queſto riſtabilimento ne naſce, che dilatata la cute, ed aperti i pori, cadano le piume.

Mares pennas mutant, cum foeminae incubare incipiunt. Foeminis plumae non decidunt antequam Pulli adoleverint, & ad volandum idonei ſint. Intra hebdomadis ſpatium plumae veteres omnes defluunt; novae nonniſi ante tres ſeptimanas exactas perficiuntur.

Quaeri non immerito hic poteſt, cur Avibus plumae quolibet Anno defluant. Willughbejus eamdem eſſe cauſam opinatur defluxus pennarum in Avibus, quae pilorum in Hominibus aliiſque Animalibus a febre aliove morbo convaleſcentibus, aut a diuturna inedia refectis. In Maribus enim coeundi ardor quaedam quaſi febris eſt, adeoque verno tempore ob frequentiam veneris uſum exhauſto corpore macilenti evadunt. In Foeminis vero incubandi, & Pullos educandi tempus morbo cuidam ſeu diuturnae inediae reſpondet, inedia quippe & labore continuo ſe per id tempus macerant. Cum haec tempora praeterierint, uterque ſexus ad corpora curanda converſus priſtinum brevi habitum recuperat, & pingueſcit, atque hinc dilatata cute pori aperiuntur, & plumae decidunt.

T. DLXXI. B. — 19. —

ANATRA ſalvatica detta GERMANO FORESTIERO — Lat. *Anas Boſchas maior*; Gerin. Ornith. N. 614. — *Anas torquata maior*; Aldrov. — *Anas fera torquata maior*; Geſn. — *Anas fera torquata maior, viridis, roſtro in aliis croceo, in aliis carneo*; Barr. — *Boſchas maior Athenei*; Geſn. — *Anas fera ſecunda, ſeu torquata maior; Anas fera tertia, ſeu maior; Anas fera quarta, ſeu juncea*; Schwenck. — *Boſchas maior*; Briſſ. Tom. VI. pag. 326. Var. A. B. C. — *Briſſonius tres habet huius ſpeciei varietates, Boſcadem maiorem primam, Boſcadem maiorem griſeam alteram, & Boſchadem maiorem naeviam ultimam appellans. Anas vero noſtra torquata cum Boſchade maiore convenit* Var. A. *roſtro & pedibus cum Boſchade cinerea* Var. B., *dorſo vero flavicante maculato cum Boſchade naevia* Var. C.

3. ANATRA ſalvatica detta GERMANO FORESTIERO del Meſſico — Lat. *Anas fera, ſive Boſchas Mexicana*; Briſſ. Tom. VI. pag. 327. ſp. 5. — *Genus quoddam Anatis ferae*; Ionſt. — *Avis latiroſtra*; Nieremb. — *Avis latiroſtra, ſeu Tempatlahoac*; Raj. Willugh. & Fern. — *Magnitudine & craſſitie cum Anate domeſtica circiter convenit. Habitat in Mexico, ibique Lacus frequentat.*

T. DLXXII. B. — 16. 2.

ANATRA ſalvatica detta in Toſcana MESTOLONE, e FISTIONE, Maſchio — Lat. *Anas latiroſtra, Mas*; Gerin. Ornith. N. 597. — *Anas roſtro latiori, clypeato, pedibus rubris*; Barr. — *Anas latiroſtra*; Schwenck. — *Anas latiroſtra maior*; Geſn. & Aldrov. — *Anas latiroſtra maior Geſneri, Anas platyrinchos, Anas ſchellaria, Clangula Fabricii*; Rzac. — *Anas latiroſtra Schwenckfeldii*, Klein. — *Anas latiroſtra, ſive clypeata*; Friſch. — *Anas latiroſtra Americana*; Klein. — *Anas latiroſtra, ſive clypeata Germanis dicta*; Willugh. — *Anas platyrynchos pedibus rubris*; Ionſt. — *Alterum genus*

genus platyrhynchi Anatis; Geſn. & Aldrov. — *Anas vireſcens, ſeu capite vireſcente*; Marſil, & Klein. — *Phaſianus marinus*; Charlet. — *Anas roſtri extremo dilatato rotundato ungue incurvo. Anas clypeata*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 16. — *Anas clypeata mas*; Briſſ. Tom. VI. pag. 329, ſp. 6. — Gall. *Souchet*. — Angl. *Shoveler*. — *Anati Domeſticae paululum craſſitie cedit. Paludes frequentat. Aves haſce per hiemem colores mutare affirmant Aucupes. Geſnerus & Aldrovandus bis terve hanc Avem ſub diverſis titulis deſcriptam exhibent.*

T. DLXXIII. B. — 13. 4.

MESTOLONE o FISTIONE, Femmina — Lat. *Anas Latiroſtra, Foemina*; Gerin. Ornith. Numero 588. — *Anas latiroſtr a tertia ſuſca* (*Foemina*;) Friſch. — *Anas platyrynchos erythropos* (*Foemina*;) Aldrov. & Willugh. — *Anas platyrinchos pedibus luteis* (*Foemina*;) Aldrov. Jonſt. Willugh. & Raj. — *Anas macula alari purpurea, utrinque nigra albaque, pectore rufeſcente. Anas platyrinchos Foemina*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 17. — *Anas clypeata Foemina*; Briſſ. Tom. VI. pag. 329. ſp. 6. — *Foemina craſſitie paululum mari cedit, & a mare coloribus multum diſcrepat. Omnes hujus ſpeciei Aves roſtro donantur clypeorum inſtar convexo & longo, unde* latiroſtrae *&* clypeatae *a nonnullis dictae fuerunt.*

3. MESTOLONE o FISTIONE di ventre bianco — Lat. *Anas latiroſtra ventre albo — Anas muſcicapa, ſubtus alba, ſuperne varia, roſtro nigro*; Barr. — *Anas muſcaria*; Geſn. Aldrov. & Jonſt. — *Anas clypeata ventre candido*; Briſſ. Tom. VI. pag. 337. Var. A. — *Cum praecedente forma, magnitudine, & coloribus perfecte convenit: ab illa ſolummodo diſcrepat ventre candido. Anas haec dicitur & etiam Muſcaria, quod Muſcas ſuper aquas volantes capter.*

4. MESTOLONE o FISTIONE del Meſſico — Lat. *Anas latiroſtra Mexicana — Anas clypeata Mexicana*; Briſſ. Tom. VI. pag. 337. ſp. 7. — *Anati domeſticae paululum craſſitie cedit. Habitat in Mexico.*

T. DLXXIV. B. — 16. 2.

ANATRA ſalvatica detta in Toſcana CICALONA, e CANAPIGLIA, Maſchio — Lat. *Anas fera ſtrepera, Mas — Anas ſtrepera*; Geſn. & Aldrov. — *Anas platyrynchos roſtro nigro & plano*; Aldrov. Jonſt. & Raj. *Anas fera decima, ſeu ſtrepera*; Schwenck. — *Anas fera decima, ſeu ſtrepera Schwenckfeldii*; Klein. — *Anas macula alarum rufa nigra alba*; *Anas ſtrepera*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 18. — *Anas ſtrepera, Mas*; Briſſ. Tom. VI. pag. 339. ſp. 8. — Gall. *le Chipeau*. — Angl. *Gadwal.*

T. DLXXV. B. — 16. 2.

CICALONA e CANAPIGLIA, Femmina — Lat. *Anas fera ſtrepera, Foemina — Anas ſtrepera, Foemina*; Briſſ. Tom. VI. pag. 339. ſp. 8. — *Foemina a Mare diſcrepat corpore ſuperiore pennis veſtito fuſcis, & ventre albo. in reliquis cum illo ſatis bene convenit.*

T. DLXXVI. B. 1. 2. —

VOLPOCA, detta dagli Autori TADORNA — Lat. *Vulpanſer, Ornithologis Tadorna*; Gerin. Ornith. Num. 615. — *Anas longiroſtra quarta*; Schwenck. — *Anas maritima*, Geſn. *Anas maritima Rondeletii*; Jonſt. — *Anas Indica quarta, ſeu Anas maritima*; Aldrov. — *Anas Tadorna Bellonii*; *Vulpanſer quibuſdam*; Willugh. — Tadorne *Gallis dicta*; Aldrov. — *Tadorne*; Jonſt. — *Vulpanſer*; Geſn. Aldrov. & Klein. — *Vulpanſer, Chenelopex quibuſdam*; Jonſt. — *Bergander Aldrovandi*; Willugh. — *Anas roſtro ſimo, fronte compreſſa, corpore albo variegato*; *Tadorna*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 3. — *Anas Tadorna*; Briſſ. Tom. VI. pag. 344. ſp. 9. —. Gall. *la Tadorne*. Angl. *Burrough-Duck.*

QUeſt' Uccello detto da noi Volpoca, e dagli Autori Tadorna è vagamente contraſſegnato dai ſuoi elegantiſſimi colori, nero, bianco, e ſcuro, e perciò belliſſimo è da lungi a vederſi, e faciliſſimo a riconoſcerſi. Egli frequenta molto i luoghi marittimi del Principato

Vulpanſer pulcherrimis coloribus, albo, nigro, leucophaeo varia & diſtincta, e longinquo ſpectabilis & cognitu faciliſſima eſt. Maritima Cambriae loca, quin & Orientale Angliae latus magno numero frequentat.

pato di Galles; e la parte Orientale di Inghilterra.

Geſnero ci ha laſciati in curioſità di ſapere, ſe egli ſia l' *Oca Stellata*. L' Aldrovando non ha ſopra di ciò aſſerita coſa alcuna di certo. Ariſtotile gli dà luogo tra gli Uccelli palmipedi, che ſi raggirano intorno le acque. Tutti però gli Ornitologiſti convengono, che egli debba porſi nel numero piuttoſto delle Anatre, che delle Oche.

Queſt' Uccello ha ottenuto il nome di Volpoca, sì per eſſere più ſimile all' Oca, che all' Anatra, sì perchè nell' aſtuzia viene aſſomigliato alla Volpe, ſul cui eſempio coſtituiſce il ſuo nido nelle foſſe ſotterranee, ed alcune volte nelle caverne delle rupi.

Geſnerus an Anſer ſtellatus *ſit Vulpanſer, conſiderandum reliquit. Aldrovandus nihil certi proferre potuit. Inter palmipedes, quae circa aquas verſantur ab Ariſtotile numeratur. At inter Anates potius quam Anſeres reponendum eſſe fere omnes recentiores Ornithologi conveniunt.*

Avis haec Vulpanſeris nomen obtinuit, tum quia plus Anſeris quam Anatis figuram referat, tum quia calliditate Vulpi aſſimiliter, & inſtar Vulpium in cuniculorum foveis, interdum in rupium cavernis nidificat.

T. DLXXVII. B. — 16. 1. ½

ANATRA d' Inverno detta in Toſcana GOBBO e RUGGINOSO. Maſchio Lat. *Anas hyberna Mas*; Gerin. Ornith. Num. 610. — *Anas minor capite purpureo*; Klein. — *Anas alibida dorſo remigibuſque nigris, capite ſupra infraque rumido ſericeo nitente. Anas bucephala*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 19. — *Anas hyberna, Mas*; Briſſ. Tom. VI. pag. 349. ſp. 10. — Gall. *le Canard d' Hyver* — Angl. *Buffel S. Head Duck.* — *Anas haec in Etruria apud Blentinenſem & Focenſem Lacum hyeme frequens. Anas hyberna tam Mas, quam Foemina a Briſſonio ſupra deſcripta Avis eſt Americana, & habitat in Carolina ſed hyeme tantum.*

T. DLXXVIII. B. 1. 2. —

ANATRA d' Inverno detta in Toſcana GOBBO e RUGGINOSO, Femmina — Lat. *Anas hyberna Foemina*; Gerin. Ornith. Num. 612. — *Anas hyberna in toto corpore fuſco*; Briſſ. Tom. VI. pag. 349. ſp. 10. — *Foemina a Mare diſcrepat colore in univerſo corpore fuſco.*

T. DLXXIX. B. — 16. 1.

ANATRA di Eſtate — Lat. *Anas aeſtiva*, Briſſ. Tom. VI. pag. 351. ſp. 11. — *Anas fuſca criſtata, ad gulam alba, iride flammea*; Browne. — *Anas criſtata Americana*; Klein. — *Avis non conſiſtens*; Euſ. Nieremb. & Willugh. — *Avis varii capitis*; Fern. & Raj. — *An Anas varia criſtata. Feuillée* — *Anas criſtatus, elegans*; Edward. Tom. II. pag. 101. — *Anas criſta dependente duplici viridi-caeruleo alboque varia ſparſa*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 37. — Gall. *Le Canard. d' été* — Angl. *American Wood Duck.* — *Anates hae habitant in Carolina & Virginia, ibique in foraminibus Arborum in aquis creſcentium edificant. Foemina a Mare diſcrepat colore in univerſo corpore fuſco* —

T. DLXXX. B. — 16. —

ANATRA col collare dell' Iſola di Terra nuova — Lat. *Anas torquata ex Inſula Terrae novae*; Briſſ. Tom. VI. pag. 362. ſp. 14 — *Anas fuſca, albo, caeruleoque varia, auribus, temporibus linea gemina, collari, faſciaque pectorali albis. Anas hiſtrionica*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 30. — *Anas, fuſcus, maculatus*; Edward. Tom. II. pag. 99. — Gall. *la Canard a collier de Terre neuve* — *Avis eſt pulcherrima. Anatem domeſticam craſſitie circiter aemulatur. Habitat in Inſula Terrae novae.*

2. ANATRA di Baama — Lat. *Anas Bahamenſis*; Briſſ. Tom. VI. pag. 358. ſp. 12. — *Anas griſea, roſtro plumbeo: macula laterali fulvia, macula alarum viridi, luteaque. Anas Bahamenſis*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 14. — *Anas Bahamenſis*; Klein. — *Anas ſylveſtris Braſilienſis* Mareca *dicta prima Marcgravii*; Willugh. & Raj. — Mareca *Anatis ſylveſtris ſpecies*; Marcgr. — *Anati domeſticae paululum craſſitie cedit. Habitat. in Bahamenſi Inſula, & Braſilia.*

3. ANATRA del Braſile. — Lat. *Anas Braſilienſis*; Briſſ. Tom. VI. pag. 360. ſp. 13. — *Anas ſylveſtris Braſilienſis*, Mareca *dicta ſecunda Maregravii*; Willugh. & Raj. — Mareca *alia ſpecies*, Marcgr. — *Cum praecedente craſſitie convenit. Habitat in Braſilia.*

4. ANA-

4. ANATRA della Baja d'Hudſon — Lat. *Anas Freti Hudſonis*; Briſſ. Tom. VI. pag. 366. ſp. 15. — *Anas roſtro baſi gibbo compreſſo; carina pennacea nigra, capite cauefcente. Anas ſpectabilis*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 4. — *Craſſitie Anatem domeſticam multum antecellit. Habitat in Freto Hudſonis.*

T. DLXXXI. B. 1. 5. —

ANATRA di coda lunga, detta in Toſcana GERMANO MARINO, e CODONE, e nel Romano CODA-LANCEA — Lat. *Anas longicauda*; Gerin. Ornith. Num. 604. — *Anas cinerea, cauda duabus pennis nigris longiſſimis deſinita*; Barr. — *Anas caudacuta*; Geſn. Aldrov. Jonſt. & Charlet. — *Anas caudacuta Aldrovandi*: Willugh. Raj. & Rzac. — *Anas caudata, ſeu caudacuta*; Friſch. — *Anas fera duodecima, ſeu caudacuta*; Schwenck. & Klein. — *Anas fera marina*; Geſn. — *Anas fera quaedam marina*; idem. — *Anas ſee-Vogel dicta*; Aldrov. — *An Anas fera ventre candido*. Sloane., Raj. & Klein. — *Anas longicauda*; Briſſ. Tom. VI. pag. 369. ſp. 16. cum accurata Maris & Foeminae icone Tab. XXXIV. — *Anas cauda acuminata, elongata ſubtus nigra, occipite utrinque linea alba. Anas acuta*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 25. — Gall. *Le Canard a longue queue, ou coque de Mer* — Angl. *ſea Pheaſan* — *Longitudine mediarum caudae pennarum Avis haec ab omnibus aliis ſui generis velut nota characteriſtica diſtinguitur. Foemina magnitudine paulum Mari cedit, coloribus ab illo diſcrepat, & cauda multo breviore donatur.*

2. GERMANO Marino, e CODONE della Baja d'Hudſon — Lat. *Anas longicauda Freti Hudſonis — Anas caudacuta Islandica* Havelda *ipſis dicta Wormii*; Willugh. — *Anas caudacuta*, Haveldac *Wormii ſimilis, ſi non eadem*; Raj. — *Anas Islandica, canda protenſa*; Klein. — *Anas Islandica protenſa cauda*, Havelda *ipſis dicta*; Mus Worm. & Charlet. — *Anas longicauda Islandica*; Briſſ. Tom. VI. pag. 379. ſp. 17. — *Anas cauda cuneata: rectricibus intermediis longis, corpore griſeo, temporibus albis. Anas hyemalis*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 26. — *Anas caudacuta Canadenſis; Edvvard. Tom. III. pag. 156.* — *Praecedentem craſſitie circiter aemulatur. Habitat in Islandia & Freto Hudſonis.*

3. GERMANO Marino, e CODONE dell'Iſola di Terra-nuova — Lat. *Anas longicauda ex Inſula Terrae novae*; Briſſ. Tom. VI. pag. 382. ſp. 18. — *Cum praecedentibus craſſitie circiter convenit. Habitat in Inſula Terrae novae.*

T. DLXXXII. B. — 16. 2.

ANATRA detta in Toſcana GERMANO COLOMBACCIO — Lat. *Anas Palumbum torquatum quodammodo referens*; Gerin. Ornith. N. 603.

T. DLXXXIII. B. — 14. —.

ANATRA PENELOPE detta in Toſcana BIBBIO CAPOROSSO, e MORIGLIONE, Maſchio — Lat. *Anas Penelope, Mas.* Gerin. Ornith. N. 589 — *Anas cinerea, vertice & collo ferrugineis*; Barr. — *Anas fuſca*; Jonſt. & Marſil. — *Anas fuſca quibuſdam media*; Charlet. — *Anas fera fuſca, vel media*; Geſn. — *Anas fera fuſca, vel mediae magnitudinis*; Aldrov. — *Anas fera fuſca, vel media Geſneri*; Klein. — *Anas fera fuſca Geſneri, Aldrovandi*; Willugh. — *Anas fera octava, ſeu Erythrocephalos primus*; Schwenck. — *Anas media Schwenckfeldii*; Rzac. — *Penelops primus Ornithologi*; Aldrov. — *Penelope*; Jonſt. & Charlet. — *Anas alis cinereis immaculatis, uropygio nigro. Anas ferina*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 27. — *Anas Penelope*; Briſſ. Tom. VI. pag. 384. ſp. 19. — Gall. *le Millouin* — Angl. *Poehard*.

MOlti tra gli Antichi hanno creduto, che *Penelope* celebratiſſima e caſtiſſima Moglie di Uliſſe prendeſſe il ſuo nome da queſt' Anatra *Penelope*, di cui ſi parla; imperciocchè dicono che *Penelope* figliuola di Icario e di Peribea eſſendo ſtata da ſuoi Parenti gettata in mare, venne traſportata al lido e ſalvata dagli Uccelli *Penelope*, e dipoi educata nuovamente dai ſuoi proprj Genitori. Ma cio è troppo favoloſo, e non meritevole di alcuna credenza.

Per quello che riguarda il preſente Uc-

NOnnulli inter veteres Penelopem *illam pudiciſſimam & decantatiſſimam Ulyſſis Uxorem a* Penelope *Ave, de qua modo agitur, nomen traxiſſe exiſtimant: aiunt enim* Penelopem *filiam Icarii, & Peribaee a Parentibus in Mare proiectam, per Aves* Penelopes *in littus exportatam, ſervatamque ſuiſſe, & a Parentibus ſuis iterum educatam. At haec credat, Iudeus Apella.*

Quod ſpectat ad Avem, de qua nunc agitur,

Uccello, egli raggirasi intorno ai Laghi, ed i Fiumi, e frequenta i lidi del Mare. Cibasi per lo più di Gramigna, che trovasi nel fondo dei Ruscelli o fossati, di piccole Chiocciole ec.

Aristotile e Plinio pone quest' Uccello nel numero delle Oche. Noi però gli abbiamo dato luogo tra le Anatre, e non senza ragione. Tra l'Oca, e l'Anatra passa tal somiglianza, che molti Uccelli vengono da diversi presi ora per Anatre, ed ora per Oche: di più non è inconveniente se questo è numerato tra le Anatre, mentre parecchi, come lo Scoliaste di Aristofane, lo assomigliano all'Anatra, e molti Classici Autori lo costituiscono difatti nel genere delle Anatre. A ciò si aggiunga che nel genere delle Anatre alcune se ne ritrovano, alle quali conviene ciò che gli Antichi hanno scritto dell'Anatra Penelope; lo che senza dubbio non accade nel genere delle Oche.

tur, ea circa Lacus, & Amnes versatur, Marisque littora frequentat. Gramine ad fundum rivulorum, cochleis exiguis &c. vescitur.

Mirabitur forte quis, dum nos, dum Aristotiles & Plinius Penelopem Anserino Generi accensent, hic de ea inter Anates agamus. At id non sine ratione factum; nam tanta inter Anatem & Anserem intercedit similitudo, ut multae Aves a diversis modo Anseribus, modo Anatibus adscribantur. Quamobrem Penelopem quoque Anatini generis facere non est incongruum, praesertim cum nonnulli eam Anati assimilent, ut Aristophanis Scholiastes, & Classici Authores inter Anates reponant. Huc accedit, quod in Anatum genere quaedam reperiuntur, quibus id quod de Penelope tradunt veteres convenit, in Anserino non item.

T. DLXXXIV. B. — 16. —

ANATRA PENELOPE, Femmina — Lat. *Anas Penelope, Foemina*; Gerin. Ornith. N. 600. — *An Anas fera capite subrufo minor, Foemina*; Willugh. Ornith. pag. 282.

3. ANATRA PENELOPE nera — Lat. *Anas Penelope, nigra*; Briss. Tom. VI. pag. 389. sp. 19. Var. A. — *Anas fera fusca alia*; Aldrov. — *Magnitudine & crassitie praecedentem circiter aemulatur.*
4. ANATRA PENELOPE del Messico — Lat. *Anas Penelope Mexicana*; Briss. Tom. VI. pag. 390. sp. 20. — *Magnitudine & crassitie cum praecedentibus circiter convenit. Habitat in Mexico, ibique Lacus frequentat.*

T. DLXXXV. B. — 16. 2.

ANATRA detta in Toscana MARIGIANA, BIBBIO, e FISCHIONE, Maschio — Lat. *Anas fistularis, Mas*; Gerin. Ornith. N. 601. — *Anas Clangosa, rostro cyaneo, pectore albo, tergo nigris subrubrisque maculis*, Barr. — *Anas fistularis*; Ges. Aldrov. & Ionst. — *Anas fistularis Willughby*; Rzac. — *Anas fistularis Fabricii*; Klein. — *Anas fera undecima, seu canora*; Schwenck. — *Boschas, aliis Anas fistularis*. Charlet. — *Anas fistularis, Mas*; Briss. Tom. VI. pag. 391. sp. 21. — *Anas cauda acutiuscula, subtus nigra capite brunneo, fronte alba. Penelope*; Linn. Syst. Nat. Gen. 61. sp. 24. — Gall. *le Canard Siffeur* — Angl. *Common Wigeon* — *Avis haec a sono acutiore, quem fistulae modo emittit ab Etruscis* Fischione, *a Latinis* Fistularis *denominata est. Huius speciei Anates turmatim considunt, paludes frequentant, & iuxta maris littora versantur.*

T. DLXXXVI. B. — 16. 2.

ANATRA detta MARIGIANA, BIBBIO, e FISCHIONE, Femmina — Lat. *Anas Fistularis, Foemina*; Gerin. Ornith. N. 602. & Briss. Tom. VI. pag. 391. sp. 21. — *Crassitie paululum Mari cedit, ab illo coloribus multum discrepat. Nonnulli Auctores colores, quibus Anates pinguntur, describentes, minutius, & scrupulosius fortasse se gerunt (quod Brissonius supra citato loco exequitur Foeminam hanc delineando) quam necessarium foret: cum Natura in his subinde ludat, nec eosdem exacte ductus, aut notulas in omnibus eiusdem generis Avibus observet.*

T. DLXXXVII. B. — 17. —

FISCHIONE col ciuffo detto ancora in Toscana GERMANO TURCO, e nel Romano CAPOROSSO maggiore — Lat. *Anas fistularis cristata*; Gerin. Ornith. N. 611. & Briss. Tom. VI. pag. 398. sp. 22. — *Anas Erythrocephalos*; Rzac. — *Anas fera nona, seu Erythrocephalos secunda*; Schwenck. — *Anas cristata flavescens*; Marsil. & Klein. — *Anas capite rufo maior*; Raj. — Gall. — *le Canard siffleur huppé*.

T. DLXXXVIII. B. — 15. 1.

FISCHIONE Americano — Lat. *Anas fistularis Americana*; Briss. Tom. VI. pag. 400. sp. 23. — *Anas fera griseo colore, mento cimabarino, undulante pectore*; Marsil. & Klein. — *Anas fistularis rufus rostro rubro, Occidentalis*; Edward Tom. VI. pag. 194. — *Anas grisea, remigibus, cauda, ventreque nigris, area alarum fulva, albaque*; *Anas Autumnalis*; Linn. Syst. Nat. Gen. 61. sp. 33. — Gall. *le Canard siffleur d' Amérique* — Angl. *Red-bill'd Whistling Duck.* — *Habitat in America septentrionali*.

5. FISCHIONE di Giammaica — Lat. *Anas fistularis Jamaicensis*; Briss. Tom. VI. pag. 403. sp. 24. — *Anas fera maior*; Barr. — *Anas fistularis arboribus insidens*. Sloane & Raj. — *Anas subfusca maior, rostro & vertice nigricantibus, alis variegatis*; Browne — *Anas grisea capite suberistato, abdomine albo, nigroque maculato. Anas arborea*; Linn. Syst. Nat. Gen. 61. sp. 38. — *Crassitie praecedentem circiter aemulatur. Habitat in Americae septentrionali Regione*.

T. DLXXXIX. B. — 14. —

ANATRA Marina maggiore, detta in Toscana TUFFETTO TUFFATORE, e COLLETTO, Maschio — Lat. *Anas Glaucia maior, Mas*; — *Anas Glaucia fera*; Barr. — *Anas fera capite subrufo maior*; Willugh. & Raj. — *Anas platyrhynchos*; Gesn. & Aldrov. — *Anas platyrynchos Gesneri*; Charlet. & Mus. Worm. — *Anatis platyrhynchi species*; Gesn. — *Glaucium*; Gesn. & Aldrov. — *Glaucium Bellonii*; Willugh. & Raj. — *Glaucius*; Ionst. & Charlet. — *Anas iridibus flavis, capite griseo, collari albo. Glaucion*; Linn. Syst. Nat. Gen. 61. sp. 23. — *Anas Glaucium Mas*; Briss. Tom. VI. pag. 406. sp. 25. — Gall. *le Morillon* — Angl. *Spoon-bill'd Duck*.

IL *Moriglione* dei Francesi corrisponde esattamente al *Glaucion* dei Greci, ed al *Glaucius* dei Latini, il quale secondo Ateneo viene così detto dal colore dei suoi occhi. Frequenta più i lidi del Marc, che i Fiumi e le Paludi; onde è a noi piaciuto denominarlo *Anatra Marina*. Egli si procaccia il vitto nell' acqua, cibandosi di piccoli animali aquatici, e di pesci minuti, che ritrova nel fondo di quella; ed avendo per costume d' immergersi e nuotare sott' acqua, ha ottenuto dai Toscani il nome di *Tuffetto*, o *Tuffatore*. Vive inoltre di semi di Erbe, che nascono alle rive dei Fiumi, di teneri Gamberi fluviatili, e di Lumache. Quest' Uccello ha la lingua così carnosa, che sembra esser doppia verso la sua radice.

Il *Moriglione* del Brisson affatto corrisponde al nostro nei colori, fennonchè differisce nel capo, che dicesi dal Brisson corredato di un ciuffo, del quale ancora ne va privo tanto il *Glaucius* descritto dall' Aldrovando, quanto il *Moriglione* riportato dal Bellonio.

Recorum Glaucion, & *Latinorum* Glaucius *cum Anate, quam* Morillon *Galli nuncupant perfecte convenit. Ab oculorum colore, teste Athenaeo,* Glaucius *dictus est. Juxta fluvios, & paludes versatur, ad Maris vero littora frequentior, quare a nobis* Anatis Marinae *nomen iure meritoque obtinuit. Ex aqua victum petit, animalculisque aquaticis & pisciculis vivit, quos in aquae fundo reperit: & cum sese aquae immergere, ac diutius urinari soleat Etruscis ideo* Immergentis *nomen adeptus est. Vivit praeterea seminibus herbarum, quae in Fluminum ripis nascuntur, & Astacis fluviatilibus tenellis, & Limacibus. Linguam habet adeo carnosam, ut prope radicem gemina videatur.*

Brissonii Morillon *cum Anate nostra coloribus prorsus convenit, differt solummodo capite non cristato; at crista aeque carent Anates, quas sub titulo* Glaucii *Aldrovandus, & sub nomine* Morillon *Bellonius describunt*.

T. DXC. B. — 14. —

TUFFETTO, o TUFFATORE, e COLLETTO, Femmina — Lat. *Anas Glaucia major, Foemina — Anas fera fuſca minor* (*an Foemina?*) Willugh. & Raj. — *Anas platyrynchos minor alter, ſeu Anas Fuligula alia* (*Foemina*) Aldrov. — *Anas Glaucium, Foemina*; Briſſ. Tom. VI. pag. 406. ſp. 25. — *Foemina magnitudine & craſſitie cum Mare circiter convenit, ab illo vero coloribus paululum diſcrepat. Vide Figuram.*

T. DXCI. B. — 13. 1. — 15. —

ANATRA marina minore col ciuffo, detta in Toſcana MORETTA, Maſchio — Lat. *Anas Glaucia minor criſtata, Mas — Anas cirrhata*; Geſn. Aldrov. & Jonſt. — *Anas criſtata*; Raj. — *Anas platyrynchos minor prior* Aldrov. — *Anas Fuligula*; Geſn. & Aldrov. — *Anas Fuligula prima Geſneri, Aldrovandi*; Willugh. & Klein. — *Anas Fuligula prima Geſneri, Mergus cirrhatus minor ejuſdem, querquedula criſtata, ſeu Colymbus Bellonii & Willughby*; Rzac. — *Fuligula* Geſn. & Jonſt. — *Querquedula criſtata, ſeu Colymbus Bellonii*; Aldrov. — *Querquedula criſtata, quam Bellonius Colymbior vocat*; Jonſt. & Charlet. — *Anas criſta dependente, corpore nigro, ventre maculaque alarum albis. Fuligula*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 39. — *Anas Glaucium minus*; Briſſ. Tom. VI. pag. 411. ſp. 26. — Gall. *Le petit Morillon* — Angl. *Tufted Duck*.

T. DXCII. B. — 14. 1.

ANATRA MORETTA, Femmina — Lat. *Anas Glaucia minor; Foemina*; Gerin. Ornith. Num. 592. — *Foemina a Mare diſcrepat magnitudine, qua ei cedit, coloribus, & capite praecipue non criſtato. Hujus ſpeciei varietas eſt* Anas Glaucia minor ſtriata, *quam refert Briſſonius* Tom. VI. pag. 416. Var. A. *quaeque ab iſta non diſcrepat, niſi medio dorſo albo & fuſco tranſverſim & undatim ſtriato.*

T. DXCIII. B. — 16. 1.

ANATRA, detta in Toſcana CANONE, QUATTROCCHI, e DOMENICANO, Maſchio — Lat. *Anas Clangula, Mas*; Gerin. Ornith. Num. 607. & Briſſ. Tom. VI. pag. 416. ſp. 27. — *Anas Clangula*; Aldrov. & Klein. — *Anas platyrynchos*; *Mas Aldrovandi*; Willugh. & Raj. — *Anas platyrynchos*: Aldrov. — *Anas platyrinchos Mas*; Klein. — *Anas Marina platyrynchos, Mas*; *Clangula Geſneri*, Quattrocchi *Italis*; Marſil. — *Anas fera ſexta ſeu criſtata*; Schwenck. — *Anas fera ſexta, ſeu criſtata Schwenckfeldii*; Rzac. — *Rangula* Geſn. & Jonſt. — *Anas nigro alboque varia, capite tumido nigro-viridi, ſinu oris macula alba. Clangula*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 20. — Gall. *Le Garrot* — Angl. *Golden Eye*.

T. DXCIV. B. — 15. —

ANATRA detta CANONE, QUATTROCCHI, e DOMENICANO, Femmina — Lat. *Anas Clangula Foemina*; Gerin. Ornith. Num. 608.

LE Anatre di queſta ſpecie abitano nelle acque, dove con grandiſſima deſtrezza s'immergono, nuotando fino al fondo: cibanſi di Chiocciole e Telline, e fanno il loro nido nelle buche degli alberi.

Per ragione di una macchia bianca, che hanno fra gli occhi e la bocca, vengono eſſe chiamate dagli Italiani *Quattrocchi*, e per il romore delle ali, le quali per eſſer robuſte non ſono da eſſe moſſe volando ſenza gran ſtrepito, hanno appreſſo gli Ornitologiſti ottenuto il nome di *Anates Clangulae*.

Hujuſmodi Aves habitant in aquis, urinantque egregie: victitant cochleis & conchis; nidificant vero in cavis Arboribus.

Ex macula alba, quam habent in ſinu oris, ab Italis Quattrocchi *dictae ſunt, & ab alarum ſtrepitu, ſive clangore, quae firmiſſimae cum ſint, ideo nec ſine ſonu in volatu moventur,* Clangularum Anatum *ab Ornithologis ſunt nomen adeptae.*

La

Ma-

T. DXCV. B. — 15. —

ANATRA QUERQUEDULA maggiore detta in Toſcana ARZAGOLA, Maſchio — *Anas Querquedula major, Mas*; Gerin, Ornith. Num. 588. & Briſſ. Tom, VI. pag. 427, ſp. 31. — *Anas Kernell circa Argentoratum dicta*; Aldrov. — *Anas ſera decima quinta, ſeu minor tertia*; Schwenck. — *Anas mediocris*; Geſn. & Klein. — *Kernell ſeu Querquedula varia*; Geſn. — *Querquedula prima*; Aldrov. — *Querquedula prima Aldrovandi*; Willugh. & Raj. — *Querquedula varia*; Geſn & Rzac. — *Querquedula varia Geſneri, prima Aldrovandi*; Klein. — *Querquedula Kernell circa Argentoratum dicta*; Charlet. — *Boſchas Bellonii*; Aldrov. — *Phaſcas forte Geſnero*; Willugh. — *Phaſcas forte Geſnero D. Johnſon*; Raj. — *Anas macula alarum viridi, linea alba ſupra oculos*; *Querquedula*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 28. — Gall. *La Sarcelle, Cercelle, Alebrande, Garſotte, Halebran* — Angl. *The Teal.*

LE Anatre di queſta ſpecie frequentano i Laghi, le Paludi, e le Peſchiere, e molto amano di ſtare nelle acque dolci. La Femmina differiſce dal Maſchio per eſſere più ſcolorita, e priva di una certa linea bianca ſopra gli occhi, con la quale il Maſchio viene ſpecialmente caratterizzato. *L' Anatra Querquedula di teſta roſſa* del Briſſon (Tom. VI. pag. 435. Var. A.) e *l' Anatra ſalvatica ſettima diſtinta in fronte con una macchia bianca* dello Schewenckfeldio (Av. Sileſ. pag. 200.) altro non è che una ſemplice varietà della preſente. Varietà ancora della medeſima ſono le dimoſtrate dalle Tavole ſeguenti.

ANates hae Lacus, Paludes, Piſcinaſque frequentant; aquiſque dulcibus ſummopere delectantur. Foemina a Mare diſcrepat, quod magis decolor ſit, lineaque alba ſupra oculos careat. Hujus ſpeciei varietas eſt. Querquedula erythrocephalos *Briſſonii* (*Tom. VI. pag.* 435. *Var. A.*) & Anas fera ſeptima, macula in fronte candida inſignis *a Schwenchfeldio dicta* (*Av. Sileſ. pag.* 200.). *Ejuſdem quoque varietates ſunt a ſequentibus Tabulis comprehenſae ac demonſtratae.*

T. DXCVI. B. — 15. 2.

ANATRAQUERQUEDULA maggiore detta in Toſcana FISCHIONE. — Lat. *Anas alia Querquedula maior*; Gerin. Ornith. N. 596. — *Antecedentis pariter varietas.*

T. DXCVII. B. — 14. 2.

ANATRA QUERQUEDULA maggiore detta in Toſcana SCOPAJOLA — Lat. *Anas alia Querquedula maior*; Gerin. Ornith. N. 594. — *Antecedentium varietas.*

T. DXCVIII. B. — 12. —

ANATRA QUERQUEDULA minore detta in Toſcana ARZAVOLA, e MARZAJOLA — Lat. *Anas Querquedula minor*; Gerin. Ornith. N. 586. — *Anas griſea alis taenia excaeſio & viridi cinctis*; Barr. — *Anas Querquedula. Francia*; Klein. — *Anas Querquedula ſecunda Aldrovandi*; eiuſdem. — *Anas fera decima tertia, ſeu minor prima*; Schwenck. — *Anas fera decima tertia Schwenckfeldii, ſeu minor*; Klein. — *Querquedula*; Geſn. — *Querquedula ſecunda*; Aldrov. — *Querquedula ſecunda Aldrovandi*; Willug. Raj. & Sloane — *Querquedula ſecunda, Aldrovandi Boſchis Columellae*; Rzac. — *Querquedula Varroni, Boſchas minor Commelino, Boſchis Columellae*; eiuſdem. — *Querquedula nonnullis Boſchas minor*; Charlet. — *Querquedula minor*; Ionſt. — *Querquedula. maior*; Sibbald. — *Querquedula ſylveſtris, ſeu Anas ſylveſtris minor*; Rzac. — *Phaſcas*; Geſn. — *Phaſcas, ſeu Querquedula minor*; Aldrov. — *Anas Querquedula minor*; Briſſ. Tom VI. pag. 436. ſp. 32. — *Anas macula alarum viridi, linea alba ſupra infraque oculos, Crecca*; Linn. Syſth. Nat. Gen. 61. ſp. 29. — Gall. *la petite Sarcelle* — Angl. *Common Teal.*

T. DXCIX.

L'Anatra Querquedula minore abita nei Laghi, e nei Fiumi, ed ha una carne di ottimo sapore. La Femmina poco differisce dal Maschio in grossezza; varia però nei colori, e particolarmente per esser priva di una linea bianca, situata, come carattere del Maschio, di sopra e di sotto agli occhi. Vedi il Brisson al luogo s praecitato, dove ci dà ancora della Femmina una diligente descrizione.

Querquedula minor habitat in Lacubus, & Fluviis, praestantissimque saporis est caro eiusdem. Foemina crassitie paululum Mari cedit; coloribus vero discrepat, lineaque alba supra infraque oculos, qua Mas donatur, praecipue caret. Vide Brissonium loco supra memorato, ubi etiam Foeminae accuratam praebet descriptionem.

T. DXCIX.

ANATRA QUERQUEDULA col ciuffo della China — Lat. *Anas Querquedula Sinensis crista*; Briss. Tom. VI. pag. 450. sp. 34. — *Anas Sinensis*; Klein. — *An Querquedula Indica?* Aldrov. — *Querquedula Sinensis elegans*, Edward. pat. 102. — *Anas cr sta dependente, dorsoque postico utrinque penna recurvata compressa elevata. Anas galericulata*; Linn. Syst. Nat. Gen. 61. sp. 36. — Gall. *La Sarcelle de la Chine* — Angl. *The Chinese Teal.* — *Avis est el gans, coloribus venustissimis, singularibusque pennis ad uropygium (vide Figuram) altero latere plumis eminentibus sex, cervicem versus incurvatis, summopere spectabilis. Habitat in Sinensi Regno.*

7. ANATRA QUERQUEDULA di Estate — Lat. *Anas Querquedula aestiva*; Briss. Tom VI. pag. 445. sp. 33. — *Anas Circia*; Gesn. Aldrov. Ionst. Charlet. & Sibbald. — *Anas Circia, seu Querquedula fusca*; Gesn. — *Anas Circia Gesneri*; Willugh. & Raj. — *Anas fera decima quarta, seu minor secunda*, Schwenck. — *Querquedula fusca*; Raei. — *Circia Gesneri*; Klein. — *Anas macula alarum varia, linea alba supra oculos, rostro pedibusque cinereis. Circia*, Linn. Syst. Nat. Gen. 61. sp. 32. — *Querquedulae minori paululum crassitie cedit. Paludes, Piscinasque frequentat.*
8. ANATRA QUERQUEDULA d' America — Lat. *Anas Querquedula Americana*; Briss. Tom. VI. pag. 452. sp. 35. — *Anas Querquedula Americana variegata*, Klein. — *An Anas Americana cinerea, extremis alis viridibus?* Barr. — *An Querquedula minor varia?* idem. — *Anas subfusca minor, remigibus extimis caeruleis, medis albis, maximis subroseis centibus, fascia alba in fronte*; Browne. — *Crassitie Querquedulam nostratem nonnihil antecellit. Piscinas & Flumina frequentat. Habitat in America Septentrionali.*
9. ANATRA QUERQUEDULA de la Virginia — Lat. *Anas Querquedula Virginiana*; Briss. Tom. VI. pag. 455. sp. 36. — *Anas Quacula*, Klein. — *Praecedenti paululum crassitie cedit. Paludes frequentat. Habitat aestate in Virginia & Carolina.*
10. ANATRA QUERQUEDULA del Messico — Lat. *Anas Querquedula Mexicana*; Briss. Tom. VI. pag. 558. sp. 37. — *Avis lunaris*; Fern. & Raj. — *Cum Querquedula nostrate magnitudine circiter convenit. Habitat in Mexico, ibique Lacus frequentat.*
11. ANATRA QUERQUEDULA della Lovisiana Lat. — *Anas Querquedula Ludoviciana*; Briss. Tom. VI. pag. 461. sp. 38. — *Anas parva ex nigro & albo variegata*; Klein. — *Anas alba, dorso remigibusque nigris, capite caerulescente, occipite. Albeola*; Linn. Syst. Nat. Gen. 61. sp. 15. — *Crassitie Querquedulam nostratem non multum antecellit. Habitat in Ludovicia & Insula Terrae-novae* —
12. ANATRA QUERQUEDULA della Carolina — Lat. *Anas Querquedula Carolinensis*; Briss. Tom. VI. 464. sp. 39. — *Anas minor ex albo & fusco varia*, Klein. — *Anas fusca-cinerea, macula aurium, alarumque alba. Anas rustica*; Linn. Syst. Nat. Gen. 61. sp. 29. — *Querquedulae minori nostrati paululum crassitie cedit, juxta Fluviorum ostia saepissime versatur. Habitat in Carolina.*
13. ANATRA QUERQUEDULA dell' Isola Ferroa — Lat. *Anas Querquedula Ferroensis*; Briss. Tom. VI. pag. 466. sp 40. — *Querquedulam majorem nostratem paululum crassitie superat. Habitat in Ferroensi Insula.*
14. ANATRA QUERQUEDULA della Baja d' Hudson — Lat. *Anas Querquedula Freti Hudsonis*; Briss. Tom. VI. pag. 467 sp. 41. — *Anas grisea, auribus albis, remigibus primoribus nigricantibus. Anas minuta*; Linn. Syst. Nat. Gen. 61. sp. 32. — *Cum Querquedula nostrate crassitie circiter convenit. Habitat in Freto Hudsonis.*
15. ANATRA QUERQUEDULA dell' Isola di S. Domingo — Lat. *Anas Querquedula Dominicensis*, Briss. Tom. VI pag. 472. sp. 42. — *Anas Chilli colore. Anas Jamaicam Mexicanarum colore*; Fern. — *Avis Chilli colore*; Raj. — *Haec est hujus Generis species minima. Habitat in Dominicensi Insula et Mexico.*

T. DC.

ALCA Indiana con una larga macchia bianchiccia attorno ambedue gli occhi — Lat. *Alca indica macula juxta oculos lata albicante*. Gerin. Ornith. N. 623. — Gall. *Oiseau d'eau des Indes.*

TOMI QUINTI, AC POSTREMI FINIS

CATALOGO ALFABETICO

DEI GENERI, SPECIE, E VARIETA' DEGLI UCCELLI RIPORTATI E DESCRITTI IN QUEST'OPERA

SOTTO I NOMI LORO ITALIANI E PARTICOLARMENTE TOSCANI.

A

Albastrella cenerina; Tom. IV. p. 63. T. CCCCLVIII.
Albatro; Tom. V. pag. 31. T. DLII.
Aliuzza femmina; Tom. IV. p. 29. T. CCCLXXXI. Fig. 2.
Aliuzza maschio di color bianco; Tom. IV. p. 29. T. CCCLXXXI. Fig. 1.
Allocco; Tom. I. p. 88. T. XCI.
Allocco bianco; Tom. I. p. 89. T. XCII.
Allocco diurno; Tom. I. p. 89. T. XCIII.
Allodola arborea T. IV. p. 25. num. 8
Allodola con le ali d'Uccello aquatico Tom. IV. p. 24. T. CCCLXXIII. Fig. 2.
Allodola cappelluta; Tom. IV. p. 24. T. CCCLXXIV. Fig. 1.
Allodola de Prati, o Mattolina; Tom. IV. p. 23. T. CCCLXXII. Fig. 2.
Allodola di Prato, o Calandrella; Tom. IV. p. 25. T. CCCLXXV. Fig. 2.
Allodola Mattolina bianca; Tom. IV. p. 24. T. CCCLXXIII. Fig. 1.
Allodola mostruosa: suo capo; Tom. IV. p. 24. T. CCCLXXIV. Fig. 2.
Allodola maggiore, o Panterana; Tom. IV. p. 24. T. CCCLXXV. Fig. 1.
Allodola di mare col collare; Tom. IV. p. 61. num. 3.
Allodola, o Pispoletta; Tom. IV. pag. 23. T. CCCLXXII. Fig. 1.
——— bianca comune senza ciuffo; ivi num. 11.
——— col ciuffo, o Cappelluta minore; ivi num. 9.
——— del Capo di Buona Speranza; ivi num. 16.
——— d'Italia del Brisson; ivi num. 13.
——— delle Siepi; ivi num. 14.
——— di Virginia; ivi num. 15.
——— maggiore, o Calandra; ivi num. 18.
——— nera; ivi num. 12.
——— del Senegal; ivi num. 10.
——— Vernale, o sia Nivale; ivi num. 17.
——— dell'Isola di S. Domingo; ivi num. 4.
——— minore; ivi n. 5.
Anatra di Baama; Tom. V. p. 46. num. 2.
Anatra col collare dell'Isola di Terra nuova; Tom. V. p. 46. T. DLXXX.
Anatra domestica di vario colore; Tom. V. p. 40. T. DLXIII.
Anatra domestica bianca femmina; Tom. V. p. 41. T. DLXIV.
Anatra domestica di becco incurvato; Tom. V. p. 41. T. DLXV.
Anatra domestica di becco incurvato, altra varietà; Tom. V. p. 41. T. DLXVI.
Anatra domestica scura di becco incurvato, Femmina; Tom. V. p. 42. T. DLXVII.
Anatra d'Estate; Tom. V. p. 46. T. DLXXIX.
Anatra d'Inverno, detta in Toscana Gobbo, e Ruggino so, Maschio; Tom. V. p. 46. T. DLXXVII.
Anatra d'Inverno, detta in Toscana Gobbo, e Ruggino so, Femmina; Tom. V. p. 46. T. DLXXVIII.
Anatra d'India; Tom. V. p. 42. T. DLXVIII.
Anatra d'India bianca, varietà dell'antecedente; Tom. V. p. 43. T. DLXIX.
Anatra salvatica, detta Germano Reale; Tom. V. p. 43. T. DLXX.
——— del Brasile; ivi num. 3.
——— della Baia d'Hudson; Tom. V. p. 47. num. 4.
Anatra di coda lunga detta in Toscana Germano di coda lunga; Tom. V. p. 47. T. DLXXXI.
Anatra detta in Toscana Germano Colombaccio; Tom. V. p. 47. T. DLXXXII.
Anatra detta in Toscana Marigiana e Fischione Maschio; Tom. V. p. 48. T. DLXXXV.
Anatra detta Marigiana, Bibbio, e Fischione Femmina; Tom. V. p. 48. T. DLXXXVI.
Anatra detta Canone, Quattrocchi, e Domenicano; Tom. V. p. 50. T. DXCIII.
Anatra marina maggiore, detta Tuffetto, e Colletto; Tom. V. p. 49. T. DLXXXIX.
Anatra marina minore col ciuffo, detta Moretta; Tom. V. pag. 50. T. DXCI.
Anatra Penelope, detta in Toscana Bibbio, e Caporosso; Tom. V. p. 47. T. DLXXXIII.
Anatra Penelope Femmina Tom. V. p. 48. T. DLXXXIV.
Anatra Penelope nera; Tom. V. p. 45. num. 3.
——— del Messico; ivi num. 4.
Anatra salvatica, detta Germano Forestiero; Tom. V. p. 44. T. DLXXI.
Anatra salvatica, detta Germano Forestiero, e del Messico; Tom. V. p. 44. num. 3.
Anatra salvatica, detta in Toscana Mestolone, o Fistione Maschio; Tom. V. p. 44. T. DLXXII.
Anatra salvatica, detta in Toscana Cicalona Maschio; Tom. V. p. 45. T. DLXXIV.
Anatra Querquedula maggiore, detta in Toscana Arzagola maschio; Tom. V. p. 51. T. DXCV.

Anatra Querquedula maggiore detta Fischione; Tom. V. p. 51. T. DXCVI.
Anatra Querquedula maggiore detta Scopaiola; Tom V. pag. 51. T. DXCVII.
Anatra Querquedula minore detta Arzagola, e Marzaiola; Tom. V. pag. 51. T. DXCVIII.
Anatra Querquedula col ciuffo della China; Tom. V. p. 52. T. CXCIX.
Anatra Querquedula di Estate; Tom. V. p. 52. num. 7.
———— d'America; ivi num. 8.
———— di Virginia; ivi num. 9.
———— del Messico; ivi num. 10.
———— della Lovisiana; ivi num. 11.
———— della Carolina; ivi num. 12.
———— dell'Isola Ferroense; ivi num. 13.
———— della Baia d'Hudson; ivi num 14.
———— dell'Isola di S. Domingo; ivi num. 15.
Aquila Albicilla, o Pigargo; Tom. I. p. 41. num. 9.
———— minore ivi num. 10.
Aquila di Nido; Tom. I. p. 38. T. VI.
Aquila di coda bianca d'America; Tom. I. p. 40. T. VII.
Aquila di testa e coda bianca; Tom. I. p. 40. T. VIII.
Aquila nera; Tom. I. p. 37. T. III.
Aquila Reale comune; Tom. I. p. 35. T. I.
Aquila Reale; Tom. I. p. 36. T. II.
Aquila Rapice; Tom. I. p. 39. T. IV.
Aquila Toscana; Tom. I. p. 39. T. V.
——— Africana col ciuffo; Tom. I. p. 41. num. 18.
——— bianca come il Cigno; ivi num. 12.
——— brizzolata; ivi num. 13.
——— detta dall'Aldrovando Pigargo secondo; ivi n. 15.
——— del Brasile detta Urubitinga; ivi 16.
——— del Brasile col ciuffo; ivi num. 17.
——— di Pondichery; ivi 19.
——— leonata, o dorata; ivi num. 11.
——— ossifraga; ivi num. 14.
Asiolo; Tom. I. p. 86. T. LXXXV.
Asiolo d'Italia; Tom. I. p. 86. num. 2.
——— Chiù; ivi num. 3.
——— della Carolina; ivi num. 4.
——— d'America; ivi num. 5.
——— del Brasile; Tom. I. p. 87. num. 6.
——— del Messico; ivi num. 7.
Avoltoio Aquilino; Tom. I. p. 45. T. XIV.
Avoltoio Aquilino scuro; Tom. I. p. 47. T. XV.
Avoltoio barbuto d'Affrica; Tom. I. p. 44. T. XI.
Avoltoio comune; Tom. I. p. 48. num. 8.
Avoltoio di color castagno; Tom. I. p. 43. T. X.
Avoltoio del Brasile; Tom. I. p. 45. T. XIII.
Avoltoio Indiano, Tom. I. p. 44. T. XII.
Avoltoio nero, o Lepraiolo; Tom. I. p. 42. T. IX.
——— alpino: Tom. I. p. 48. num. 14.
——— col ciuffo; ivi num. 12.
——— col capo bianco; Tom. I. p. 49. num. 15.
——— di color castagno, o dorato; ivi num. 9.
——— d'Egitto; ivi num. 11.
——— detto dagli Spagnuoli *Condor*; ivi num. 16.
——— detto Arpìa; ivi num. 17.
——— d'Arabia; ivi num. 18.
——— nero; ivi num. 13.
——— scuro; ivi num. 10.
Avoletta, o Beccostorto: Tom. V. p. 8. T. CCCCXCV.
Azzurro vario dell'Indie; Tom. III. p. 78. T. CCCLX. Fig. 2.

B

Barbuto, o Boccalone; Tom. II. p. 51. T. CLXXXII.
Barbuto di Caienna; Tom. II. p. 51. T. CLXXXIII. Fig. 1.
Barbuto di Caienna brizzolato; Tom. II. p. 51. T. CLXXXIII. Fig. 2.
Barbuto dell'Isole Filippine; Tom. II. p. 5. num. 4.
——— di Maynas; ivi num. 5.
Basettino, o Mustacchino; Tom. IV. p. 20. T. CCCLXIV. Fig. 2.
Beccaccia; Tom. IV. p. 59. T. CCCCXLVII.
Beccaccia bianca; Tom. IV. p. 60. T. CCCCXLVIII.
Beccaccia d'Inghilterra; Tom. IV. p. 60. num. 9.
——— del Maderaspatan; ivi num. 10.
Beccaccia mora; Tom. IV. p. 60. T. CCCCL.
Beccaccia scherzosa; Tom. IV. p. 60. T. CCCCXLIX.
Beccaccino minore; Tom. IV. p. 57. T. CCCCXLIII.
Beccaccino minore bianco della Baja d'Hudson; Tom. IV. p. 58. T. CCCCXLIV.
Beccaccino maggiore, detto Coccolone; Tom. IV. p. 59. T. CCCCXLVI.
Beccaccino, volgarmente Pizzarda; Tom. IV. p. 58. T. CCCCXLV.
Beccafico canapino; Tom. IV. p. 34. T. CCCXCII Fig. 1.
Beccafico con petto bianco, detto Seperagnola minore; Tom. IV. p. 34. T. CCCXCIII. Fig. 1.
Beccafico cenerino minore; Tom. IV. p. 35. T. CCCXCV. Fig. 1.
Beccafico cenerino maggiore; Tom. IV. p. 35. T. CCCXCV. Fig. 2.
Beccafico, detto Seperagnola mezzana; Tom. IV. p. 34. T. CCCXCII. Fig. 2.
Beccafico di petto scuro; Tom. IV. p. 34. T. CCCXCIII. Fig. 2.
Beccafico di Padule grigio; Tom. IV. p. 34. T. CCCXCIV. Fig. 1.
Beccafico di Padule rossiccio; Tom. IV. p. 34. T. CCCXCIV. Fig. 2.
Beccafico detto Scoperagnola, o Passera Scopaiola; Tom. IV. p. 35. T. CCCXCVI. Fig. 1.
Beccafico detto Codirosso, con petto ceruleo; Tom. IV. p. 36. T. CCCXCVII. Fig. 2.
Beccafico Capinera, volgarmente *occhio-cotto*; Tom. IV. p. 36. T CCCXCVIII. Fig. 1.
Beccafico detto Capinera *comune*; Tom. IV. p. 36. T. CCCXCVIII. Fig. 2.
Beccafico del *Madagascar* maggiore; Tom. IV. p. 37. num. 16.
Beccafico, volgarmente Codirosso; Tom. IV. p. 36. T. CCCXCVII. Fig. 1.
——— di Bengala, Tom. IV. p. 37. num. 17.
——— della Carolina; ivi num. 18.
——— della Pensilvania col caporosso; ivi *num.* 19.
——— della Martinicca; ivi num. 20.
——— del Canadà; ivi num. 21.
——— dell'Isola di S. Domingo; ivi *num.* 22.
——— *minore*; ivi num. 23.
——— del Madagascar minore; Tom. IV. p. 37. n. 24
——— della Luiliana; ivi num. 25.
——— della Pensilvania picchiettato; ivi num. 26.
——— col capo color d'oro; ivi n. 27.
——— del Mariland; ivi num. 28.
——— dell'Isola di Borbone; ivi num. 30.
——— di Giammaica; ivi num. 31.

Beccafico dell'Iſola di S. Domingo ſcuro; ivi num. 32.
——— del Canadà ſcuro; ivi num. 33.
——— col capo giallo; ivi num. 34.
——— di vario colore dell'Iſola di S. Domingo; ivi num. 39.
——— cenerino dell'Iſola di S. Domingo; ivi n. 35.
——— della Carolina; ivi num. 36.
——— del Canadà; ivi num. 37.
——— minore del Canadà; ivi num. 38.
——— maggiore del Canadà, ivi num. 29.
Bengalino Maſchio, Tom. IV. p. 22. T. CCCLXV. Fig. 1.
Bengalino Femmina; Tom. IV. p. 22. T. CCCLXV. Fig. 2.
Bengalini minori; Tom. IV. p. 22. T. CCCLXVI. Fig. 1., e 2.
Bengalino altra varietà; Tom. IV. p. 22. T. CCCLXVII. Fig. 1.
Braviere, o Strillozzo maggiore; Tom. III. p. 76. T. CCCLIII. Fig. 2.
Braviere, o Strillozzo minore; Tom. IV. p. 76. T. CCCLII. Fig. 2.

C

Calenzuolo, o Verdone; Tom. III. p. 68. T. CCCXXXI. Fig. 1.
Calenzuolo del Braſile; Tom. III. p. 69. T. CCCXXXII.
Calenzuolo, o Verdone ſcherzoſo; Tom. III. p. 68. T. CCCXXXI. Fig. 2.
Calenzuolo, o Verdone Indiano; T. III. p. 69. T. CCCXXXIII. Fig 1.
Calenzuolo, o Verdone del Perù; Tom. III. p. 69. T. CCCXXXIII. Fig. 2.
Cancrofago; Tom. IV. p. 50. num. 39.
——— Americano; ivi num. 44.
——— ceruleo col ciuffo; ivi num. 47.
——— di color caſtagnuolo; ivi num. 40.
——— dell'Iſole Filippine; ivi num. 43.
——— del Braſile; ivi num 45.
——— dell'Iſola di Baama; ivi num. 46.
——— roſſo; ivi num. 41.
——— brizzolato; ivi num. 42.
——— verde; Tom. IV. p. 51.; ivi num. 48.
——— picchiettato, ivi num. 49.
Capinera ſcherzoſa; Tom. IV. p. 37. T. CCCXCIX.
Cardellino, o Calderugio; Tom. III. p. 76. T. CCCLIII. Fig. 1.
Cardellino bianco; Tom. III. p. 76. T. CCCLIV. Fig. 2.
Cardellino d America; Tom. III. p. 76. T. CCCLV. Fig. 1.
Cardellino di fronte bianca; Tom. III. p. 76. num. 6.
Cardellino, o Calderugio sbiancato; Tom. III. p. 76. T. CCCLIV. Fig. 1.
Cardellino ſpurio; Tom. III. p. 76. T. CCCLV. Fig. 2.
——— con il capo macchiato di diverſi colori; ivi num. 7.
——— con la fronte gialla; ivi num. 10.
——— di capo nero; Tom. III. p. 77. num. 8.
——— di Svezia; ivi num. 11.
——— nero; ivi num. 9.
Cardinale bruno del gran Parà; T. III. p. 69. T. CCCXXXV. Fig. 1.
Cardinale in gran parte nero d' America; Tom. III. p. 69. T. CCCXXXIV.
Cardinale ſenza creſta del gran Parà; T. III. p. 69. T. CCCXXXV. Fig. 2.
Cerzia blù del Surinam; Tom. II. p. 56. T. CXCVI. Fig. 2.
Cerzia cenerina, altrimenti Picchio paſſerino; Tom. II. p. 55. T. CXCV. Fig. 1.
Cerzia cenerina e gialla dell'Iſole Filippine; Tom. II. p. 58. T. CXCIX. Fig. 1.
Cerzia di color violetto del Senegal; Tom. II. p. 58. T. CXCIX. Fig. 2.
Cerzia detta porporina dell'Iſole Filippine; Tom. II. p. 58. T. CC. Fig. 1. e 2.
Cerzia di coda lunga, del Capo di buona Speranza; Tom. II. p. 58. T. CCI. Fig. 1.
Cerzia di coda lunga del Senegal; Tom. II. p. 59. T. CCI. Fig. 2.
Cerzia dell'Iſole Filippine; Tom. II. p. 59. num. 16.
Cerzia muraiola, o Picchio muraiolo; Tom. II. p. 56. T. CXCVII.
Cerzia minore Indiana; Tom. II. p. 57. T. CXCVIII. Fig. 1.
Cerzia neraſtra del Braſile; Tom. II. p. 59. T. CCII. Fig. 1.
Cerzia porporina di Virginia; Tom. II. p. 59. T. CCII. Fig. 2.
Cerzia ſcura minore Indiana; Tom. II. p. 56. T. CXCV. Fig. 2.
Cerzia ſcura d' America; Tom. II. p. 57. T. CXCVIII. Fig. 2.
Cerzia, volgare maggiore; Tom. II. p. 56. T. CXCVI. Fig. 1.
——— blù del Braſile; Tom. II. p. 60. num. 23.
——— dell'Iſole Filippine cenerina; ivi num. 17.
——— minore; ivi num. 18.
——— del Capo di Buona Speranza; ivi num. 19.
——— dell'Iſola di Baama; ivi num. 20.
——— di color d'Oliva dell'Iſole Filippine; ivi n. 21.
——— del Madagaſcar; ivi num. 22.
——— di color violetto del Madagaſcar; ivi num. 28.
——— del Capo di Buona Speranza col collarino; ivi num. 30.
——— di coda lunga; ivi num. 31.
——— di color violetto del Braſile; ivi num. 34.
——— detta mangia-Zucchero della Martinicca; Tom. II. p. 61. num. 36.
——— roſſa del Meſſico; ivi num. 32.
——— col capo nero; ivi num. 33.
——— verde del Braſile; ivi num. 24.
——— con teſta nera del Braſile; ivi num. 25.
——— con il capo nero d' America; ivi num. 26.
——— di Caienna; ivi num. 27.
——— verde del Madagaſcar; ivi num. 29.
——— variegata d' America; ivi num. 35.
Chiurlo cremiſi della China; Tom. IV. p. 57. T. CCCCXLII.
Chiurlo del Madagaſcar; Tom. IV. p. 57. num. 5.
Chiurlo, o Fiſchione maggiore; Tom. IV. p. 55. T. CCCCXL.
Chiurlo, o Fiſchione minore; Tom. IV. p. 56. T. CCCCXLI.
Chiurlo volgarmente Mignattone; Tom. IV. p. 55. T. CCCCXXXIX.
——— Americano ſcuro; ivi num. 8.
——— Americano maggiore; ivi num. 10.
——— di color caſtagnuolo; ivi num. 7.
——— del Meſſico di vario colore; ivi num. 9.
——— d' America minore; ivi num. 11.

Chiurlo del Brasile bianco; ivi num. 12.
——— scuro; ivi num. 13.
——— cremili; ivi num. 14.
——— verde, ivi num. 6.
Chiurlino specie di Beccaccino; Tom. IV. p. 62. T. CCCCLVI.
Cicalona, o Canapiglia Femmina; Tom. V. p. 45. T. DLXXV.
Cicogna bianca; Tom. IV. p. 51. T. CCCCXXXIV.
Cicogna bianca Americana; Tom. IV. p. 53. num. 5.
Cicogna delle Canarie; Tom. IV. p. 53. T. CCCCXXXVI.
Cicogna nera; Tom. IV. p. 51. T. CCCCXXXIII.
Cicogna, o Damigella di Numidia; Tom. IV. p. 53. T. CCCCXXXV.
——— del Brasile; ivi num. 6.
——— della Guiana; ivi num. 7.
Cigno della China bianco; Tom. V. p. 35. T. DLV.
Cigno della China falbo; Tom. V. p. 36. T. DLVI.
Cigno della China vario; Tom. V. p. 36. T. DLVII.
Cigno Reale; Tom. V. p. 33. T. DLIII.
Cigno salvatico; Tom. V. p. 34. T. DLIV.
Cincia col capo nero del Canadà; Tom. IV. p. 29. n. 9.
——— col ciuffo; ivi num. 10.
——— col ciuffo e petto rosso della Carolina; ivi n. 11.
——— con la gola gialla d' America; ivi num. 12.
——— col collare della Carolina; ivi num. 14.
——— della Pensilvania; ivi num. 15.
——— di Virginia; ivi num. 13.
Cinciallegra cenerina; Tom. IV. p. 26. T. CCCLXXVII. Fig. 1.
Cinciallegra di Padule; Tom. IV. p. 27. T. CCCLXXVIII. Fig. 1.
Cinciallegra Indiana; Tom. IV. p. 27. T. CCCLXXVIII. Fig. 2.
Cinciallegra minore bruna; Tom. IV. pag. 26. T. CCCLXXVI. Fig. 2.
Cinciallegra maggiore; Tom. IV. p. 26. T. CCCLXXVII. Fig. 2.
Cinciallegra piccola turchina; Tom. IV. p. 25. T. CCCLXXVI. Fig. 1.
Civetta bianca; Tom. I. p. 88. T. LXXXIX.
Civetta comune; Tom. I. p. 87. T. LXXXVI.
Civetta cenerina; Tom. I. p. 87. T. LXXXVIII.
Civetta del Canadà; Tom. I. p 88. T. XC.
Civetta gialla; Tom. I. p. 87. T. LXXXVII.
Civetta maggiore; Tom. I. p. 88. num. 6.
——— del Messico; ivi num. 8.
——— di Coquimbo; ivi num. 9.
——— piccolissima; ivi num. 7.
Codibugnolo di Padule; Tom. IV. p. 28. T. CCCLXXX.
Codibugnolo Terrestre, o delle Selve; Tom. IV. p. 27. T. CCCLXXIX.
Colibri rosso di coda lunga del Surinam; Tom. IV. p. 40. T. CCCCV. Fig. 2.
Colimbo crestato maggiore, o Suasso comune maschio; Tom. V. p. 19. T. DXXI.
Colimbo crestato maggiore, o Suasso comune femmina; Tom. V. p. 19. T. DXXII.
Colimbo di Fiume; Tom. V. p. 20. num. 8.
Colimbo giovane dell' antidetta specie; Tom. V. p. 19. T. DXXIII.
Colimbo minore, detto in Toscana Tuffetto; Tom. V. p. 18. T. DXVII.
Colimbo maggiore cenerino; Tom. V. p. 18. T. DXVIII.
Colimbo minore nero e rosso; Tom. V. p. 18. T. DXIX.
Colimbo minore, con pennacchio dietro all'occhio; Tom. V. p. 19. T. DXX.
——— dell'Isola di S. Tommaso; ivi num. 9.
Colimbo di Fiume, della Carolina; ivi num. 10.
——— dell'Isola di S. Domingo ivi n. 11.
Colombaccio; Tom. III. p. 30. T. CCLXXII.
Colombaccio blù del Madagascar; ivi num. 50.
——— delle Molucche; ivi num. 52.
——— d' Amboina; ivi num. 53.
——— verde del Madagascar; ivi num. 51.
Colombella, o Palombella; Tom. III. p. 30. T. CCLXXI.
Colombo col ciuffo minore; Tom. III. p. 30. T. CCLXXIII.
Colombo col ciuffo simile ad una criniera; Tom. III. p. 36. T. CCLXXXVI.
Colombo di Palestina; Tom. III. p. 31. T. CCLXXIV.
Colombo di Barberia, o Tunisino; Tom. III. p. 32. T. CCLXXVI.
Colombo detto Piccion grosso gentile; Tom. III. p. 32. T. CCLXXVII.
Colombo detto Piccion grosso Reale; Tom. III. p. 32. T. CCLXXVIII.
Colombo di Cipro minore, o Turchetto piccolo; Tom. III. p. 34. T. CCLXXX.
Colombo di Cipro maggiore, o Turchetto col ciuffo; Tom. III. p. 34. T. CCLXXXI.
Colombo grosso minore, o Piccion grosso minore; Tom. III. p. 28. T. CCLXIX.
Colombo maggiore con ciuffo raddoppiato; Tom. III. p. 35. T. CCLXXXIV.
Colombo minore, e di diverso colore, con ciuffo raddoppiato; Tom. III. p. 35. T. CCLXXXV.
Colombo, o Piccione Modanino minore; Tom. III. p. 28. T. CCLXVII.
Colombo, o Piccion grosso di Sicilia; Tom. III. p. 33. T. CCLXXIX.
Colombo, o Piccion grosso ricciuto con penne ai piedi; Tom. III. p. 34. T. CCLXXXII.
Colombo, o Piccion grosso Reale, con penne ai piedi; Tom. III. p. 35. T. CCLXXXIII.
Colombo, o Piccione grosso comune; Tom. III. p. 36. num. 24.
Colombo tremante di coda larga, o Pavoncello; Tom. III. p. 28. T. CCLXVIII.
Colombo terraiolo, o Piccione terraiolo comune; Tom. III. p. 29. T. CCLXX.
Colombo Turco spurio, o di Persia; Tom. III. p. 31. T. CCLXXV.
Colombo, o Piccione battitore; ivi num. 29.
——— con la visiera; ivi num. 22.
——— corriere; Tom. III. p. 37. n. 27.
——— col ciuffo; ivi num. 28.
——— celeste del Messico; ivi num. 44.
——— di Scoglio; ivi num. 24.
——— bianco; ivi num. 25.
——— del Messico; ivi num. 32.
——— salvatico; ivi n. 33.
——— della Martinicca; ivi num. 35.
——— d'India; ivi 36.
——— della Martinicca violetto; Tom. III. p. 38. num. 37.
——— della Giammaica; ivi num. 40.
——— col capo nero; ivi num. 41.
——— di monte; ivi num. 42.
——— con la coda strisciata di scuro a forma d'anello; ivi num. 43.
——— di montagna, del Messico; ivi num. 45.
——— di Nocombar; ivi num. 49.
——— Giratore, o Burattino; ivi n. 30.

Colombo. o Piccione della Guinea; ivi p. 38. num. 39.
———— Gonfianuvoli; ivi p. 37. num. 31.
———— rotto dell'Isola di Caienna; ivi p. 38. num. 38.
———— salvatico; ivi p. 36. num. 26.
———— salvatico d'America; ivi p. 37. num. 34.
———— tremante di coda stretta; ivi p. 36. num. 23.
———— verde d'Amboina; ivi 47.
———— delle Filippine; ivi p. 38. num. 46,
———— dell'Isola di S. Tommaso; Tom. III. p. 39. num. 48.
Combattente; Tom. V. p. 4. CCCCLXXXVIII.
Combattente detto il Gobbo; Tom. V. p. 5. T. CCCCLXXXIX.
Combattenti sue varietà; Tom. V. p. 5.
Coracia cerulea, Tom. II. p. 39. T. CLIII.
Coracia col becco e gambe di color carnicino; Tom. II. p. 38. T. CL.
Coracia col becco e gambe nere; Tom. II. p. 38. T. CLI.
Coracia dell'Isole Filippine; Tom. II. p. 40. T. CLIV.
Coracia di montagna, o alpina; Tom. II. p. 38. T. CLII.
Coracia, o Corvo corallino; Tom. II. p. 37. T. CXLIX.
Coracia col ciuffo, o Corvo alpino col ciuffo; Tom. II. p. 40. num 7.
Cornacchia comune; Tom. II. p. 34. T. CXLIV.
Cornacchia, detta Mulacchia nera; Tom. II. p. 35. T. CXLVI.
Cornacchia frugilega nera; Tom. II. p. 35. T. CXLV.
Cornacchia Mulacchia, del Capo di Buona Speranza; Tom II. p 36. T. CXLVIII.
Cornacchia, o Mulacchia scherzosa; Tom. II. p. 36. T. CXLVII.
Cornacchia frugilega, o devastatrice de seminati; Tom. II. pag. 36. num. 7.
———— interiormente bianca; ivi num. 6.
———— Mulacchia col collare; Tom. II. p. 37. n. 9.
———— dolle Alpi; ivi num. 12.
———— tutta bianca; ivi num. 10.
———— tutta nera; ivi num. 11.
———— tutta nera di Giammaica; ivi num. 8.
Corvo d'Alemagna, detto ivi Krè; Tom. II. p. 33. T. CXLII.
Corvo Imperiale; Tom. II. p. 33. T. CXLIII.
Corvo maggiore, o reale; Tom. II. p. 32. T. CXL.
Corvo reale bianco; Tom. II. p. 32. T. CXLI.
Cotinga, o Tordo del Brasile celeste; Tom. III. p. 56. T. CCCXII.
Cotinga, o Tordo del Brasile con macchia rossa, a forma di croce nel petto; Tom. III. p. 56. T. CCCXIII.
Cotinga, o Tordo dell'Indie di color rosso fosco variegato di verde; Tom. III. p. 57. T. CCCXIV.
Cotinga bianca; Tom. III. p. 57. num. 9.
—— brizzolata, ivi num. 8.
—— cenerina; ivi num. 7.
—— del Messico: Tom. III. p. 58. num. 12.
—— del Paese di Mainas; ivi p. 57. num. 10.
—— di Caienna; ivi num. 11.
—— grigia porporina; ivi num. 6.
—— porporina; ivi num. 5.
—— rossa; ivi p. 57. num. 4.
Coturnice comune, o Quaglia maschio; Tom. III. p. 14. T. CCXLIII.
Coturnice, o Quaglia comune semmina; Tom. III. p. 15. T. CCXLIV.
Coturnice, o Quaglia col ciuffo; Tom. III. p. 16. T. CCXLVI.
Coturnice, o Quaglia d'Affrica; Tom. 3. p. 16. T. CCXLVII.
Coturnice, o Quaglia del Regno di Napoli; Tom. III. p. 15. T. CCXLV.
Coturnice, o Re delle Quaglie; Tom. III. p. 17. T. CCXLVIII.
Coturnice della Lovisiana; ivi p. 18. num. 13.
———— dell'Isole Filippine; ivi num. 10.
———— del Madagascar; ivi num. 9.
———— del Messico; ivi num. 11.
———— di Giava, o Indiana; ivi n. 7.
———— maggiore; ivi num. 8.
———— maggiore del Messico; ivi num. 12.
Crociero, o Crociere; Tom. III. p. 63. T. CCCXXIV.
Crotofago; Tom II. p. 53. T. CXC.
Crotofago maggiore; Tom. II. p. 54. T. CXCI.
Crotofago vario Indiano; Tom. II. p. 54. V. CXCII.
Cucule Affricano, o Re de' Cuculi; Tom. I. p. 82. T. LXXIII.
Cucule blù del Madagascar; Tom. I. p. 83. T. LXXVIII.
Cucule brizzolato di Mindanao; Tom. I. p. 82. T. LXXVI.
Cucule celeste della China; Tom. I. p. 83. T. LXXX.
Cucule col ciuffo del Coromandel; Tom. I. p. 82. T. LXXIV.
Cucule col ciuffo del Madagascar; Tom. I. p. 82. T. LXXVII.
Cucule comune; Tom. I. p. 80. T. LXVII.
Cucule di color vario; Tom. I. p. 81. T. LXIX.
Cucule di Giammaica; Tom. I. p. 83. T. LXXIX.
Cucule nero e bianco; Tom. I. p. 81. T. LXXI.
Cucule nero Indiano; Tom. I. p. 82. T. LXXII.
Cucule rosticcio, e bianco; Tom. I. p. 80. T. LXVIII.
Cucule rosticcio; Tom. I. p. 81. T. LXX.
Cucule verde di Siam; Tom. I. p. 82. T. LXXV.
Cucule brizzolato di bengala; Tom. I. p. 83. num. 20.
———— dell'Indie; ivi num. 21.
———— del Malabar; Tom. I. p. 84. num. 22.
———— di Caienna; ivi num. 24.
———— cornuto del Brasile; ivi num. 32.
———— della Carolina; Tom. I. p. 83. num. 15.
————, con le ale di color d'oro; ivi num. 16.
———— dell'Isola di Caienna; ivi p. 84. num. 23.
———— dell'Isola di S. Domingo; ivi num. 19.
———— del Madagascar; ivi num. 27.
———— del Messico; ivi num. 26.
———— del Senegal; ivi num. 25.
———— giallognolo col ciuffo del Brasile; ivi num. 30.
———— maggiore del Madagascar; ivi p. 84. num. 28.
———— maggiore di Giammaica; ivi p. 83. num. 17.
———— nero dell'Indie; ivi num. 29.
———— rosticcio, ivi p. 83 num. 18.
———— rosso col ciuffo del Brasile ivi p. 84. num. 31.
Culbianco specie di Beccaccino; Tom. IV. p. 62. T. CCCCLVI.
Curucu cenerino di Caienna; Tom. II. p. 53. T. CLXXXVIII.
Curucu del Brasile; Tom. II. p. 53. T. CLXXXVII.
Curucu di Caienna verde; Tom. II. p. 53. T. CLXXXIX.
Curucu di Caienna verde con la pancia bianca Tom. II. p. 53. num. 4.
———— del Messico; ivi num. 5.
———— variegato; ivi num. 6,

Cutrettola cenerina, o piombina; Tom. IV. p. 30. T. CCCLXXXIV. Fig. 2.
Cutrettola chiamata Codinzinzola, o Boarina; Tom. IV. p. 31. T. CCCLXXXV. Fig. 1.
Cutrettola gialla; Tom. IV. p. 31. T. CCCLXXXV. Fig. 2.
Cutrettola, o Codinzinzola; Tom. IV. p. 31. T. CCCLXXXVI. Fig. 2.
Cutrettola, o Cuti; Tom. IV. p. 31. T. CCCLXXXVI. Fig. 1.
——— del Capo di Buona Speranza; ivi p. 32. num. 8.
——— dell'Isola di Java; Tom. IV. p. 32. num. 7.
——— del Maderaspatan; ivi num. 9.
——— detta in Toscana Strisciattola; ivi num. 6.

D

Diomedèa, o Sfenisco brizzolato; Tom. V. p. 11. T. CCCCLXXXXVIII.

E

Emeu, o Casuario; Tom. II. p. 28. T. CXXXVI.

F

Fagiano bianco; Tom. III. p. 24. T. CCLIX.
Fagiano bianco della China; Tom. III. p. 25. T. CCLXI.
Fagiano comune; Tom. III. p. 23. T. CCLVIII.
Fagiano cornuto di Bengala; Tom. III. p. 25. T. CLXIII.
Fagiano della China; Tom. III. p. 24. T. CCLX.
Fagiano della China di colore scuro rosticcio; Tom. III. p. 25. T. CCLXII.
Fagiano coronato del Indie; Tom. III. p. 26. num. 9.
——— della Guiana; ivi num. 8.
——— dell'Isole Antille: ivi num. 7.
Falchetto Indiano; Tom. I. p. 66. T. XLIV. Fig. 1.
Falco Albanella; Tom. I. p. 61. T. XXXV.
Falco Albanella con il collare; Tom. I. p. 62. T. XXXVII.
Falco Albanella rosticcia; Tom. I. p. 62. T. XXXVI.
Falco Aquilino bianco; Tom. I. p. 65. T. XLIII.
Falco Aquilino di color rosticcio; Tom. I. p. 65. T. XLII.
Falco Aquilino scuro; Tom. I. p. 65. T. XLI.
Falco Barletta; Tom. I. p. 66. T. XLV.
Falco Barletta cerciata, Tom. I. p. 66. T. XLVIII.
Falco Barletta cenerina; Tom. I. p. 66. T. XLVI.
Falco Barletta mischia, Tom. I. p. 66. T. XLVII.
Falco castagnuolo col capo bianco; Tom. I. p. 61. T. XXXIII.
Falco castagnuolo, con il rostro grande aquilino; Tom. I. p. 61. T. XXXII.
Falco con il collare; Tom. I. p. 61. T. XXXI.
Falco diverso, per la mutazione delle penne; Tom. I. p. 61. T. XXXIV.
Falco detto Milano; Tom. I. p. 62. T. XXXVIII.
Falco Gheppio; Tom. I. p. 66. T. XLIX.
Falco Gheppio di Fabbrica; Tom. I. p. 67. T. LI.
Falco Gheppio di Grotta; Tom. I. p. 67. T. L.
Falco Gheppio di Torre; Tom. I. p. 67. T. LII.
Falco, o Nibbio maggiore; Tom. I. p. 62. T. XXXIX.
Falco Pescatore; Tom. I. p. 64. T. LX.
Falco Pigargo del Canadà; Tom. I. p. 66. T. XLV. Fig. 2.
Falco arboreo; Tom. I. p. 70. num. 60.
—— Bozzago comune; ivi p. 71. num. 73.
——— del Brasile; ivi p. 71. num. 72.
——— Mangiapecchie; ivi num. 74.
——— rosso; ivi num. 71.
——— variegato; ivi p. 70. num. 67.
—— con i piedi fino al nascere delle dita vestiti di penne; ivi p. 72. num. 79.
—— da Allodole; ivi p. 70. num. 62.
—— da Colombacci, della Carolina; ivi num. 61.
—— della Baia d'Hudson; Tom. I. p. 69. num. 50.
—— di color d'oro; Tom. I. p. 72. num. 75.
—— d'Islanda; ivi p. 68. num. 46.
—— di Montagna; ivi p. 68. num. 48.
——— cenerino; ivi num. 49.
—— di scoglio; ivi num. 47.
—— Indiano col ciuffo; p. 69. ivi num 52.
—— Italiano; ivi num. 45.
—— Laniere cenerino; ivi p. 69. num. 56.
——— sbiancato; ivi num. 57.
—— nero; Tom. I. p. 68. num. 41.
—— Nibbio; ivi p. 70. num. 66.
——— della Carolina; Tom. I. p. 71. num. 69.
——— nero; ivi num. 70.
——— volgare; ivi p. 70 num. 68.
—— Pescatore del Isole Antille; ivi p. 69. num. 54.
—— Pescatore della Carolina; ivi num. 55.
—— ridente del Linneo; ivi p. 72. num. 78.
—— rosso comune; ivi p. 68. num. 43.
—— rosso Indiano; ivi num. 44.
—— scuro; ivi num. 42.
—— Smeriglio della Carolina; ivi p. 70. num. 64.
——— dell'Isole Antille; ivi num. 63.
——— di S. Domingo; ivi num. 65.
—— soffiatore; ivi p. 72. num. 77.
—— tutto scuro dell'Isole Antille; ivi p. 69. num. 53.
—— Villanello; ivi p 72. num. 76.
—— Zaffiro; ivi p. 69. num. 51.
Fenicottero, altrimenti Fiammingo e Damigella dell'Indie; Tom. V. p. 9. T. CCCCLXXXVI.
Fetonte altrimenti Uccello dei Tropici; *Tom. V. p. 17.* T. DXVI.
Fetonte bianco; Tom. V. *p. 18. num. 2.*
——— rosticcio; *ivi num. 3.*
Fischione *Americano; Tom. V.* p. 49. T. DLXXXVIII.
Fischione col *ciuffo*, detto Germano Turco; Tom. V. p. 49. *T. DLXXXVII.*
Fischione *di Giammaica*; Tom. V. p. 49. num. 5.
Folaga *comune*; Tom. V. p. 20. T. DXXV.
Folaga *maggiore*, detta dai Francesi Diavolo di Mare Tom. V. p. 20. T. DXXIV.
Folaga del Messico; Tom. V. p. 21. num. 3.
Francolino degl'Italiani, maschio; Tom. *III. p.* 13. T. CCXLI.
Francolino suddetto femmina; Tom. III. p. 14. T. CCXLII.
Fraticella, detta dall'Aldrovando Pica marina; Tom. V. p. 31. T. DLI.
Fringuello comune; Tom. III. p. 70. T. CCCXXXVII.
Fringuello montanino maschio; Tom. III. p. 71. T. CCCXXXVIII. Fig. 1.
Fringuello, o Passera Sordone; Tom. III. p. 72. T. CCCXXXVIII. Fig. 2.

Fringuello ſcherzoſo; Tom. III. p. 70. T. CCCXXXVII. Fig. 2.
Froſone, o Fruſone comune; Tom. III. p. 64. T. CCCXXV.
Froſone bigio della China; Tom. III. p. 65. T. CCCXXVIII. Fig. 1.
Froſone brizzolato di Giava; Tom. III. p. 66. T. CCCXXVIII. Fig. 2.
Froſone della China femmina; Tom. III. p. 65. T. CCCXXVII. Fig. 2.
Froſone della China maſchio; Tom. III. p. 65. T. CCCXXVII. Fig. 1.
Froſone di Virginia, detto Cardinale col ciuffo; Tom. III. p. 66. T. CCCXXIX.
Froſone mattugio; T. III. p. 65. T. CCCXXVI.
Froſone turchino o celeſte d' Angola; Tom. III. p. 66. T. CCCXXX.
Froſone celeſte d' America; Tom. III. p. 68. num. 20.
——— del Braſile; ivi num. p. 67. 16.
——— del Canadà; ivi num. 18.
——— del Capo di Buona Speranza; ivi num. 9.
——— giallo; ivi n. 10.
——— dell' Iſola di Borbone; ivi num. 15.
——— dell' Iſola di Caienna; ivi num. 11.
——— dell' Iſole Filippine; ivi num. 13.
——— dell' Iſole Molucche; ivi num. 14.
——— della Luiſiana; ivi num. 17.
——— di Gambia; ivi num. 12.
——— Indiano; ivi num. 19.

G

Gabbiano corallino-cenerino; Tom. V. p. 21. T. DXXVI.
Gabbiano detto Corallina cenerina ſpruzzata; Tom. V. p. 21. T. DXXVIII.
Gabbiano detto in Toſcana Mezzamoſca; Tom. V. p. 23. T. DXXXI.
Gabbiano detto volgarmente Terragnola, e Galetra; Tom. V p. 22. T. DXXIX.
Gabbiano detto Zafferano cenerino; Tom. V. p. 22. T. DXXX.
Gabbiano detto Zafferano Mezzomoro; Tom. V. p. 23. T. DXXXII.
Gabbiano Moretta, ed anco maſchera Corallina; Tom. V. p. 21. T. DXXVII.
Gabbiano picchiettato; volgamente Moſcatone; Tom. V. p. 23. T. DXXXIV.
Gabbiano Reale, o ſia Peſcatore Marino; Tom. V. p. 23. T. DXXXIII.
Gabbiano, volgarmente Guairo, Tom. V. p. 23. T. DXXXV.
Gabbiano d' America; Tom. V. p. 23. num. 11.
——— dell' Iſola di S. Domingo; ivi num. 12.
Galbula detta dai Braſiliani Iacamarici; Tom. II. p. 52. T. CLXXXIV.
Galbula di coda lunga del Surinam; Tom. II. p. 52. T. CLXXXV.
Gallina detta la vergognoſa; Tom. II. p. 67. T. CCXI.
Gallina Padovana barbuta; Tom. II. p. 66. T. CCX.
Gallina Padovana, col becco conico diritto, lungo, e acuto, forſe ſcherzo di natura; ivi p. 73. num. 19.
Gallinella aquatica, volgarmente Sutro; Tom. V. p. 2. T. CCCCLXXXIV.
Gallinella Indiana armata, di vario colore; Tom. V. p. 2. T. CCCCLXXXIII.
Gallinella Paluſtre comune; Tom. V. p. 1. T. CCCCLXXXII.
Gallinella piccola Paluſtre; Tom. V. p. 2. T. CDLXXXII.
Gallinella detta Tacana; Tom. V. p. 2. num. 8.
——— armata; ivi num. 9.
——— nera; Tom. V. p. 3. num. 10.
——— ſcura; ivi num. 11.
——— maggiore; Tom. V. p. 2. num. 5.
——— altra; ivi num. 6.
——— minore; ivi num. 7.
Gallo comune, o domeſtico; Tom. II. p. 65. T. CCVII.
Gallo con la creſta a paniera; Tom. II. p. 66. T. CCVIII.
Gallo cornuto; Tom. II. p. 70. T. CCXIII.
Gallo di monte, della ſpecie minore diverſo; Tom. II. p. 83. T. CCXXXV.
Gallo di monte maggiore detto anche Fagiano nero; T. II. p. 83. T. CCXXXVI.
Gallo di monte maggiore, femmina; Tom. II. p. 83. T. CCXXXVII.
Gallo di monte minore; Tom. II. p. 82. T. CCXXXIII.
Gallo di monte minore, femmina; Tom. II. p. 82. T. CCXXXIV.
Gallo nano; Tom. II. p. 70. T. CCIV.
Gallo ricciuto; Tom. II. p. 71. T. CCXV.
Gallo ſcherzoſo; Tom. II. p. 72. T. CCXVI.
Gallo di monte della ſpecie minore punteggiato di bianco; Tom. II. p. 84. num. 6.
——— di coda lunga del Canadà; ivi num. 7.
——— nereggiante con macchie bianche; ivi num. 8.
Gallo, e Gallina bianca con gran ciuffo di penne inteſta; Tom. II. p. 72. num. 11.
——— con i piedi di cinque dita; ivi n. 12.
——— del Giappone; Tom. II. p. 73. n. 18.
——— di Banatam; ivi p. 72. num. 15.
——— d' Inghilterra; ivi num. 14.
——— di Monzambico; ivi num. 16.
——— di Perſia; ivi num. 17.
——— di Turchìa; ivi num. 13.
Gallo Padovano; Tom. II. p. 65. T. CCIX.
Gallo Pavone del Braſile; Tom. II. p. 77. T. CCXXVII.
Gallo Pavone, o Gallo d' India bianco con macchie bionde; Tom. II. p. 76. T. CCXXIV.
Gallo Pavone, o Pollo d' India; Tom. II. p. 75. T. CCXXII.
Gallo Pavone, o Pollo d' India bianco con macchie nere; Tom. II. p. 76. T. CCXXIII.
Gallo Pavone, o Pollo d' India nero; Tom. II. p. 77. T. CCXXV.
Gallo Pavone, o Pollo d' India nero con macchie bianche; Tom. II. p. 77. T. CCXXVI.
Gallo Pavone tutto bianco; Tom. II. p. 78. num. 6.
——— biondo e macchiato di bianco; ivi num. 7.
Gambecchio, o Culetto; Tom. IV. p. 61. T. CCCCLII.
Gambetta di Toſcana; Tom. IV. p. 66. T. CCCCLV.
Gambetta Ferruginea; Tom. IV. p. 66. T. CCCCLXIX.
Gambetta macchiata a ſoggia delle Pernici; Tom. IV. p. 66. T. CCCCLXVII.
Gambetta o Pettegola femmina; Tom. IV. p. 66. T. CCCCLXIV.
Gambetta, o Pettegola maſchio; Tom. IV. p. 65. T. CCCCLXIII.
Gambetta ſcherzoſa; Tom. IV. p. 66. T. CCCCLXVI.

Gambetta Viperina ; Tom. IV. p. 66. T. CCCCLXVIII.
Gambetta bianca della Baja d'Hudſon ; Tom. IV. p. 67. num. 12.
——— cenerina ; ivi num. 11.
——— di Bengala ; num. 13.
——— picchiettata ; Tom. IV. p. 66. num. 10.
——— roſſa ; ivi num. 8.
——— ſtriata ; ivi num. 9.
Garrulo di Boemia ; Tom. II. p. 42. T. CLX.
Gazzera Americana nera o gialla ; Tom. II. p. 41. T. CLVIII.
Gazzera bianca ; Tom. II. p. 41. T. CLVI.
Gazzera comune, Gazza, o Ceceri ; T. II. p. 40. T. CLV.
Gazzera minore di Bengala ; Tom. II. p. 41. T. CLVII.
Gazzera Orientale ; Tom. II. p. 42. T. CLIX.
Gazzera del Senegal ; Tom. II. p. 42. num. 6.
——— di Giammaica ; ivi num. 7.
——— maggiore del Meſſico ; ivi num. 8.
——— piccola, o minore del Meſſico ; ivi num. 9.
Germano marino, e Codone della Baja d'Hudſon ; Tom. V. p. 47. num. 2.
——————— dell'Iſola di Terra nuova ; ivi num. 3.
Ghiandaia bianca ; Tom. II. p. 44. T. CLXII.
Ghiandaia comune ; Tom. II. p. 43. T. CLXI.
Ghiandaia marina ; Tom. II. p. 45. T. CLXIV.
Ghiandaia nocifraga, o Nocciolaia ; Tom. II. p. 44. T. CLXIII
Ghiandaia blù col ciuffo ; del Canadà ; Tom. II. p. 45. num. 7.
———— di Caienna ; ivi num. 5.
———— ſcura del Canadà ; ivi num. 6.
Girifalco ; Tom. I. p. 69. num. 58.
——— d'Iſlanda ; ivi num. 59.
Glareola o Rondone marino, è anche Pernice di mare ; Tom. V. p. 28. T. DXLVII.
Glareola col collare ; Tom. V. p. 29. num. 2.
——— del Senegal ; ivi num. 3.
Gran Piviere di Bengala ; Tom. IV. p. 71. num. 14.
Gran Piviere, volgarmente detto Urigino ; Tom. IV. p. 68. T. CCCCLXXII.
Grue comune o grù ; Tom. IV. p. 44. T. CCCCXV.
Grue d'Affrica ; Tom. IV. p. 44. T. CCCCXIV.
Grue della Baja d'Hudſon ; Tom. IV. p. 45. T. CCCCXVI.
Grue maggiore dell' Indie ; Tom. IV. p. 45. T. CCCCXVII.
Grue d'America ; ivi num. 7.
—— del Giappone ; ivi num. 6.
—— del Meſſico ; Tom. IV. p. 46. num. 5.
Guainumbi col ciuffo ; Tom. IV. p. 40. T. CCCCII. Fig. 2.
Guainumbi colla teſta e collo cremiſi ; Tom. IV. p. 40. T. CCCCII. Fig. 3.
Guſo comune ; Tom. I. p. 85. T. LXXXII.
Guſo di color vario di Virginia ; Tom. I. p. 86. T. LXXXIV.
Guſo di penna diverſa ; Tom. I. p. 85. T. LXXXIII.
Guſo reale ; Tom. I. p. 84. T. LXXXI.

I

Imantopo, volgarmente Angeletto, Merlo aquatico maggiore, e Cavaliere grande Italiano ; Tom. IV. p. 67. T. CCCCLXX.
Imantopo del Meſſico ; Tom. IV. p. 68. num. 2.
Iſpida, volgarmente Uccello S. Maria ; Tom. V. p. 6. T. CCCCLXXXIII.
Iſpida col ciuffo della Carolina ; ivi p. 7. num. 21.
——————— dell'Iſola di S. Domingo ; ivi num. 22.
——————— dell'Iſole Filippine ; Tom. V. p. 6. num. 6.
——————— del Meſſico ; ivi p. 7. num. 23.
——— col collare di Bengala ; ivi num. 15.
——— del Braſile ; ivi num. 19.
——————— col ciuffo ; ivi num. 20.
——— del Capo di Buona Speranza ; ivi p. 6. num. 8.
——— dell'Iſola di Cajenna ; Tom. V. p. 7. num. 10.
——— dell'Iſola di Ternata ; ivi p. 7. num. 26.
——— del Madagaſcar ; ivi p. 7. num. 18.
——— del Senegal ; ivi p. 6. num. 7.
——— di Bengala ; ivi num. 2.
——————— minore ; ivi num. 3.
——— di color celeſte Americana ; ivi p. 7. num. 16.
——— di color celeſte del Madagaſcar ; ivi num. 12.
——— di color nero e bianco variato ; ivi num. 24.
——— di Smirne ; ivi num. 13.
——— Indiana ; ivi p. 6. num. 4.
——————— col ciuffo ; ivi p. 7. num. 17.
——————— col collare ; ivi p. 6. num. 5.
——— maggiore del Senegal ; ivi p. 7. num. 11.
——— maggiore di Bengala ; ivi num. 14.
——— picchiettata del Braſile ; ivi num. 25.
——— verde d'America ; ivi p. 6. num. 9.

L

Lucherino ; Tom. IV. p. 16. T. CCCLXI. Fig. 2.

M

Manucodiata, o Uccello di Paradiſo ; Tom. I. p. 76. T. LXIII.
Manucodiata ſenza piedi, come ordinariamente ſi vede nei Muſei ; Tom. I. p. 78. T. LXIV. Fig. 2.
Manucodiata nera ; Tom. I. p. 77. T. LXIV. Fig. 1.
Manucodiate altre preteſe varietà ; Tom. I. p. 78. T. LXV. Fig. 1. 2.
Marangone, o ſia Corvo *aquatico* ; Tom. V. p. 12. T. DI.
Marangone, di *becco e piedi gialli* ; Tom. V. p. 13. T. DII.
Marangone pereggiante minore ; Tom. V. p. 13. T. DII.
Marangone volgarmente in Toſcana Perdigiorno ; Tom. V. p. 13. T. DIV.
Maſſaiola bianca ; Tom. IV. p. 30. T. CCCLXXXIV. Fig. 1.
Maſſaiola o Cul-bianco ; Tom. IV. p. 30. T. CCCLXXXIII. Fig. 2.
Meleagride o Gallina di Faraone ; Tom. II. p. 79. T. CCXXX.
Meleagride o Gallina di Faraone bianca ; Tom. II. p. 80. T. CCXXXI.
Meleagride diverſa, detta Gallina d' Egitto ; Tom. II. p. 80. T. CCXXXII.
Mellivoro altrimenti Uccello Moſca ; Tom. IV. p. 39. T. CCCCII. Fig. 1.

Mellivoro con il collare del Surinam; Tom. IV. p. 41. T. CCCCVI. Fig. 2.
Mellivoro della Carolina con la coda cremisi Tom. IV. p. 40. T. CCCCIV. Fig. 1.
Mellivoro dell' antecedente ſpecie, femmina; Tom. IV. p. 40. T. CCCCIV. Fig. 2.
Mellivoro di Ceilan; Tom. IV. p. 40. T. CCCCV. Fig. 3.
Mellivoro di coda lunga di Giammaica; Tom. IV. p. 41. T. CCCCVI. Fig. 2.
Mellivoro Falcinello bruno di Ceilan; Tom. IV. p. 41. T. CCCCVII. Fig. 2.
Mellivoro Falcinello in gran parte ceruleo; Tom. IV. p. 41. T. CCCCVII. Fig. 1.
Mellivoro, o Colibri del Meſſico; Tom. IV. p. 40. T. CCCCIV. Fig. 3.
Mellivoro, o Uccello Moſca del Surinam; Tom. IV. p. 40. T. CCCCV. Fig. 1.
Mellivoro verde del Surinam di coda lunga; Tom. IV. p. 40. T. CCCCIII. Fig. 2.
Mellivoro verde e blù del Surinam; Tom. IV. p. 40. T. CCCCIII. Fig. 1.
Mellivoro con la gola roſſa del Braſile; Tom. IV. p. 41. num. 22.
——— d' America con la gola color di topazzo; ivi num. 16.
——— del Braſile di coda biforcata; ivi num. 24.
——— dell' Iſola di S. Domingo; ivi num. 17.
——— di Caienna; ivi num. 18.
——— con la gola picchiettata; ivi num. 19.
——— col ventre bianco; ivi num. 20.
——— grigio; ivi num. 21.
——— di coda biforcata; ivi num. 25.
——— di Giammaica con la coda biforcata; ivi num. 26.
——— di color violaceo; ivi num. 27.
——— maggiore di Caienna; ivi num. 23.
Mergo brizzolato, o ſia Artico; Tom. V. p. 14. T. DVII.
Mergo maggiore, volgarmente Smergo, o Colimbo maſſimo; Tom. V. p. 13. T. DV.
Mergo o Smergo maggiore, forſe Femmina; Tom. V. p. 14. T. DVI.
Mergo di gola nera Tom. V. p. 14. num. 6.
——— roſſa; ivi num. 5.
——— minore; ivi num. 4.
——— Picchiettato, ivi p. 15. num. 7.
Mergo-Oca cenerino di capo roſſiccio; Tom. V. p. 16. T. DXI.
Mergo-Oca detto Oca marina; Tom. V. p. 15. T. DVIII.
Mergo-Oca di becco lungo col ciuffo; Tom. V. p. 15. T. DIX.
Mergo-Oca di becco lungo, forſe la Femmina; Tom. V. p. 16. T. DX.
Mergo-Oca minore detto Monaca bianca; Tom. V. p. 16. T. DXVI.
Mergo-Oca minore femmina; Tom. V. p. 16. T. DXIV.
Mergo-Oca nero e bianco, detto Domenicano; Tom. V. p. 16. T. DXII.
Mergo-Oca cenerino; Tom. V. p. 16. num. 10.
——— col ciuffo della Virginia; ivi num. 11.
——— nero; ivi num. 8.
——— ſtellato; ivi num. 9.
Merla aquatica, o acquaiola comune; Tom. V. p. 5. T. CCCCLXXXX.
Merla aquatica di petto ceruleo ſcuro; Tom. V. p. 5. T. CCCCLXXXXI.
Merla aquatica nera; Tom. V. p. 6. T. CCCCLXXXXII.
Merla del Braſile Tom. III. p. 49. T. CCCVI.
Merla comune, o femmina; Tom. III. p. 46. T. CCC.
Merla Falba, o bianca; Tom. III. p. 46. T. CCCI.
Merla roſſa, o cremiſi del Braſile; Tom. III. p. 48. T. CCCV.
Merla torquata, o ſia col collare; Tom. III. p. 48. T. CCCIV.
Merlo bianco; Tom. III. p. 47. T. CCCIII.
Merlo comune o maſchio; Tom. III. p. 46. T. CCXCIX.
Merlo in gran parte bianco; Tom. III. p. 47. T. CCCII.
Merope volgarmente in Toſcana Tordo marino; Tom. V. p. 7; T. CCCCLXXXXIV.
Merope col capo giallo; Tom. V. p. 8. num. 2.
——— d' Angola; ivi num. 11.
——— del Braſile; ivi num. 4.
——— dell' Iſola di Francia; ivi num. 6.
——— del Madagaſcar; ivi num. 7.
——— col collare; ivi num. 8.
——— del Meſſico; ivi num. 5.
——— di Bengala col collare; ivi num. 9.
——— gialliccia; ivi num. 3.
——— maggiore dell' Iſole Filippine; ivi num. 12.
——— minore dell' Iſole Filippine; ivi num. 10.
——— d' India; ivi num. 13.
Meſtolone o Fiſtione Femmina; Tom. V. p. 45. T. DXXIII.
Meſtolone o Fiſtione del Meſſico; Tom. V. p. 45. n. 4.
——— di ventre bianco; ivi num. 3.
Migliarino; Tom. IV. p. 20. T. CCCLXIV. Fig. 1.
Migliarino di Padule; Tom. III. p 69. T. CCCXXXVI.
Mituporanga Curaſſavica; Tom. II p. 79. T. CCXXIX.
Mituporanga del Braſile; Tom. II. p. 78. T. CCXXVIII.
Mituporanga del Meſſico, detta ivi Hoactzin; Tom. II. p. 79. num. 5.
——— del Meſſico, ivi detta Pauxi; ivi num. 4.
——— del Perù; ivi num. 6.
——— Mitu, o Mutu dei Braſiliani; ivi num. 3.
Monachino o Ciuffolotto femmina; Tom. III. p. 61. T. CCCXXI. Fig. 2.
Monachino o Ciuffolotto maſchio; Tom. III. p. 61. T. CCCXXI. Fig. 1.
Monachino bianco ſcherzoſo; Tom. III. p. 62. T. CCCXXII. Fig. 2.
Monachino d' Angola detto di Paradiſo; Tom. III. p. 62. T. CCCXXIV. Fig. 1.
Monachino di Bengala con la teſta gialla; Tom. III. p. 62. T. CCCXXIII. Fig. 1.
Monachino Indiano in gran parte roſſo; Tom. III. p. 62. T. CCCXXIII. Fig. 2.
Monachino roſſo ſcherzoſo; Tom. III. p. 62. T. CCCXXII. Fig. 1.
Monachino bianco; Tom. III. p. 62. num. 9.
——— d' America col ciuffo; ivi p. 63. num. 17.
——— d' Amburgo; ivi p. 62. num. 10.
——— nero d' Affrica; ivi p. 63. num. 12.
——— del Meſſico; ivi num. 11.
——— turchino del Braſile; ivi num. 13.
——— della Carolina; ivi num. 14.
——— tutto nero; Tom. III. p. 62. num. 8.
——— violetto della Carolina; ivi p. 63. num. 15.
——— o porporino dell' Iſola di Bahama; ivi num. 16.
Montanello o Fanello; Tom. III. p. 77. T. CCCLVI. Fig. 1.

Montanello o Fanello maggiore; Tom. III. p. 77. T. CCCLVII. Fig. 1.
Montanello o Fanello minore; Tom. III. p. 77. T. CCCLVI. Fig. 2.
Montanello o Fanello comune; Tom, III. p. 77. num. 4.
———— dell' Aquila; ivi num. 5.
———— di coda lunga del Brafile; ivi p. 78. num. 7.
———— di Trasburgo; ivi p. 77. num. 6.
Moretta Femmina; Tom. V. p. 50. T. DXCII.

O

Oca comune detta Papera, e Pavera; Tom. V. p. 36. T. DLVIII.
Oca di vario colore, detta Oca Lombardella; Tom. V. p. 38. T. DLX.
Oca di vario colore, detta Oca Paglietana; Tom. V. p. 38. T. DLIX.
Oca falvatica; Tom. V. p. 38. T. DLXI.
Oca fettentrionale di piume morvidiffime; Tom. V. p. 39. T. DLXII.
Oca Arborea detta ancora dagli Autori Bernicca; Tom. V. p. 40. num. 14.
———— minore; ivi num. 15.
—— della Guinea; ivi p. 39. num. 10.
—— detta comunemente Brenta dagli Autori; ivi p. 40. num. 16.
—— di Gambaia; ivi num. 11.
—— di Mofcovia; ivi p. 39. num. 9.
—— Nivale; ivi p. 40 num 13.
—— falvatica del Canadà; ivi p. 39. num. 7.
———— della Baja d'Hudfon; ivi num. 8
———— del Nord; ivi num. 6.
—— ftata detta da alcuni di Egitto, e da altri di Spagna; ivi p. 40. num. 12.
Onocrotalo o Pellicano; Tom. V. p. 11. T CCCCLXXXXIX.
Onocrotalo o Pellicano d' America; Tom. V. p. 12. T. D.
Onocrotalo o Pellicano dell' Ifole Filippine; ivi p. 12. num 4.
———— del Meffico: ivi num 3.
Ortolano giallo; Tom. III. p. 74. T. CCCLI. Fig. 2.
Ortolano nivale o di Montagna; Tom. III. p. 74. T. CCCLII. Fig. 1.
Ortolano bianco; Tom. III. p. 75. num. 6.
———— comune; ivi num. 5.
———— del Brafile; ivi num. 14.
———— del Canadà; ivi num. 12.
———— celeffe ivi num. 13.
———— del Capo di Buona Speranza, ivi num. 9.
———— della Carolina; ivi num 10.
———— della Lovifiana; ivi num 8.
———— del Surinam; ivi p. 76 num. 16.
———— di coda bianca; ivi p. 75. num. 7.
———— di S. Domingo; ivi num. 15.
———— Nivale bianco nel ventre; ivi num. 11.
Oftralega volgarmente Beccaccia di Mare; Tom IV. p. 68. T. CCCCLXVI.
Otarda o Starda Arabica; Tom. III. p. 27. T. CCLXVI.
Otarda o Starda maggiore; T. III. p. 27. T. CCLXV.
Otarda o Starda minore; Tom. III. p. 26. T. CCLXIV.

P

Pantana detta in Toscana Moschettone; Tom. IV. p. 63. T. CCCCLX.
Pantana volgarmente Pittima; Tom. IV. p. 64. T. CCCCLXII.
Pantana volgarmente Verdercllo; Tom. IV. p. 64. T. CCCCLXI.
Pantana bianca della Baja d'Hudfon; Tom. IV. p. 65 num. 8.
——— grigia; ivi p. 64. num. 4.
——— roffeggiante; ivi num. 5.
———— d'America; ivi p. 65. num. 7.
———— maggiore; ivi num. 6.
Paoncella o Paoncello comune; Tom. IV. p. 71. T. CCCCLXXIX.
Paoncella armata della Luifiana; Tom. IV. p. 71. T. CCCCLXXX
Paoncella armata dell'Ifola di S. Domingo; Tom. IV. p. 72. num. 8.
———— del Senegal; ivi num. 7.
——— cenerina; ivi p. 71. num. 3.
——— di vario colore; ivi num. 4.
——— maggiore di Bologna; ivi num. 6.
——— Svizzera; ivi num. 5.
Pappagallo cenerino di Guinea; Tom. I. p. 95. T. CXII.
Pappagallo col capo di Falco; Tom. I. p. 96. T. CXX.
Pappagallo col capo roffo e giallo; Tom. II. p. 17. T CXXI.
Pappagallo cremifi; Tom. I. p. 94. T. CV.
Pappagallo cremifi dell'Ifole Molucche; Tom. I. p. 94. T. CVI.
Pappagallo del Paefe delle Amazzoni; Tom I. p 95. T. CXIV.
Pappagallo del Paefe delle Amazzoni varicgato; Tom. I p. 96. T. CXV.
Pappagallo detto Arara roffa del Brafile; Tom. I. p. 93. T. CII.
Pappagallo detto Arara turchina e gialla del Brafile, Tom. I. p. 94. T. CIII.
Pappagallo detto Arara verde del Brafile; Tom. I. p. 92 T. CI
Pappagallo detto Cacatua; Tom. I. p. 96. T. CXVII.
Pappagallo detto Cacatua, con la creda roffa; Tom. I. p. 96. T. CXVIII.
Pappagallo detto Cacatua minore; Tom. I. p. 96. T. CXIX.
Pappagallo detto Parrucchetto col ciuffo; Tom. II. p. 21. T. CXXXI.
Pappagallo detto Parrucchetto con collana; Tom. II. p. 19 T. CXXIV.
Pappagallo detto Parrucchetto d' America; Tom. II. p. 19. T. CXXV.
Pappagallo detto Parrucchetto nero; Tom. II. p. 20. T. CXXVIII.
Pappagallo detto Parrucchetto verde fcuro; Tom. II. p. 19. T. CXXVI.
Pappagallo di color cremifi; Tom. I. p. 94. T. CIV.
Pappagallo di color vario del Brafile; Tom. I. p. 96. T. CXVI.
Pappagallo di Guinea cenerino mifto di roffo, Tom. I. p. 95 T. CXIII.
Pappagallo giallo; Tom. II. p. 18. T. CXXII.

Pappaggallo giallo del Braſile; Tom. I. p. 95. T. CXI.
Pappagallo minore, o Parrucchetto con la ſommità del capo blù e la fronte gialla; Tom. II. p. 20. T. CXXVII.
Pappagallo minore, o Parrucchetto dell'Indie Orientali; Tom. II. p. 20. T. CXXIX.
Pappagallo minore, o Parrucchetto dell'Iſola di Lucon; T. II. p. 21. T. CXXX.
Pappagallo minore, o Parrucchetto verde; Tom. II. p. 18. T. CXXIII.
Pappagallo minore, o ſia Parrucchetto col capo roſſo del Regno di Gingi; Tom. II. p. 21. T. CXXXII.
Pappagallo minore verde e cremiſi d'America; Tom. II. p. 22. T. CXXXV.
Pappagallo piccoliſſimo con la fronte e la gola roſſa; Tom. II. p. 21. T. CXXXIII.
Pappagallo piccoliſſimo con la fronte e la groppa roſſa; Tom. II. p. 21. T. CXXXIV.
Pappagallo verde col capo e collo giallo; Tom. I. p. 95. T. CX.
Pappagallo verde del Braſile, col capo bianco; Tom. I. p. 95. T. CIX.
Pappagallo verde del Braſile col capo giallo, e la fronte celeſte; Tom. I. p. 95. T. CVIII.
Pappagallo verde del Braſile con la teſta celeſte e bianca; Tom. I. p. 94. T. CVII
Pappagallo aſſai piccolo di Malacca; Tom. II. p. 27. num. 102.
——— o Parrucchetto del Braſile; ivi num. 101.
——— col capo roſſo del Braſile; ivi num. 99.
——— tutto verde del Braſile; ivi num. 100.
——— bruno; ivi p. 25. num. 75.
——— celeſte della Guiana; ivi p. 24. num. 68.
——— cenerino del Braſile; ivi p. 25. num. 73.
——— sbiancato con le ale e la coda roſſa; ivi p. 23. num. 44.
——— col capo celeſte del Braſile; ivi num. 49.
——— roſſo del Braſile; ivi num. 52.
——— con la fronte bianca della Martinicca; ivi num. 54.
——— roſſa del Braſile; ivi p. 24. num. 58.
——— con la teſta turchina della Guiana; ivi num. 57.
——— cremiſi dell' Iſola di Borneo; ivi p. 26. num. 95.
——— dell' Iſola di Ceram; ivi p. 22. num. 43.
——— dell'Iſola di Caienna; ivi p. 23. num. 51.
——— della China; ivi p. 24. num. 65.
——— della Guadaluppa; ivi num. 66.
——— della Martinicca, con la gola roſſa; ivi p. 23. num. 55.
——— con la teſta celeſte; ivi num. 56.
——— del Paeſe delle Amazzoni; ivi p. 24. num. 59.
——— col becco variegato; ivi num. 64.
——— con la fronte gialla; ivi num. 60.
——— con la gola gialla; ivi num. 61.
——— e della Giammaica; ivi num. 63.
Pappagallo del Paeſe delle Amazzoni; meno macchiato di giallo; ivi num. 62.
——— variegato; ivi num. 61. *
——— detto Arara blù e gialla di Giammaica; ivi p. 22. num. 38.
——— di color vario; ivi num. 39.
——— di Giammaica; ivi num. 37.
——— verde del Braſile; ivi num. 40.
——— verde e roſſa del Braſile; ivi num. 41.
——— detto Cacatua tutto bianco; ivi p. 22. n. 42.
——— detto Parrucchetto d'America di coda lunga; ivi p. 24. num. 80.
——— di coda roſſa di Giammaica; ivi p. 23. num. 53.
——— di Guinea con le ale roſſe; ivi p. 25. num. 71.
——— di teſta e petto giallo; ivi p. 23. num. 48.
——— giallo dell'Iſola di Cuba; ivi p. 25. n. 70.
——— del Meſſico; ivi p. 24. num. 69.
——— minore col ciuffo del Iſola di Giava; ivi p. 27. num. 98.
——— cremiſi dell'Indie; ivi num. 96.
——— d'Amboina; ivi num. 97.
——— del Braſile; ivi p. 26. num. 85.
——— della Guiana; ivi p. 25. num. 78.
——— dell'Iſola di Caienna; ivi p. 26. num. 84.
——— giallo del Braſile; ivi num. 94.
——— di Angola; ivi p. 25. n. 79.
——— o Parrucchetto con collana; ivi num. 81.
——— dell'Iſola di Borbone; ivi num. 83.
——— di Bengala; ivi num. 82.
——— del Giappone; ivi num. 91.
——— della Carolina; ivi num. 87.
——— della Martinicca con la fronte e la gola ſcura; ivi num. 90.
——— del Regno di Gingi; ivi num. 88.
——— di coda lunga; ivi num. 89.
——— variegato d'Amboina; ivi num. 92.
——— dell'Indie Orientali; ivi num. 93.
——— verde con la fronte roſſa; ivi p. 28. num. 111.
——— piccolo del Braſile; ivi num. 110.
——— del Senegal; ivi num. 108.
——— giallo del Braſile; ivi p. 27. num. 107.
——— o Parrucchetto col ciuffo; ivi p. 28. num. 109.
——— con la gola gialla; ivi p. 27. num. 105.
——— con la teſta gialla del Braſile; ivi num. 106.
——— del Iſole Filippine; ivi num. 103.
——— del Madagaſcar; ivi num. 104.
——— roſſo con collana gialla; ivi p. 23. num. 46.
——— roſſo e nero del Braſile; ivi num. 45.
——— ſcuro; ivi p. 25. num. 70.
——— ſcuro del Meſſico; ivi p. 24 num. 67.

Pappagallo ſuperiormente di color cremiſi pieno; ivi p. 23. num. 47.
——— verde del Meſſico col petto bianco; ivi p. 25. num. 72.
——— verde di coda lunga; ivi num. 77.
——— verde e giallo dell' Iſola di Barbados; ivi p. 23. num. 50.
——— (feſtoſo) di coda corta; ivi p. 25. num. 76.
——— minore di coda lunga; ivi p. 26. num. 86.
Paſſera volgare; Tom. III. p. 72. T. CCCXXXX. Fig. 1.
Paſſera volgare domeſtica; Tom. III. p. 72. T. CCCXXXX. Fig. 2.
Paſſera alpeſtre; Tom. III. p. 73. T. CCCXXXXI. F. 2.
Paſſera d' America; Tom. III. p. 73. T. CCCXXXXII. Fig. 2.
Paſſera dell' Iſola di S. Tommaſo; Tom. III. p. 73. T. CCCXXXXIII. Fig. 1.
Paſſera del Meſſico; Tom. III. p. 73. T. CCCXXXXIII. Fig. 2.
Paſſera Illirica; Tom. III. p. 73. T. CCCXXXXII. Fig. 1.
Paſſera Mattugia dell' Olina; Tom. III. p. 72. T. CCCXXXIX. Fig. 1.
Paſſera Mattugia ſcherzoſa; Tom. III. p. 72. T. CCCXXXIX. Fig. 2.
Paſſera ſelvatica; Tom. III. p. 73. T. CCCXXXX. Fig. 1.
Paſſera ſolitaria; Tom. III. p. 54. CCCX.
Paſſera ſolitaria celeſte; Tom. III. p. 55. T. CCCXI.
Paſſere del Braſile dette Papiglioni o Farfalle; Tom. III. p. 73. T. CCCXXXXIV.
Paſſera ſolitaria celeſte; Tom. III. p. 56. num. 3.
——— dell' Iſole Filippine; ivi num. 5.
——— Manille, ivi num. 4.
Pavone, detto anco Paone, maſchio; Tom. II. p. 73. T. CCXVII.
Pavone o Paone bianco; Tom. II. p. 74. T. CCXVIII.
Pavone della China femmina; Tom. II. p. 75. T. CCXX.
Pavone della China maſchio; Tom. II. p. 74. T. CCXIX.
Pavone del Regno di Tibet; Tom. II. p. 75. T. CCXXI
Pavone del Giappone, Tom. II. p. 75. num. 7.
——— della ſpecie comune vario; ivi num. 6.
Peciotto altrimenti Picchio minimo celeſte di Ceilan; Tom. II. p. 55. T. CXCIV. Fig. 1.
Peciotto o Picchio del Canadà; Tom. II. p. 54. T. CXCIII. Fig. 2.
Peciotto o Picchio minimo dell' Indie; Tom. II. p. 55. T. CXCIV. Fig. 2.
Peciotto o Picchio piccolo grigio; Tom. II. p. 54. T. CXCIII. Fig. 1.
Peciotto o Picchio piccoliſſimo della Carolina; ivi p. 55. num. 7.
——— piccolo della Carolina; ivi num. 6.
——— della Giammaica, ivi num. 5.
Pellicano o Meſtolone; Tom. IV. p. 53. T. CCCCXXXVII.
Pellicano o Meſtolone color di roſa, Tom. IV. p. 54. T. CCCCXXXVIII.
Pellicano o Meſtolone cremiſi; ivi p. 55. num. 3.
Pernice bianca; Tom. III. p. 21. T. CCLV.
Pernice col petto bianco; Tom. III. p. 23. T. CCLIV.
Pernice comune; Tom. III. p. 20. T. CCLIII.
Pernice d' Affrica, o di Barberia; Tom. III. p. 22. T. CCLVII.
Pernice maggiore, o Coturnice; Tom. III. p. 21. T. CCLVI.
Pernice d' America; Tom. III. p. 23. num. 15.
Pernice del Braſile; ivi num. 12.
——— maggiore; ivi num. 13.
——— della China; ivi num. 17.
——— della Nuova Inghilterra; ivi num. 14.
——— del Senegal; ivi num. 16.
——— di monte; ivi num. 10.
——— o Starna di montagna del Meſſico; ivi num. 11.
Pettiroſſo; Tom. IV. p. 35. T. CCCXCVI. Fig. 2.
Picchio brizzolato di Bengala; Tom. II. p. 50. T. CLXXIX.
Picchio col capo e collo roſſo di Virginia; Tom. II. p. 50. T. CLXXVI.
Picchio con i piedi a tre dita; Tom. II. p. 5. T. CLXXX.
Picchio d'alto volo di Guinea; Tom. II. p. 49. T. CLXXIII.
Picchio del Capo di Buona Speranza; Tom. II. p. 50. T. CLXXV.
Picchio Indiano in gran parte celeſte; Tom. II. p. 51. T. CLXXXI.
Picchio maggiore variegato del Meſſico; Tom. II. p. 50. T. CLXXVIII.
Picchio nero col ciuffo di Caienna; Tom. II. p. 49. T. CLXXIV.
Picchio nero o Picchio corvo; Tom. II. p. 49. T. CLXXII.
Picchio vario; Tom. II. p. 46. T. CLXVI.
Picchio vario Indiano; Tom. II. p. 48. T. CLXXI.
Picchio vario maggiore; Tom. II. p. 47. T. CLXVII.
Picchio vario maggiore con le penne del petto mutate; Tom. II. p. 47. T. CLXVIII.
Picchio vario maſſimo; Tom. II. p. 47. T. CLXIX.
Picchio vario minore; Tom. II. p. 48. T. CLXX.
Picchio verde; Tom. II. p. 45. T. CLXV
Pigliomoſche o Saltinſelce moro; Tom. IV. p. 29. T. CCCLXXXII. Fig. 1.
Pigliamoſche o Saltinvanghile; Tom. IV. p. 29. T. CCCLXXXII. Fig. 2.
Pigliamoſche o Saltinvanghile femmina; Tom. IV. p. 30. T. CCCLXXXIII. Fig. 1.
Pinguino maggiore; Tom. V. p. 10. T. CCCCLXXXXVII.
Pinguino comune; Tom. V. p. 10. num. 2.
——— detto da Linneo Fetonte Demerſo; ivi p. 11. num. 4.
——— detto Patagone; ivi num. 5.
——— minore; ivi num. 3.
Piovanello; Tom. IV. p. 61. T. CCCCLXVII.
Piſpola comune; Tom. IV. p. 32. T. CCCLXXXVII. Fig. 2.
Piſpola di Padule, *detta Foſſaccio*; Tom. IV. p. 32. T. CCCLXXXVIII. Fig. 1.
Piſpola *maggiore* o Piſpolone; Tom. IV. p. 32. T. CCCLXXXIX. Fig. 1.
Piſpola o Allodola di Mare; Tom. IV. p. 60. T. CCCCLI.
Piſpola ſpecie di Cutrettola detta Spioncella; Tom IV. p. 32. T. CCCLXXXVIII. Fig. 2.
Piſpola Tordina; Tom. IV. p. 32. T. CCCLXXXVII. Fig. 2.
Piviere armato del Senegal; Tom. IV. p. 71. T. CCCCLXXVIII.
Piviere col collare dell' Iſola di S. Domingo; Tom. IV. p. 70. T. CCCCLXXVII.
Piviere o Corriere biondo; Tom. IV. p. 69. T. CCCCLXXIV.
Piviere o Corriere col collare; Tom. IV. p. 70. T. CCCCLXXVI.
Piviere o Corriere maggiore femmina; Tom. IV. p. 70. T. CCCCLXXV.

Piviere dorato; Tom. IV. p. 69. T. CCCCLXXIII.
Piviere col collare della Virginia; Tom. IV. p. 71. num. 12.
———— di Giammaica; ivi num. 13.
——— dorato; Tom. IV. p. 70. num. 8.
———— della Baja d' Hudſon; ivi num. 10.
———— dell' Iſola di S. Domingo; ivi num. 9.
——— minore col collare; ivi num. 11.
——— Perſiano col ciuffo; ivi p. 71. num. 15.
Pollo Sultano; Tom. V. p. 3. T. CCCCLXXXV.
Pollo Sultano Femmina; Tom. V. p. 4. T. CDLXXXVII.
Pollo Sultano volgarmente Cimandorlo, e in Toſcana Fiumalbo; Tom. V. p. 3. T. CCCCLXXXVI.
Pollo Sultano col capo nero; Tom. V. p. 4. num. 4.
———— della Baja d' Hudſon; ivi num. 9.
———— del Maderaſpatan; ivi num. 10.
———— di color foſco; ivi num. 6.
———— roſſeggiante; ivi num. 8.
———— roſſiccio; ivi num. 7.
———— verde; ivi num. 5.
Procellaria o ſia Uccello di tempeſta; Tom. V. p. 25. T. DXXXVIII.
Procellaria brizzolata; Tom. V. p. 25. num. 3.
———— cenerina; ivi num. 2.
Puffino minore, volgarmente Berta minore; Tom. V. p. 24. T. DXXXVII.
Puffino o Procellaria Equinoziale, e volgarmente Berta maggiore; Tom. V. p. 23. T. DXXXVI.
Puffino cenerino; Tom. V. p. 25. num. 3.
——— del Braſile; ivi num. 5.
——— del Capo di Buona Speranza; ivi num. 4.

R

Raperino o Verdarino; Tom. IV. p. 15. T. CCCLXI. Fig. 1.
Regino di mare; Tom. IV. p. 63. T. CCCCLIX.
Regolo comune detto Luì; Tom. IV. p. 33. T. CCCXC. Fig. 1.
Regolo cenerino o comune maggiore; Tom. IV. p. 33. T. CCCXCI. Fig. 1.
Regolo col ciuffo, detto in Toſcana Fiorrancio; Tom. IV. p. 33. T. CCCXC. Fig. 2.
Regolo d' America con le ale nere; Tom. III. p. 78. T. CCCLX. Fig. 1.
Regolo del Capo di Buona Speranza; Tom. IV. p. 39. T. CCCCI. Fig. 2.
Regolo del Capo di Buona Speranza di color tabaccato; Tom. III. p. 78. T. CCCLVIII. Fig. 1.
Regolo del Capo di Buona Speranza di color tutto ſcuro, Tom. III. p. 78. T. CCCLVIII. Fig. 2.
Regolo del Capo di Buona Speranza maſchio; Tom. III. p. 78. T. CCCLVII. Fig. 2.
Regolo del Capo di Buona Speranza ſuperiormente celeſte; Tom. III. p. 78. T. CCCLIX. Fig. 1.
Regolo di Corarao; Tom. IV. p. 39. T. CCCCI. Fig. 1.
Rigogolo comune maſchio; Tom. III. p. 52. T. CCCVII.
Rigogolo bianco; Tom. III. p. 53. T. CCCIX.
Rigogolo giallo; Tom. III. p. 53. T. CCCVIII.
Rigogolo della Concinchina; Tom. III. p. 54. num. 4.
———— di Bengala; ivi num. 6.
———— Indiano; ivi num. 5.
———— o Merla di due colori; ivi num. 7.
———— o Tordo, chiamato Garrulo di Boema; ivi num. 8.
Rigopſalia detta dai Franceſi Becco-a-Forbice; Tom. V. p. 29. T. DXLVIII.
Rigopſalia roſſiccia; Tom. III. p. 30. num. 2.
Roncaſo o Francolino di Monte; Tom. II. p. 84. T. CCXXXVIII.
Roncaſo o Lagopo; Tom. II. p. 85. T. CCCXXXIX.
Roncaſo o Lagopo bianco; Tom. II. p. 85. T. CCXL.
Roncaſo o Lagopo col ciuffo di Penſilvania; Tom. II. p. 86. num. 10.
———— d' America; ivi num. 9.
———— del Canadà; ivi num. 7.
———— della ſpecie comune; ivi num. 4.
———— detto dei Pirenei; ivi num. 5.
———— di Scozia; ivi num. 6.
———— maggiore del Canadà; ivi num. 8.
Rondine comune; Tom. IV. p. 42. T. CCCCIX. Fig. 1.
Rondine bianca; Tom. IV. p. 42. T. CCCCX. Fig. 2.
Rondine domeſtica; Tom. IV. p. 42. T. CCCCVIII. Fig. 2.
Rondine comune o domeſtica ſcherzoſa; Tom. IV. p. 42. T. CCCCX. Fig. 1.
Rondine della Carolina; Tom. IV. p. 42. T. CCCCXI. Fig. 2.
Rondine maggiore o Rondone col ciuffo; Tom. IV. p. 43. T. CCCCXII. Fig. 2.
Rondine maggiore o Rondone dello Stretto di Gibilterra; Tom. IV. p. 43. T. CCCCXIII.
Rondine maggiore, volgarmente Rondone comune; Tom. IV. p. 43. T. CCCCXII. Fig. 1.
Rondine riparia della Concinchina; Tom. IV. p. 42. T. CCCCXI. Fig. 1.
Rondine riparia o Baleſtruccio; Tom. IV. p. 42. T. CCCCVIII. Fig. 1.
Rondine riparia o Montana ſcura; Tom. IV. p. 42. T. CCCCIX. Fig. 2.
Rondine (altra) domeſtica; Tom. IV. p. 44. num. 12.
———— d' America; ivi num. 20.
———— dell' Iſola di Caienna; ivi num. 14.
———— dell' Iſola di S. Domingo; ivi num. 13.
———— della Carolina; ivi num. 19.
———— della Martinicca; ivi num. 18.
———— del Perù; ivi num. 16.
———— del Perù (altra); ivi num. 17.
———— del Senegal; ivi num. 15.
———— maggiore o Rondone del Iſola di S. Domingo; ivi num. 22.
———— Riparia del Senegal; ivi num. 21.
Ruſignolo comune; Tom. IV. p. 38. T. CCCC. Fig. 2.
Ruſignolo di Padule groſſo; Tom. IV. p. 38. T. CCCC. Fig. 1.
Ruſignolo di Padule piccolo; Tom. IV. p. 37. T. CCCXCIX. Fig. 2.
Ruſignolo del Madagaſcar; Tom. IV. p. 38. num. 4.

S

Sagginale grande; Tom. IV. p. 62. T. CCCCLV.
Sagginale piccolo; T. IV. p. 62. T. CCCCLIV.
Scricciolo o Re di macchia; Tom. IV. p. 32. T. CCCLXXXIX. Fig. 2.
Serino d' Angola o Maſcherino; Tom. IV. p. 19. T. CCCLXIII. Fig. 2.
Serino delle Canarie o Canarino; Tom. IV. p. 17. T. CCCLXII. Fig. 1.
Serino o Canarino dell' Elba; Tom. IV. p. 18. T. CCCLXII. Fig. 2.

Scrino o Canarino Spurio; Tom. IV. p. 18. T. CCCLXIII. Fig. 1.
Sgarza bianca maggiore caprina; Tom. IV. p. 48. T. CCCCXXVI.
Sgarza detta Airone cenerino; Tom. IV. p. 46. T. CCCCXXI.
Sgarza detta Airone cenerino maggiore col ciuffo; Tom. IV. p. 48. T. CCCCXXVII.
Sgarza dell'antecedente ſpecie col ciuffo diverſo; Tom. IV. p. 48. T. CCCCXXVIII.
Sgarza detta Ciuffetto maſchio; Tom. IV. p. 46. T. CCCCXIX.
Sgarza dell'antecedente ſpecie femmina; Tom. IV. p. 46. T. CCCCXX.
Sgarza detta volgarmente Guacco nereggiante; Tom. IV. p. 46. T. CCCCXVIII.
Sgarza Granocchiaia femmina; Tom. IV. p. 49. T. CCCCXXXI.
Sgarza Granocchiaia maſchio; Tom. IV. p. 49. T. CCCCXXX.
Sgarza Marina altrimenti Airone di marc; Tom. IV. p. 49. T. CCCCXXIX.
Sgarza Nitticora o Airone cenerino minore e creſtato; Tom. IV. p. 47. T. CCCCXXII.
Sgarza o Airone bianco maggiore; Tom. IV. p. 48. T. CCCCXXV.
Sgarza o Airone minore bianco; Tom. IV. p. 47. T. CCCCXXIII.
Sgarza o Airone minore bianco Caprino; Tom. IV. p. 48. T. CCCCXXIV.
Sgarza Stellare o Ardea Stellare; Tom. IV. p. 49. T. CCCCXXXII.
Sgarza candida del Braſile; Tom. IV. p. 50. num. 26.
——— della Carolina; ivi num. 27.
——— del Meſſico; ivi num. 28.
——— cenerina; ivi p. 49. num. 16.
——— d'America; ivi num. 18.
——— del Meſſico; ivi num. 17.
——— col ciuffo dell'Iſola di Caienna; ivi num. 15.
——— della Baja d'Hudſon col ciuffo; ivi num. 19.
——— del Meſſico col ciuffo; ivi p. 50. num. 23.
——— della Virginia col ciuffo; ivi num. 22.
——— grigia; ivi p. 49. num. 21.
——— nera; ivi p. 50. num. 29.
——— col collare; ivi num. 30.
——— picchiettata; ivi p. 49. num. 20.
——— porporeggiante; ivi p. 50. num. 24.
——— porporeggiante del Meſſico; ivi num. 25.
——— Stellare del Braſile; ivi num. 36.
——— della Baja d'Hudſon; ivi num. 31.
——— maggiore col ciuffo; ivi num. 34.
——— minore; ivi num. 32.
——— picchiettata; ivi num. 37.
——— d'America; ivi num. 38.
——— roſſiccia; ivi num. 35.
——— ſtriata; ivi num. 33.
Sgarzetta; Tom. IV. p. 51. num. 50.
——— picchiettata; ivi num. 51.
Sparviere comune da Fringuelli; Tom. I. p. 49. T. XVI.
Sparviere bianco di Moſcovia macchiato di nero; Tom. I. p. 60. T. XXX.
Sparviere da Colombi; Tom. I. p. 54. T. XXI.
Sparviere da Colombi con penne mutate; Tom. I. p. 55. T. XXII.
Sparviere da Fringuelli minore; Tom. I. p. 51. T. XVII.
Sparviere detto Falcone Sacro; Tom. I. p. 58. T. XXVIII.
Sparviere di Tunis; Tom. I. p. 57. T. XXVII.
Sparviere gentile; Tom. I. p. 59. T. XXIX.
Sparviere non molto diverſo dal Moſchetto o Moſcato; Tom. I. p. 53. T. XX.
Sparviere Pellegrino diverſo; Tom. I. p. 56. T. XXV.
Sparviere Pellegrino femmina; Tom. I. p. 56. T. XXIV.
Sparviere Pellegrino maſchio; Tom. I. p. 55. T. XXIII.
Sparviere Smerlo; Tom. I. p. 51. T. XVIII.
Sparviere Smerlo femmina; Tom. I. p. 52. T. XIX.
Sparviere Terzuolo; Tom. I. p. 56. T. XXVI.
Sparviere brizzolato; Tom. I. p. 68. num. 38.
——— maſchio; ivi num. 39.
——— minore; ivi num. 40.
Starna maggiore o di Piacenza; Tom. III. p. 19. T. CCL.
Starna minore; Tom. III. p. 18. T. CCXLIX.
Starna ſcherzoſa di color biondo; Tom. III. p. 19. T. CCLI.
Starna ſcherzoſa in gran parte bianca; Tom. III. p. 19. T. CCLII.
Stercorario di coda lunga detto Uccello Artico; Tom. V. p. 26. T. DXXXIX.
Stercorario ſcuro; Tom. V. p. 26. num. 2.
——— ſtriato ivi num. 3.
Sterna cenerina; Tom. V. p. 27. T. DXLII.
Sterna cenerina di teſta nera; Tom. V. p. 27. T. DXLIII.
Sterna maggiore; Tom. V. p. 26. T. DXL.
Sterna mezzana di becco piedi e occipite di color nero; Tom. V. p. 28. T. DXLV.
Sterna minore; Tom. V. p. 27. T. DXLI.
Sterna nera; Tom. V. p. 28. T. DXLIV.
Sterna volgarmente detta in Toſcana Petto bianco; Tom. V. p. 28. T. DXLVI.
Sterna brizzolata; Tom. V. p. 28. num. 8.
——— ſcura dell'Iſola di S. Domingo; ivi num. 9.
Sterpagnola; Tom. IV. p. 33. T. CCCXCI. Fig. 2.
Storno comune; Tom. III. p. 58. T. CCCXV.
Storno dell'Iſola di Ceilan; Tom. III. p. 60. T. CCCXVIII. Fig. 2.
Storno giallo Indiano; Tom. III. p. 60. T. CCCXX.
Storno Indiano detto Mino, della ſpecie maggiore; Tom. III. p. 60. T. CCCXIX.
Storno Indiano detto Mino, della ſpecie minore; Tom. III. p. 60. CCCXVIII. Fig. 1.
Storno roſeo o Storno marino; Tom. III. p. 59. T. CCCXVI.
Storno terreo; Tom. III. p. 59. T. CCCXVII.
Storno bianco; Tom. III. p. 60. num. 9.
——— bianco e nero; ivi num. 10.
——— cenerino o bigio; ivi p. 61. num. 12.
——— col capo bianco; ivi num. 11.
——— del Capo di Buona Speranza; ivi num. 13.
——— della Luiſiana; ivi num. 15.
——— della Nuova Spagna; ivi num. 14.
Strige Allocco; Tom. I. p. 90. T. XCIV.
Strige d'America; Tom. I. p. 91. T. XCVIII.
Strige detta Falco civettino; Tom. I. p. 90. T. XCVII.
Strige roſſiccia; Tom. I. p. 90. T. XCVI.
Strige ſtridula; Tom. I. p. 90. T. XCV.
Strige del Canadà; Tom. I. p. 91. num. 6.
——— dell'Aldrovando; ivi num. 9.
——— del Meſſico ivi num. 7.
——— Vulturina; ivi num. 8.
Struzzo o Struzzolo bianco; Tom. II. p. 31. T. CXXXIX.
Struzzo o Struzzolo grigio; Tom. II. p. 30. T. CXXXVIII.
Struzzo o Struzzolo nero; Tom. II. p. 29. T. CXXXVII.

Struzzo o Struzzolo d' America ; Tom. II. p. 32. num. 4.
——— cappelluto, e anche detto Struzzo dell' Iſola di S. Maurizio; ivi num. 5.
Succhia-Capre; Tom. I. p. 91. T. XCIX.
Succhia-Capre di Virgina; Tom. I. p. 92. T. C.
Succhia-Capre o Nottola brizzolata del Braſile; Tom. I. p. 92. num. 6.
——————— del Braſile; ivi num. 5.
——————— della Carolina; ivi num. 3.
——————— della Giammaica; ivi num. 4.
——————— grande brizzolata del Braſile; ivi num. 7.
Sula dell' Iſola di Baſſa, altrimenti Oca Baſſana; Tom. V. p. 17. T. DXV.
Sula bianca; Tom. V. p. 17. num. 5.
—— comune; ivi num. 2.
—— maggiore; ivi num. 3.
—— ſcura; ivi num. 4.

T

Torcicollo, o Collo torto; Tom. II. p. 52. T. CLXXXVI.
Tordo comune; Tom. III. p. 41. T. CCXC.
Tordo bianco; Tom. III. p. 42. T. CCXCII.
Tordo d' America detto Uccello di molte voci; Tom. III. p. 45. T. CCXCVIII.
Tordo maggiore o Tordella; Tom. III. p. 43. T. CCXCIV.
Tordo dell' antecedente ſpecie; Tom. III. p. 44. T. CCXCV.
Tordo minore; Tom. III. p. 43. T. CCXCIII.
Tordo o Merla ſaſſatile; Tom. III. p. 44. T. CCXCVI.
Tordo ſaſſatile univerſalmente macchiato; Tom. III. p. 45. T. CCXCVII.
Tordo ſcherzoſo biondo; Tom. III. p. 42. T. CCXCI.
Tordo col ciuffo; Tom. III. p. 49. num. 19.
——— d' America col collare; ivi p. 50. num. 28.
——————— canoro, o di molte lingue, maggiore; ivi num. 38.
——————— di molte lingue; ivi num. 37.
——— dei Canneti; ivi p. 49. num. 24.
——— delle Palme, o Palmiſta; ivi p. 52. num. 54.
——— di capo celeſte; ivi p. 50. num. 27.
——— maggiore della Carolina; ivi p. 49. num. 21.
——————— o Tordella con macchia a mezza luna; ivi num. 23.
——————— o Tordella di teſta bianca; ivi num. 22.
——— mezzano; ivi num 18.
——— minore della Carolina; ivi num. 20.
——— muſico del Canadà; ivi num. 25.
——— o Merla bruna del Capo di Buona Speranza; ivi p. 50. num. 34.
——————— calva dell' Iſole Filippine; ivi p. 51. num. 42.
——————— del Canadà; ivi p. 50. num. 30.
——————— del Capo di Buona Speranza di teſta nera; ivi p. 52. num. 53.
——————— dell' Iſole Filippine; ivi p. 51. num. 41.
——————— delle Palme o Palmiſta con la teſta nera; ivi p. 52. num. 55.
——————— del Surinam; ivi num. 62.
——————— di montagna; ivi p. 49. num. 26.
——— o Merlo canoro d' Amboina; ivi p. 50. num. 29.
Tordo o Merlo cenerino d' America; ivi p. 51, num. 45.
——————— cenerino dell' Indie; ivi num. 44.
——————— coi ciuffo del Capo di Buona Speranza; ivi p. 50. num. 33.
——————— di color d' Uliva dell' Indie; ivi p. 51. nvm. 50.
——————— di color d' Uliva dell' Iſola di S. Domingo; ivi num. 49.
——————— d' America; ivi p. 52. num. 56.
——————— del Capo di Buona Speranza; ivi p. 51. num. 48.
——————— del Capo di Buona Speranza; ivi n. 51.
——————— del Capo di Buona Speranza col collare; ivi p. 52. num. 52.
——————— dell' Iſola di Borbone; ivi p. 51. n. 47.
——————— del Madagaſcar; ivi num. 46.
——————— del Madagaſcar (altro); ivi num. 39.
——————— del Senegal; ivi p. 50. num. 36.
——————— di Bengala; ivi num. 35.
——————— di S. Domingo; ivi p. 51. num. 43.
——————— dorato del Madagaſcar; ivi p. 50. n. 31.
——————— Indiano; ivi num. 32.
——————— ſcuro di Giammaica; ivi p. 51. n. 40.
——————— verde con teſta nera delle Molucche; ivi p. 52. num. 61.
——————— verde d' Angola; ivi num. 57.
——————— della Carolina; ivi num. 59.
——————— verde dell' Iſole Molucche; ivi num. 60.
——————— verde di coda lunga del Senegal; ivi num. 58.
Tortora comune; Tom. III. p. 40. T. CCLXXXIX.
Tortora Indiana detta Turcheſca; Tom. III. p. 39. T. CCLXXXVII.
Tortora ſalvatica; Tom. III. p. 40. T. CCLXXXVIII.
Tortora bianca; Tom. III. p. 40. num. 4.
——— d' America; ivi p. 41. num. 18.
——— d' America (altra); ivi p. 40. num. 7.
——— del Canadà; ivi p. 41. num. 13.
——— del Capo di Buona Speranza; ivi num. 14.
——— della Carolina; ivi num. 10.
——— del Senegal; ivi num. 15.
——————— col collare, ivi num. 16.
——————— con la gola macchiata; ivi num. 17.
——— macchiata a ſtriſce della China; ivi p. 40. n. 8.
——— macchiata a ſtriſce Indiana; ivi p. 41. num. 9.
——— miſta o baſtarda; ivi p. 40. num. 5.
——— piccola d' America; ivi p. 41. num. 11.
——— piccola d' America di color bruno; ivi num. 12.
——— Portugheſe; ivi p. 40. num. 6.
Tucano del Braſile detto Aracari; Tom. II. p. 61. T. CCIV.
Tucano Mangiapepe; Tom. II. p. 61. T. CCIII.
Tucano blù; Tom. II. p. 63. num. 12.
——— col collare di Caienna; ivi p. 62. num. 10.
——— comune; ivi num. 3.
——— del Meſſico col collare; ivi num. 6.
——— di gola e collo inferiormente bianco del Braſile; ivi num. 4.
——— di gola e collo inferiormente bianco di Caienna; ivi num. 5.
——— di gola gialla di Caienna; ivi num. 9.
——— giallo; ivi p. 63. num. 11.
——— verde del Meſſico; ivi p. 62. num. 7.
——— verde di Caienna; ivi num. 8.
Tuffetto o Tuffatore, altrimenti detto Colletto, femmina; Tom. V. p. 50. T. DXC.
Turchinetto, o Turchino; Tom. III. p. 78. T. CCCLIX. Fig. 2.

U

Uccelletti Americani; Tom. IV. p. 23. T. CCCLXXXI. Fig. 1. e Fig. 2.
Uccelletto del Surinam; Tom. IV. p. 22. T. CCCLXIX. Fig. 1.
Uccelletto foreſtiero chiamato Arruffato; Tom. IV. p. 22. T. CCCLXVIII. Fig. 1.
Uccelletto foreſtiero detto Rugginoſo; Tom. IV. p. 22. T. CCCLXVII. Fig. 2.
Uccelletto Indiano con la colottola nera, o Pretino; Tom. IV. p. 22. T. CCCLXVIII. Fig. 2.
Uccello d'America; Tom. IV. p. 22. T. CCCLXIX. Fig. 2.
Uccello d'America con petto e becco roſſo; Tom. IV. p. 23. T. CCCLXX. Fig. 1.
Uccello foreſtiero di color tanè; Tom. IV. p. 23. T. CCCLXX. Fig. 2.
Uppupa volgarmente Bubbola; Tom. II. p. 63. T. CCV.
Uppupa o Bubbola Americana; Tom. II. p. 64. T. CCVI.
Uppupa o Bubbola detta Pirrocorace; Tom. II. p. 65. num. 5.
———— di Paradiſo; ivi num. 3.
———— Eremita; ivi num. 4.
Uria maggiore; Tom. V. p. 30. T. DXLIX.
Uria minore; Tom. V. p. 30. T. DL.
Uria minore detta Colomba Groenlandica; Tom. V. p. 30. num. 3.
———— ſtriata; ivi num. 4.

V

Vedova d'Affrica; Tom. III. p. 74. T. CCCXLVII.
Vedova d'America; Tom. III. p. 73. T. CCCXLVI.
Vedova del Braſile; Tom. III. p. 73. T. CCCXLV.
Velia blù; Tom. I. p. 75. T. LX. Fig. 1.
Velia cenerina maggiore; Tom. I. p. 72. T. LIII.
Velia cenerina mezzana; Tom. I. p. 73. T. LIV.
Velia del Canadà; Tom. I. p. 75. T. LXII. Fig. 2.
Velia dell'Iſole Manille; Tom. I. p. 75. T. LXII. Fig. 1.
Velia di Bengala; Tom. I. p. 74. T. LVII. Fig. 1.
Velia gialla di Caienna; Tom. I. p. 74. T. LVIII. Fig. 1.
Velia grigia del Senegal; Tom. I. p. 75. T. LXI Fig. 1.
Velia maggiore bianca e nera; Tom. I. p. 75. T. LX. Fig. 2.
Velia maggiore ferruginea; Tom. I. p. 74. T. LVI.
Velia maggiore verde; Tom. I. p. 75. T. LIX. Fig. 2.
Velia minore paſſerina; Tom. I. p. 74. T. LV. Fig. 2.
Velia roſſa; Tom. I. p. 75. T. LIX. Fig. 1.
Velia roſſa col ciuffo di Bengala; Tom. I. p. 74. T. LVII. Fig. 2.
Velia roſſa del Senegal; Tom. I. p. 75. T. LXI. Fig. 2.
Velia roſſa del Surinam; Tom. I. p. 74. T. LVIII. Fig. 2.
Velia roſſa minore; Tom. I. p. 73. T. LV. Fig. 1.
Velia Americana col ciuffo; Tom. I. p. 75. num. 22.
—— brizzolata di Caienna; ivi p. 76. num. 24.
—— Buferola; ivi p. 75. num. 18.
—— cenerina di Caienna; ivi p. 76. num. 23.
—— cenerina Reale; ivi p. 75. num. 19.
—— del Capo di Buona Speranza; ivi p. 76. num. 29.
—— della China; ivi p. 75 num. 20.
—— della China grigia; ivi num. 21.
—— della Luiſiana; ivi p. 76. num. 25.
—— dell'Iſola di Lucon; ivi num. 27.
—— del Meſſico; ivi num. 31.
—— minore del Madagaſcar; ivi num. 26.
—— ſcura di Bengala; ivi num. 28.
—— verde minore del Madagaſcar; ivi num. 30.
Volpoca detta dagli Autori Tadorna, Tom. V. p. 45. T. DLXXVI.

Z

Zivolo dei Prati; Tom. III. p. 74. T. CCCXLIX. Fig. 1.
Zivolo di monte; Tom. III. p. 74. T. CCCL. Fig. 1.
Zivolo foreſtiero; Tom. III. p. 74. T. CCCLI. Fig. 1.
Zivolo giallo; Tom. III. p. 74. T. CCCXLIII. Fig. 1.
Zivolo giallo ſcherzoſo; Tom. III. p. 74. T. CCCXLVIII. Fig. 2.
Zivolo nero; Tom. III. p. 74. T. CCCXLIX. Fig. 2.
Zivolo ſcopaiolo; Tom. III. p. 74. T. CCCL. Fig. 2.

INDEX ALPHABETICUS

GENERUM, SPECIERUM, ET VARIETATUM AVIUM OMNIUM

QUAE HAC ORNITHOLOGIA TABULIS AENEIS COLORATISQUE OSTENDUNTUR, VEL NOMINIBUS TANTUM AUT CONTRACTIS DESCRIPTIONIBUS COMPREHENDUNTUR.

A

Accipiter albus Moscoviticus ex nigro maculatus; Tom. I. pag. 60. T. XXX.
Accipiter Falco Sacer dictus; ibid. pag. 58. T. XXVIII.
Accipiter Fringillarius vulgaris; ibid. pag. 49. T. XVI.
Accipiter Gentilis; Tom. I. pag. 59. T. XXIX.
Accipiter Merillus; Tom. I. pag. 51. T. XVIII.
Accipiter Merillus foemina; Tom. I. pag. 52. T. XIX.
Accipiter muschetus; Tom. I. p. 53. T. XX.
Accipiter palumbarius; Tom. I. p. 54. T. XXI.
Accipiter Palumbarius novis pennis obductus; Tom. I. pag. 55. T. XXII.
Accipiter peregrinus foemina; Tom. I. p. 56. T. XXIV.
Accipiter peregrinus mas; Tom. I. p. 55. T. XXIII.
Accipiter peregrinus alter; Tom. I. p. 56. T. XXV.
Accipiter Tertiarius, Lanarius forte; Tom. I. p. 56. T. XXVI.
Accipiter Fringillarius minor; Tom. I. p. 51. T. XVII.
Accipiter Tunetanus; Tom. I. 58. T. XXVI.
Accipiter maculatus; Tom. I. p. 68. num. 38.
——— minor; ibid. num. 40.
Alauda alis aquaticis; Tom. IV. p. 24. T. CCCLXXIII. Fig. 2.
Alauda campestris; ibid. p. 23. T. CCCLXXII. Fig. 1.
Alauda cristata maior; Tom. IV. p. 24. T. CCCLXXIV; Fig. 1.
Alauda panterana; Tom. IV. p. 24. T. CCCLXXV. Fig. 1.
Alauda pratensis alba; Tom. IV. p. 24. T. CCCLXXIII. Fig. 1.
Alauda pratensis in Etruria *Mattolina*; Tom. IV. p. 23 CCCLXXII Fig. 2.
Alauda pratensis minor vulgo in Etruria *Calandrella*; Tom. IV. p. 25. T. CCCLXXV. Fig. 2.
Alaude monstrosae caput; Tom. IV. p. 24. T. CCCLXXIV. Fig. 2.
Alauda alba sine crista; Tom. IV. p. 25. num. 11.
——— arborea; ibid. num. 8.
——— Capitis Bonae Spei; ibid. num. 16.
——— cristata minor; ibid. num. 9.
——————— Senegalensis; ibid. num. 10.
——— hyemalis; ibid. num. 17.
——— Italica; ibid. num. 13.
——— maior a nonnullis Calandra; ibid. num. 18.
——— minima sive Sepiaria; ibid. num. 14.
Alauda nigra; ibid. num. 12.
——— Virginiana; ibid. num. 15.
Albatrus; Tom. V. p. 31. T. DLII.
Alca maior; Tom. V. p. 10. T. XDVII.
Alca minor; Tom. V. p. 11. num. 3.
—— Patagonica; ibid. num. 5.
—— *Phethon Demersus* Linnaei; ibid. num. 4.
—— vulgaris; ibid. p. 10. num. 2.
Aluco; Tom. I. p. 88. T. XCI.
Aluco albus; Tom. I. p. 89. T. XCII.
Aluco albus diurnus; Tom. I. p. 89. T. XCIII.
Anas aestiva; Tom. V. p. 46. T. DLXXIX.
Anas Boscas maior; Tom. V. p. 44. T. DLXXI.
Anas Clangula foemina; Tom. V. p. 50. T. DXCIV.
Anas Clangula mas; Tom. V. p. 50. T. DXCIII.
Anas domestica alba; Tom. V. p. 41. T. DLXIV.
Anas domestica fusca; ibid. p. 42. T. DLXVII.
Anas domestica rostro incurvo; ibid. p. 41. T. DLXV.
Anas domestica rostro incurvo alia; Tom. V. p. 41. T. DLXVI.
Anas domestica versicolor; Tom. V. p. 40. T. DLXIII.
Anas fera; Tom. V. p. 43. T. DLXX.
Anas fera strepera foemina; Tom. V. p. 45. T. DLXXV.
Anas fera strepera mas; Tom. V. p. 45. T. DLXXIV.
Anas fistularis Americana; Tom. V. p. 49. T. DLXXXVIII.
Anas fistularis cristata; Tom. V. p. 49. T. DLXXXVII.
Anas fistularis foemina; Tom. V. p. 48. T. DLXXXVI.
Anas fistularis mas; Tom. V. p. 48. T. DLXXXV.
Anas Glaucia maior foemina; Tom. V. p. 50. T. DXC.
Anas Glaucia maior mas; Tom. V. p. 49. T. DLXXXIX.
Anas Glaucia minor cristata; Tom. V. p. 50. T. DXCI.
Anas Glaucia minor foemina; Tom. V. p. 50. T. DXCII.
Anas hyberna foemina; Tom. V. p. 46. T. DLXXVIII.
Anas hyberna mas; Tom. V. p. 46. T. DLXXVII.
Anas Indica; Tom. V. p. 42. T. DLXVIII.
Anas Indica alba, antecedentis varietas; Tom. V. p. 43. T. DLXIX.
Anas latirostra foemina; Tom. V. p. 45. T. DLXXIII.
Anas latirostra mas; Tom. V. p. 44. T. DLXXII.
Anas longicauda; Tom. V. p. 47. T. DLXXXI.
Anas Palumbum torquatum quodammodo referens; Tom. V. p. 47. T. DLXXXII.
Anas Penelope foemina; Tom. V. p. 48. T. DLXXXIV.
Anas Penelope mas; Tom. V. p. 47. T. DLXXXIII.
Anas Querquedula maior; Tom. V. p. 51. T. DXCVI.
Anas Querquedula maior alia; ibid. p. 51. T. DXCVII.
Anas Querquedula maior mas; ibid. p. 51. T. DXCV.
Anas Querquedula minor; Tom. V. p. 51. T. DXCVIII.

Anas Querquedula Sinenſis criſtata; Tom. V. p. 52. T. DXCIX.
Anas torquata ex Inſula Terrae novae; Tom. V. p. 46. T. DLXXX.
Anas Bahamenſis; Tom. V. p. 46. num. 2.
—— Braſilienſis; ibid. num. 3.
—— fera, ſive Boſcas Mexicana; ibid. p. 44. num. 3.
—— fiſtularis Jamaicenſis; ibid. p. 49. num. 5.
—— Freti Hudſonis; ibid. p. 46. num. 4.
—— latiroſtra Mexicana; ibid. p. 45. num. 4.
—— latiroſtra ventre albo ibid. num. 3.
—— longicauda ex Inſula Terrae novae; ibid. p. 47. num. 3.
—— longicauda Freti Hudſonis; ibid. num. 4.
—— Penelope Mexicana; ibid. p. 48. num. 4.
—— Penelope nigra; ibid. num. 3.
—— Querquedula aeſtiva; ibid. p. 52. num. 8.
———— Carolinenſis ibid. p. 12.
———— Dominicenſis; ibid. num. 15.
———— Ferroenſis; ibid. num. 13.
———— Freti Hudſonis; ibid. num. 14.
———— Ludoviciana; ibid. num. 11.
———— Mexicana; ibid. num. 10.
———— Virginiana; ibid. num. 9.
Anſer communis; Tom. V. p. 36. T. DLVIII.
Anſer ſeptentrionalis plumis molliſſimis; Tom. V. p 39. T. DLXII.
Anſer ſilveſtris; Tom. V. p. 38. T. DLXI.
Anſer verſicolor, quem etiam Paglietanum Anſerem nonnulli vocant; Tom. V. p. 38. T. DLIX.
Anſer verſicolor alius, quem vulgo in Italia *Lombardella* dicunt; Tom. V. p. 38. T. DLX.
Anſer aliis Aegyptiacus, nonnullis Hiſpanicus; Tom. V. p. 40. num. 12.
——· arboreus, a nonnullis etiam Bernicla dictus; ibid. num. 14.
———— ſeu Bernicla minor; ibid. num. 15.
—— ferus Canadenſis ibid. p. 39. num. 7.
—— Gambenſis; ibid. p. 40. num. 11.
—— Guineenſis; ibid. p. 39. 10.
—— Moſcoviticus; ibid. num. 9.
—— niveus; ibid. p. 40. num. 13.
—— Ornithologis *Brenta*; ibid. num. 16.
—— Septentrionalis ſilveſtris, ibid. p. 39. num. 6.
—— ſilveſtris Freti Hudſonis; ibid. num. 8.
Apiaſter Angolenſis; Tom. V. p. 8. num. 11.
——— Bengalenſis torquatus; ibid. num. 9.
——— Braſilienſis; ibid. num. 4.
——— ex Franciae Inſula; ibid. num. 6.
——— flavicans; ibid. num. 3.
——— icterocephalos; ibid. num. 2.
——— Indicus; ibid. num. 13.
——— Madagaſcarienſis; ibid. num. 7.
———— torquatus; ibid. num. 8.
——— Mexicanus; ibid. num 5.
——— Philippenſis maior; ibid. num. 12.
———— minor; ibid. num. 10.
Aquila capite rectricibuſque albis; Tom. I. p. 40. T. VIII.
Aquila cauda alba Americana; Tom. I. p. 40. T. VII.
Aquilae Pullus; Tom. I. p. 38. T. VI.
Aquila Etruſca; Tom. I. p. 39. T. V.
Aquila nigra; Tom. I. p. 37. T. III.
Aquila rapax; Tom. I. p. 39. T. IV.
Aquila regalis fulva; Tom. I p. 36. T. II.
Aquila Regia communis; Tom. p. 35. T. I.
Aquila Africana criſtata; Tom. I. p. 41. 18.
Aquila alba Cygnea; ibid. num. 12.
——— albicella, ſive Pygargus; ibid. num. 9.
——— albicella, ſive Pygargus minor; ibid. num. 10.
——— Braſilienſis criſtata; ibid. num. 17.
——— Braſilienſis Urubitinga; ibid. num. 16.
——— fulva ſive aurea; ibid. num. 11.
——— naevia; ibid. num. 13.
——— oſſifraga; ibid. num. 14.
——— Ponticeriana; ibid. num. 19.
——— Pygargus ſecundus *ab Aldrovando* dicta; ibid. num. 15.
Ara, vel Arara, *Vide* Pſittacum.
Ardea alba maior; Tom. IV. p. 48. T. CCCCXXV.
Ardea alba maior; Tom. IV. p. 47. T. CCCCXXIII.
Ardea alba minor, dicta Ardea Caprina; Tom. IV. p. 48. T. CCCCXXIV.
Ardea cinerea; Tom. IV. p. 46. T. CCCCXXI.
Ardea cinerea maior; Tom. IV. p. 48. T. CCCCXXVIII.
Ardea foemina; Tom. IV. p. 46. T. CCCCXX.
Ardea maior candida Caprea; Tom. IV. p. 48. T. CCCCXXVI.
Ardea maior cinerea criſtata; Tom. IV. p. 48. T. CCCCXXVII.
Ardea marina, ſive nigra; Tom. IV. p. 49. T. CCCCXXIX.
Ardea mas, vulgo in Etruria *Ciuffetto*; Tom. IV. p. 46. T. CCCCXIX.
Ardea Nicticorax; Tom. IV. p. 46. T. CCCCXXII.
Ardea Ranivora foemina; Tom. IV. p. 49. T. CCCCXXXI.
Ardea Ranivora mas; Tom. IV. p. 49. T. CCCCXXX.
Ardea Stellaris, vel Botaurus; Tom. IV. p. 49. T. CCCCXXXI.
Ardea ſuperne nigricans, vulgo in Etruria *Guacco*; Tom. IV. p. 46. T. CCCCXVIII.
Ardea Botaurus Americanus naevius; Tom. IV. p. 50. num. 38.
———— Braſilienſis, ibid. num. 36.
———— criſtata maior; ibid. num. 34.
———— Freti Hudſonis; ibid. num. 31.
———— minor; ibid. num. 32.
———— naevius; ibid. num. 37.
———— rufus; ibid. num. 35.
———— ſtriatus; ibid. num. 33.
——— Braſilienſis candida; ibid. num. 26.
——— Carolinenſis candida; ibid. num. 27.
——— Cayanenſis criſtata; ibid. p. 49. num. 15.
——— cinerea; ibid. num. 16.
———— Americana; ibid. num. 18.
———— Mexicana; ibid. num. 17.
——— Cancrofagus; ibid. p. 50. num. 39.
———— *Americanus*; ibid. num. 44.
———— *Bahamenſis* ibid. num. 46.
———— *Braſilienſis*; ibid. num. 45.
———— caſtaneus; ibid. num. 40.
———— Philippenſis; ibid. num. 43.
———— rufus; ibid. num. 41.
———— rufus naevius; ibid. num. 42.
———— viridis; ibid. p. 51. num. 48.
———— viridis naevius; ibid. num. 49.
——— criſtata, Cancrofagus ceruleus; ibid. p. 50. num. 47.
——— Freti Hudſonis criſtata; ibid. p. 49. num. 19.
——— griſea; ibid. num. 21.
——— Mexicana candida; ibid. p. 50. num. 28.
——— Mexicana criſtata; ibid. num. 23.
——— Mexicana purpuraſcens; ibid. num. 25.
——— naevia; ibid. p. 49. num. 20.

Ardea nigra; ibid. p. 50. num. 29.
——— nigra torquata; ibid. num. 30.
——— purpuraſcens; ibid. num. 24.
——— Virginiana criſtata; ibid. num. 22.
Ardeola; ibid. p. 51. num. 50.
——— naevia; ibid. num. 51.
Aſio; Tom. I. p. 86. T. LXXXV.
Aſio Americanus; Tom. I. p. 86. num. 5.
—— Braſilienſis; ibid. p. 87. num. 6.
—— Carolinenſis; ibid. p. 86. num. 4.
—— Italicus; ibid. num. 2.
—— Mexicanus; ibid. p. 87. num. 7.
Atricapilla, naturae luſus; Tom. IV. p. 37. T. CCCXCIX. Fig. 1.
Attagen, Francolinus Italorum, foemina; Tom. III. p. 14. T. CCXLII.
Attagen, Francolinus Italorum, mas; Tom. III. p. 13. T. CCXLI.
Aviculae Americanae; Tom. IV. p. 23. T. CCCLXXI. Fig. 1. & 2.
Avicula caerulea Indica; Tom. III. p. 78. T. CCCLX. Fig. 2.
Avicula exotica obſcure caerulea; Tom. III. p. 78. T. CCCLIX. Fig. 2.
Avicula peregrina colore aeruginoſo; Tom. IV. p. 22. T. CCCLXVII. Fig. 2.
Avicula peregrina vulgo in Etruria *Arruffato*; Tom. IV. p. 22. T. CCCLXVIII. Fig. 1.
Avis Americana, ibid. p. 22. T. CCCLXIX. Fig. 2.
Avis Americana pectore & roſtro rubro; Tom. IV. p. 23. T. CCCXX. Fig. 1.
Avis e Corarao; Tom. IV. p. 39. T. CCCCI. Fig. 1.
Avis Indica occipite nigro, Avis Presbyteriana dicta; Tom. IV. p. 22. T. CCCLXVIII. Fig. 2.
Avis peregrina colore caſtaneo; Tom. IV. p. 23. T. CCCLXX. Fig. 2.
Avis pugnax; Tom. V. p. 4. T. CCCCLXXXVIII.
Avis pugnax Indica; Tom. V. p. 5. T. CCCCLXXXIX.
Avium pugnacium varietates; Tom. V. p. 5.
Avis Surinamenſis; ibid. p. 22. T. CCCLXIX. Fig. 1.
Avoſetta, ſeu Recurviroſtra; Tom. V. p. 8. T. CCCCLXXXXV.

B

Barburus vel Bucco; Tom. II. p. 51. T. CLXXXII.
Barburus Cayanenſis; ibid. p. 51. T. CLXXXIII. Fig. 1.
Barburus Cayanenſis naevius; Tom. II. p. 51. T. CLXXXIII. Fig. 2.
Barburus Maynanenſis; Tom. II. p. 51. num. 5.
——— Philippenſis; ibid. num. 4.
Bengalini minores; Tom. IV. p. 22. T. CCCLXVI. Fig. 1. & Fig. 2.
Bengalini varietas alia; Tom. IV. p. 22. T. CCCLXVII. Fig. 1.
Bengalus ſive Bengalinus; Tom. IV. p. 22. T. CCCLXV. Fig. 1.
Bengalus vel Bengalinus foemina; ibid. Fig. 2.
Bengalus fuſcus; Tom. IV. p. 22. num. 5.
——— ſive Paſſer Bengalus; ibid. num. 4.
Bubo maximus; Tom. I. p. 84. T. LXXXI.
Bubo minor; Tom. I. p. 85. T. LXXXII.
Bubo pennis mutatis, alter; Tom. I. p. 85. T. LXXXIII.
Bubo Virginianus variegatus; Tom. I. p. 86. T. LXXXIV.

C

Calidris ferrugineus; Tom. IV. p. 66. T. CCCCLXIX.
Calidris, *Gambetta* in Etruria dictus; Tom. IV. p. 66. T. CDLXV.
Calidris perdicum more coloribus maculata; Tom. IV. pag. 66. T. CDLXVII.
Calidris ſpecies; Tom. IV. pag. 63. T. CDLXVIII.
Calidris viperino colore ludens; Tom IV. pag. 66. T. CDLXVIII.
Calidris vulgo Gambetta, coloribus ludens; Tom. IV. pag. 66. T. CDLXVI.
Caprimulgus; Tom. I. pag. 91. T. XCIX.
Caprimulgus Virginianus; Tom. I. pag. 92. T. C.
Caprimulgus Braſilienſis; Tom. I. pag. 92. num. 5.
——— maior naevius; ibid. num. 7.
——— naevius; ibid. num. 6.
——— Carolinenſis; ibid. num. 3.
——— Iamaicenſis; ibid. num. 4.
Cardinalis niger, Avis Americana; Tom. III. p. 69. T. CCCXXXIV.
Cardinalis niger ecaudatus, e Parà Braſiliae regione; Tom. III. p. 69. T. CCCXXXV. Fig. 1.
Cardinalis non criſtatus e Parà Braſiliae regione; Tom. III. p. 69. T. CCCXXXV. Fig. 2.
Carduelis; Tom. III. p. 76. T. CCCLIII. Fig. 1.
Carduelis Americanus; ibid. p. 76. T. CCCLV. Fig. 1.
Carduelis candicans; ibid. p. 76. T. CCCLIV. Fig. 1.
Carduelis candidus; ibid. p. 76. T. CCCLIV. Fig. 2.
Carduelis ſpurius; Tom. III. p. 76. T. CCCLV. Fig. 2.
Carduelis capite nigro; Tom. III. p. 77. num. 8.
——— capite variegato; ibid. p. 76. num. 7.
——— fronte alba; ibid. num. 6.
——— nigra; ibid. p. 77. num. 9.
——— nigra fronte luteo; ibid. num. 10.
——— Svecica; ibid. num. 11;
Certhia Americana; Tom. II. p. 57. T. CXCVIII. Fig. 2.
Certhia Arundinum; Tom. IV. p. 21. T. CCCLXIV. Fig. 2.
Certhia Braſilienſis nigricans; Tom. II. p. 59. T. CCII. Fig. 1.
Certhia griſea, ſeu Picus cinereus minimus; Tom. II. p. 55. T. CXCV. Fig. 1.
Certhia longicauda Capitis Bonae Spei; Tom. II. p. 58. T. CCI. Fig. 1.
Certhia longicauda Senegalenſis; Tom. II. p. 59. T. CCI. Fig. 2.
Certhia minor fuſca Indica; ibid. p. 56. T. CXCV. Fig. 2.
Certhia minor Indica; ibid. p. 57. T. CXCVIII. Fig. 1.
Certhia muralis; Tom. II. p. 56. T. CXCVII.
Certhia, purpuracea dicta, Philippenſis; Tom. II. p. 58. T. CC. Fig. 1. Fig. 2.
Certhia Senegalenſis violacea; Tom. II. p. 58. T. CXCIX. Fig. 2.
Certhia ſuperne griſea inferne lutea Philippenſis; Tom. II. p. 58. CXCIX. Fig. 1.
Certhia Surinamenſis caerulea, Tom. II. p. 56. T. CXCVI. Fig. 2.
Certhia Virginiana purpurea; Tom. II. p. 59. T. CCII. Fig. 2.
Certhia Americana varia; Tom. II. p. 60. num. 35.
——— viridis atricapilla; ibid. num. 26.
——— Bahamenſis; ibid. p. 59. num. 20.
——— Braſilienſis caerulea; ibid. p. 60. num. 23.

Certhia Brasilienſis violacea; ibid. num. 34.
——— viridis; ibid. num. 24.
——— viridis atricapilla; ibid num. 25.
——— Capitis Bonae Spei; ibid. p. 59. num. 19.
——— Cajanenſis viridis; ibid. p. 60. num. 27.
——— longicauda minor Capitis Bonae Spei; ibid. num. 31.
——— Madagaſcarienſis olivacea; ibid. p. 59. num. 22.
——— violacea; ibid. p. 60. num. 28.
——— viridis; ibid. num. 29.
——— Martinicana, ſive Saccharivora; ibid. p. 61. num. 36.
——— Mexicana rubra; ibid. p. 60. num. 32.
——— Mexicana rubra atricapilla; ibid. num. 33.
——— Philippenſis; ibid. p. 59. num. 16,
——— griſea; ibid. num. 17.
——— minor; ibid, num. 18.
——— olivacea; ibid. num. 21.
——— torquata Capitis Bonae Spei; ibid. p. 60. n. 30.
Ciconia alba; Tom. IV. p. 51. T. CDXXXIV.
Ciconia Canadenſis; Tom. IV. p. 53. T. CDXXXVI.
Ciconia nigra; Tom. IV. p. 51. T. CDXXXIII.
Ciconia Numidica; Tom. IV. p. 53. T. CDXXXV.
Ciconia alba Americana; Tom. IV. p. 53. num. 5.
——— alba Braſilienſis; ibid. num. 6.
——— Guianenſis; ibid. num. 7.
Citrinella; Tom. IV. p. 15. T. CCCLXI. Fig. 1.
Cloris vulgaris; Tom. III. p. 68. T. CCCXXXI. Fig. 1.
Cloris altera, naturae luſus; Tom. III. p. 68. T. CCCXXXI. Fig. 2.
Cloris Braſilienſis; Tom. III. p. 69. T. CCCXXXII.
Cloris Indica; ibid. p. 69. T. CCCXXXIII. Fig. 1.
Cloris Peruana; Tom. IV. p. 69. T. CCCXXXIII. Fig. 2.
Columba Barbarica; Tom. III. p. 32. T. CCLXXVI.
Columba cincinnata pedibus hirſutis; Tom. III. p. 34. T. CCLXXXII.
Columba cueullata minor; Tom. III. p. 30. T. CCLXXIII.
Columba cocullo crinito ad pectus deſcendente; Tom. III. p. 36. T. CCLXXXVI.
Columba Cypria cucullata maior; Tom. III. p. 34. T. CCLXXXI.
Columba Cypria cucullata minor; Tom. III. p. 34. T. CCLXXX.
Columba domeſtica maior; Tom. III. p. 32. T. CCLXXVIII.
Columba domeſtica maior, altera; Tom. III. p. 35. T. CCLXXXIII.
Columba domeſtica maior Sicula; Tom. III. p. 33. T. CCLXXIX.
Columba domeſtica Romana minor; Tom. III. p. 28. T. CCLXIX.
Columba domeſtica roſtro recurvato; Tom. III. p. 32. T. CCLXXVII.
Columba Livia, vel Palumbus ſylveſtris minor; Tom. III. p. 30. T. CCLXXI.
Columba minor diverſicolor dupliciter criſtata; Tom. III. p. 35. T. CCLXXXV.
Columba Mutinenſis minor; Tom. III. p. 28. T. CCLXVII.
Columba peregrina maior dupliciter cucullata; Tom. III. p. 35. T. CCLXXXIV.
Columba tremula laticauda; Tom. III. p. 28. T. CCLXVIII.
Columba *Turbita* dicta; Tom. III. p. 31. T. CCLXXIV.
Columba Turcica, Perſica etiam dicta; Tom. III. p. 31. T. CCLXXV.
Columba vulgaris; Tom. III. p. 29. T. CCLXX.

Columba Americana ſylveſtris; Tom. III. p. 37. n. 34.
——— caerulea Mexicana; ibid. p. 38. num. 44.
——— criſtata pedibus plumoſis; ibid. p. 37. n. 28.
——— domeſtica maior vulgaris; ibid. p. 36. num. 21.
——— galeata; ibid. num. 22.
——— giratrix ſive geſtuoſa; ibid. p. 37. num. 30.
——— Guineenſis; ibid. p, 38. num. 39.
——— gutturoſa; ibid. p. 37. num. 31.
——— Iamaicenſis; ibid. p. 38. num. 40.
——— capite nigro; ibid. num. 41.
——— cauda faſcia fuſca notata, velut annulo cincta; ibid. num. 43.
——— Saxatilis; ibid. num. 42.
——— Indica; ibid. p. 37. num. 36.
——— Martinicana; ibid. num. 35.
——— Sylveſtris; ibid. num. 33.
——— montana Mexicana; ibid. p. 38. num. 45.
——— Nicombarienſis; ibid. p. 39. num. 49.
——— pecuſſor; ibid. p. 37. num. 29.
——— rufa Cayancnſis; ibid. p. 38. num. 38.
——— Saxatilis; ibid. p. 36. num. 24.
——— Saxatilis alba; ibid. num. 25.
——— Sylveſtris; ibid. num. 26.
——— Tabellaria; ibid. p. 37. num. 27.
——— tremula anguſticauda; ibid. p. 36. num. 23.
——— viridis Amboinenſis; ibid. p. 38. num. 47.
——— viridis Inſulae S. Thomae; ibid. p. 39. n. 48.
——— viridis Philippenſis; ibid. p. 38. num. 46.
Coccothrauſtes; Tom. III. p. 64. T. CCCXXV.
Coccothrauſtes caerulea Angolenſis; Tom. III. p. 66. T. CCCXXX.
Coccothrauſtes Iavenſis naevia; Tom. III. p. 66. T. CCCXXVIII. Fig. 2.
Coccothrauſtes Sinenſis cinerea; Tom. III. p. 65. T. CCCXXVIII. Fig. 1.
Coccothrauſtes Sinenſis foemina; Tom. III. p. 65. T. CCCXXVII. Fig. 2.
Coccothrauſtes Sinenſis mas; Tom. III. p. 65. T. CCCXXVII. Fig. 1.
Coccothrauſtes Stulta; Tom. III. p. 65. T. CCCXXVI.
Coccothrauſtes Virginiana; ibid. p. 66. T. CCCXXIX.
Coccothrauſtes Americana caerulea; Tom. III. p. 68. num. 20.
——— Borbonica indigenis; ibid. p. 67. num. 15.
——— Braſilienſis; ibid. num. 16.
——— Canadenſis; ibid. num. 18.
——— Capitis Bonae Spei; ibid. num. 9.
——— Capitis Bonae Spei lutea; ibid. num. 10.
——— Cayanenſis; ibid. num. 11.
——— Gambeenſis; ibid. num. 12.
——— Indica; ibid. num. 19.
——— Ludoviciana; ibid. num. 17.
——— Moluccenſis; ibid. num. 14.
——— Philippenſis; ibid. num. 13.
Colymbus an cinereus maior; Tom. V. p. 18. T. DXVIII.
Colymbus auritus & cornutus minor; Tom. V. p. 19. T. DXXII.
Colymbus criſtatus maior foemina; Tom. V. p. 19. T. DXXII.
Colymbus ſuperioris ſpeciei; Tom. V. p. 19. T. DXXIII.
Colymbus maior criſtatus; Tom. V. p. 19. T. DXXI.
Colymbus minor; Tom. V. p. 18. T. DXVII.
Colymbus minor ex nigro & rubro infectus; Tom. V. p. 18. T. DXIX.
Colymbus Fluviatilis; Tom. V. p. 20. num. 8.
——— Carolinenſis; ibid. num. 10.
——— Dominicenſis; ibid. num. 11.

Co-

Colymbus Insulae S. Thomae; ibid. num. 9.
Coracias; Tom. II. p. 37. T. CXLIX.
Coracias caerulea; Tom. II. p. 39. T. CLIII.
Coracias montana vel Corvus sylvaticus; Tom. II. p. 38. T. CLII
Coracias Philippensis; Tom. II. p. 40. T. CLIV.
Coracias rostro pedibusque carneo colore infectis; Tom. II. p. 38. T. CL.
Coracias rostro pedibusque nigris; ibid. p. 38. T. CLI.
Coracias cristata sive Corvus alpinus cristatus; Tom II. p. 40. num. 7.
Cornix; Tom. II. p. 34. T. CXLIV.
Cornix frugilega; Tom. II. p. 35. T. CXLV.
Cornix monedula; Tom. II. p. 35. T. CXLVI.
Cornix monedula Capiris Bonae Spei; Tom. II. p. 36. T. CXLVIII.
Cornix monedula ex albo & nigro varia; Tom. II. p. 36. T. CXLVII.
Cornix candida; Tom. II. p. 36. num. 6.
——— cinerea frugilega; ibid. num. 7.
——— in toto corpore nigra Iamaicensis; ibid. p. 37. num. 8.
——— monedula alpina; ibid. num. 12.
——— candida; ibid. num. 10.
——— nigra; ibid. num. 11.
——— torquata; ibid. num. 9.
Corvus calvus, seu Loripes; Tom. II. p. 33. T. CXLIII.
Corvus candidus; Tom. II. p. 32. T. CXLI.
Corvus Germanicus, vulgo Krè; ibid. p. 33. T. CXLII
Corvus maior; Tom. II. p. 32. T. CXL.
Cotinga, sive Turdus Brasiliensis caeruleus; Tom. III p. 56. T. CCCXII.
Cotinga, sive Turdus Brasiliensis, macula rubra cruciformi in pectore notatus; ibid. p. 56. T. CCCXIII.
Cotinga, sive Turdus Indicus; ibid. p. 57. T. CCCXIV.
Cotinga Cayanensis; Tom. III. p. 57. num. 11.
——— cinerea; ibid. num. 7.
——— cinereo-purpurea; ibid. num. 6.
——— in toto corpore alba; ibid. num. 9.
——— Mayanensis; ibid. num. 10.
——— Mexicana; ibid. p. 58. num. 12.
——— nevia; ibid. p. 57. num. 8.
——— purpurea; ibid. num. 5.
——— rubra; ibid. num. 4.
Coturnix femina? Tom. III. p. 15. T. CCXLIV.
Coturnix mas; Tom. III. p. 14. T. CCXLIII.
Coturnix Africana; Tom. III. p. 16. T. CCXLVII.
Coturnix Mexicana cristata; Tom. III. p. 16. T. CCXLVI.
Coturnix Regni Neapolitani; Tom. III. p. 15. T. CCXLV.
Coturnix Rex Coturnicum. ibid. p. 17. T. CCXLVIII.
Coturnix Iavensis; Tom. III. p. 18. num. 7.
——— Ludoviciana; ibid. num. 13.
——— Madagascariensis; ibid. num. 9.
——— maior; ibid. num. 8.
——— Mexicana; ibid. num. 11.
——— Mexicana maior; ibid. num. 12.
——— Philippensis; ibid. num. 10.
Crotophagus; Tom. II. p. 53. T. CXC.
Crotophagus maior; Tom. II. p. 54. T. CXCI.
Crotophagus varius Indicus; Tom. II. p. 54. T. CXCII.
Cuculus; Tom. I. p 80. T. LXVII.
Cuculus Coromandelanensis cristatus; Tom. I. p. 82. T. LXXIV.
Cuculus ex Africa, sive Cuculus Rex; Tom. I. p. 82. T. LXXIII.
Cuculus ex nigro & albo mixtus; Tom. I. p. 81. T. LXXI.
Cuculus ex rufo & albo varius; ibid. p. 80. T. LXVIII.
Cuculus Iamaicensis; Tom. I. p. 83. T. LXXIX.
Cuculus Madagascariensis caeruleus; Tom. I. p. 83. T. LXXVIII.
Cuculus Madagascariensis cristatus; Tom. I. p. 82. T. LXXVII.
Cuculus Mindanensis naevius; ibid. p. 82. T. LXXVI.
Cuculus niger Indicus; Tom. I. p. 82. T. LXXII.
Cuculus rufescens; Tom. I. p. 81. T. LXX.
Cuculus Sinensis caeruleus; Tom. I. p. 83. T. LXXX.
Cuculus variegatus; Tom. I. p. 81. T. LXIX.
Cuculus viridis Siamensis; Tom. I. p. 82. T. LXXV.
Cuculus Bengalensis naevius; Tom. I. p. 83. num. 20.
——— Brasiliensis cornutus; ibid. p. 84. num. 32.
——— Brasiliensis cristatus ruber; ibid. num. 31.
——— Carolinensis; ibid. p. 83. num. 16.
——— Carolinianus; ibid. num. 15.
——— Cyanensis; ibid. p. 84. num. 23.
——— Cayanensis naevius; ibid. num. 24.
——— Dominicensis; ibid. p. 83. num. 19.
——— flavescens Brasilliensis cristatus; ibid. p. 84. num. 30.
——— Iamaicensis maior; ibid. p. 83. num. 17.
——— Indicus naevius; ibid. num. 21.
——— Indicus niger; ibid. p. 84. num. 29.
——— Madagascariensis; ibid. num. 27.
——— Madagascariensis maior; ibid. num. 28.
——— Malabaricus naevius; ibid. num. 22.
——— Mexicanus; ibid. num. 26.
——— Rufescens; ibid. p. 83. num. 19.
——— Senegalensis; ibid. p. 84. num. 25.
Curruca sepiaria; Tom. IV. p. 33. T. CCCXCI. Fig. 2.
Cygnus ferus; Tom. V. p. 34. T. DLIV.
Cygnus maximus; Tom. V. p. 33. T. DLIII.
Cygnus Sinensis albus; Tom. V. p. 35. T. DLV.
Cygnus Sinensis ex flavo luteus; Tom. V. p. 36 T. DLVI.
Cygnus Sinensis versicolor; ibid. p. 36. T. DLVII.
Cynchramus; Tom. III. p. 76. T. CCCLII. Fig. 2.
Cynchramus maior; Tom. III. p. 76. T. CCCLIII. Fig. 2.

D

Diomedea vel Sphenisicus naevius; Tom. V. p. 11. T. CDXCVIII.

E

Emberiza flava; Tom. III. p. 74. T. CCCXLVIII. Fig. 1.
Emberiza altera naturae lusus; Tom. III. p. 74. T. CCCXLVIII. Fig. 2.
Emberiza montana; Tom. III. p. 74. T. CCCL. Fig. 1.
Emberiza nigra; Tom. III. p. 74. T. CCCXLIX. Fig. 2.
Emberiza peregrina; Tom. III. p. 74. T. CCCLI. Fig. 1.
Emberiza Pratensis; Tom. III. p. 74. T. CCCXLIX. Fig. 1.
Emberiza Sepiaria; Tom. III p. 74. T. CCCL. Fig. 2.
Emberiza Brasilienſis; Tom. III. p. 75. num. 14.
——— Canadensis; ibid. num. 12.
——— Canadensis caerulea; ibid. num. 13.
——— Carolinensis; ibid. num. 10.

Emberiza Dominicenſis; ibid. num. 15.
——— Surinamenſis; ibid. p. 76. num. 16.
Emeu, ſive Eme, vel Caſuarius ibid. p. 28. T. CXXXIV.

F

Falcinellus arboreus noſtras; Tom. II. p. 56. T. CXCVI. Fig. 1.
Falco Albanella; Tom. I. p. 61. T. XXXV.
Falco Albanella ruſeſcens; Tom. I. p. 62. T. XXXVI.
Falco Albanella torquata; Tom. I. p. 62. T. XXXVII.
Falco Aquilinus aetate caneſcens; Tom. I. p. 65. T. XLIII.
Falco Aquilinus fuſcus; Tom. I. p. 65. T. XLI.
Falco Aquilinus rufeſcens; Tom. I. p. 65. T. XLII.
Falco Barletta; Tom. I. p. 66. T. XLV.
Falco Barletta cinerea; Tom. I. p. 66. T. XLVI.
Falco Barletta diverſicolor; Tom. I. p. 66. T. XLVII.
Falco Barletta ſuperius pennis Ciceris colore tinctis; Tom. I. p. 66. XLVIII.
Falco Boeticus capite albo; Tom. I. p. 61. T. XXXIII.
Falco Boeticus roſtro magno Aquilarum aemulo; Tom. I. p. 61. T. XXXII.
Falco Milano dictus; Tom. I. p. 62. T. XXXVIII.
Falco Milvus maior; Tom. I. p. 63. T. XXXIX.
Falco parvus Indicus; Tom. I. p. 66. T XLIV. Fig. .
Falco pennis mutatis; Tom. I. 61. T. XXXIV.
Falco Pigargus Canadenſis; ibid. p. 66. T. XLIV. Fig. 2.
Falco Piſcator; Tom. I. p. 64. T. XL.
Falco Tinnunculus; Tom. I. p. 66. T. XLIX.
Falco Tinnunculus cavernalis; Tom. I. p. 67. T. L.
Falco Tinnunculus murorum; Tom. I. p. 67. T. LI.
Falco Tinnunculus ruderum; Tom. I. p. 67. T. LII.
Falco torquatus; Tom. I. p. 61. T. XXXI.
Falco Antillarum, in toto corpore fuſco; Tom. I. p. 69. num. 53.
—— arborarius; ibid. p. 70. num. 60.
—— aureus; ibid. p. 72. num. 75.
—— Buteo apivorus; ibid. p. 71. num. 74.
———— Braſilienſis; ibid. num. 72.
———— rufus; ibid. num. 71.
———— varius; ibid. p. 70. num. 67.
———— vulgaris; ibid. p. 71. num. 73.
—— cachinnans; ibid. p. 72. num. 78.
—— Carolinenſis Palumbarius, ibid. p. 70. num. 61.
—— Freti Hudſonis; ibid. p. 69 num. 50.
—— fuſcus; ibid. p. 68. uum. 42.
—— hiacintinus; ibid. p. 69. num. 51.
—— Indicus; ibid. p. 68. num. 44.
—— Indicus criſtatus; ibid. p. 69. num. 52.
—— Italicus; ibid. p. 68. num. 45.
—— Iſlandicus; ibid. num. 46.
—— Lanarius albicans; ibid. p. 69. num. 57.
—— Lanarius cinereus; ibid. num. 56.
—— maculatus; ibid. p. 68. num. 39.
—— Merillus, ſive Smerillus, Antillarum; ibid. p. 70. num. 63.
—— Merillus Carolinenſis; ibid. num. 64.
—— Merillus Dominicenſis; ibid. num. 65.
—— Milvus; ibid. num. 66.
—— Milvus Carolinenſis; ibid. p. 71. num. 69.
—— Milvus niger; ibid. num. 70.
—— Milvus vulgaris; ibid. p. 70. num. 68.
—— montanus; ibid. p. 68. num. 48.
—— montanus cinereus; ibid. num. 49.
—— niger; ibid. num. 41.
Falco pedibus pennatis; ibid. p. 71. num. 79.
—— piſcator Antillarum; ibid. p. 69. num. 54.
—— piſcator Carolinenſis; ibid. num. 55.
—— rubens; ibid. p. 68. num. 43.
—— ruſticulus; ibid. p. 72. num. 76.
—— ſufflator, ibid. num. 77.
—— varius Alaudarum; ibid. p. 70. num. 62.
Ficedula Atricapilla communis; Tom. IV. p. 36. T. CCCXCVIII. Fig. 2.
Ficedula Cannabina; Tom. IV. p. 34. T. CCCXCII. Fig. 2.
Ficedula cinerea maior; Tom. IV. p. 35. T. CCCXCV. Fig. 2.
Ficedula cinerea minor; Tom. IV. p. 35. T. CCCXCV. Fig. 1.
Ficedula paluſtris ſuperne fuſco rufeſcens; Tom. IV. p. 34. T. CCCXCIV. Fig. 2.
Ficedula paluſtris ſuperne maxima ex parte cinerea; Tom. IV. p. 34. T. CCCXCIV. Fig. 1.
Ficedula pectore fuſco; Tom. IV. p. 34. T. CCCXCIII. Fig. 2.
Ficedula Phoenicurus pectore caeruleo; Tom. IV. p. 36. T. CCCXCVII. Fig. 2.
Ficedula oculis rubentibus; ibid. p. 36. T. CCCXCVIII. Fig. 2.
Ficedula Sepiaria; ibid. p. 34. T. CCCXCII. Fig. 2.
Ficedula Sepiaria minor; Tom. IV. p. 34. T. CCCXCIII. Fig. 1.
Ficedula Stoparola; ibid. p. 35. T. CCCXCVI. Fig. 1.
Ficedula Bengalenſis; Tom. IV. p. 37. num. 17.
——— Borbonica; ibid. num. 30.
——— Canadenſis; ibid. num. 21.
——— Canadenſis cinerea ibid. num. 37.
——— Canadenſis cinerea maior; ibid. num. 38.
——— Canadenſis fuſca; ibid. num. 33.
——— Canadenſis icterocephalos; ibid. num. 34.
——— Canadenſis maior; ibid. num. 29.
——— Carolinenſis; ibid. num. 18.
——— Carolinenſis cinerea; ibid. num. 36.
——— Dominicenſis; ibid. num. 22.
——— Dominicenſis cinerea; ibid. num. 35.
——— Dominicenſis fuſca; ibid. num. 32.
——— Dominicenſis maior; ibid. num. 23.
——— Dominicenſis varia; ibid. num. 39.
——— Iamaicenſis; ibid. num. 31.
——— Ludoviciana; ibid. num. 25.
——— Madegaſcarienſis maior; ibid. num. 16.
——— Madagaſcarienſis minor; ibid. num. 24.
——— Martinicana; ibid. num. 20.
——— Marylandica *naevia*; ibid. num. 26.
——— *Penſylvanica auro-capilla*; ibid. num. 27.
——— *Penſylvanica erithrocephalos*; ibid. num. 19.
——— *Penſylvanica naevia*; ibid, num. 26.
Fratercula, ab Aldrovando Pica marina dicta; Tom. V. p. 31. T. DLI.
Fringilla; Tom. III. p. 70. T. CCCXXXVII. Fig. 1.
Fringilla montana; Tom. III. p. 71. T. CCCXXXVIII. Fig. 1.
Fringilla naturae luſus; Tom. III. p. 70. T. CCCXXXVII. Fig. 2.
Fringilla Paſſer *Sordone* dicta; Tom. III. p. 72. T. CCCXXXVIII. Fig. 2.
Fringilla (hiemalis) nigra, ventre albo; Tom. III. p. 75. num. 11.
Fulica maior; Tom. V. p. 20. T. DXXIV.
Fulica vulgaris; Tom. V. p. 20. T. DXXV.
Fulica Mexicana; Tom. V. p. 21. num. 3.

G

GAlbula; Tom. III. p. 52. T. CCCVII.
Galbula alba; Tom. III. p. 53. T. CCCIX.
Galbula Brafilienſibus Iacamaciri; Tom. II. p. 52. T. CLXXXIV.
Galbula flava; Tom. III. p. 53. T. CCCVIII.
Galbula longicauda Surinamenſis; Tom. II. p. 52. T. CLXXXV.
Galbula Cochinchinenſis; Tom. III. p. 54. num. 4.
——— Bengalenſis; ibid. num. 6.
——— Indica; ibid. num. 5.
——— Merula bicolor nuncupata; ibid. num.
——— ſive Turdus, Garrulus Bohemicus
num. 8.
Gallinula armata varia Indica; ibid. p. 2. T. CD
Gallinula Ochra; Tom. V. p. 2. T. CDLXX
Gallinula paluſtris minor; Tom. V. p. 2. T. CDL
Gallinula paluſtris vulgaris; ibid. p. 1. T. CDL
Gallinula maior; Tom. V. p. 2. num. 5.
——— maior alia; ibid. num. 6.
——— minor; ibid. num. 7.
Gallina Patavina barbigera; Tom. II. p. 66. T. CC
Gallina Verecunda dicta; Tom. II. p. 67. T. CCX
Gallina Patavina naturae luſus; ibid. p. 73. num. 19.
Gallus cincinnatus; Tom. II. p. 71. T. CCXV.
Gallus cornutus; Tom. II. p. 70. T. CCXIII.
Gallus Gallinaceus criſta calathi nondum effor
Tom. II. p. 66. T. CCVIII.
Gallus naturae luſus; Tom. II. p. 72. T. CCXVI.
Gallus Patavinus; Tom. II. p. 66. T. CCIX.
Gallus pedibus hirſutis; Tom. II. p. 68. T. CCX
Gallus pumilio; Tom. II. p. 70. T. CCXIV.
Gallus vulgaris, ſive Gallinaceus; ibid. p. 65. T. C
Gallus & Gallina alba criſta in vertice plumoſa;
II. p. 72. num. 11.
——— Angliae; ibid. num. 14.
——— Banticana; ibid. num. 15.
——— ex Perſia; ibid. num. 17.
——— Iaponica; ibid. p. 73. num. 18.
——— Mozambicana; ibid. p. 72. num.
——— Pentadactylos; ibid. num. 12
——— Turcica; ibid. num. 13.
Gallo-Pavo albus, fulvo maculatus; Tom. II. p. 76.
CCXXIV.
Gallo-Pavo albus, maculis nigris conſperſus; Tom.
p. 76. T. CCXXIII.
Gallo-Pavo Brafilienſis; Tom. II. p. 77. T. CCXXVI.
Gallo-Pavo criſtatus; Tom. II. p. 75. T. CCXXII.
Gallo-Pavo niger; Tom. II. p. 77. T. CCXXV.
Gallo-Pavo niger maculis albis conſperſus; Tom. II. p. 77. T. CCXXVI.
Gallo-Pavo omnino albus; Tom. II p. 78. num. 6.
——— toto corpore flavicans, ex albo maculatus; ibid. num. 7.
Garrulus Bohemicus; Tom. II. p. 42. T. CLX.
Glareola; Tom. V. p. 28. T. DXLVII.
Glarcola Senegalenſis; Tom. V. p. 29. num. 3.
——— torquata; ibid. num. 2.
Grus; Tom. IV. p. 44. T. CDXV.
Grus Africana; Tom. IV. p. 44. T. CDXIV.
Grus Indica maior; Tom. IV. p. 45. T. CDXVII.
Grus Freti Hudſonis; Tom. IV. p. 45. T. CDXVI.
Grus Americana; Tom. IV. p. 46. num. 7.
—— Iaponenſis; ibid. num. 6.
Grus Mexicana; ibid. num. 5.
Girfalco; Tom. I. p. 69. num. 58.
——— Iſlandicus; ibid. num. 59.

H

HImantopus; Tom. IV. p. 67. T. CDLXX.
Himantopus Mexicanus; Tom. IV. p. 68. T. CDXXI.
Hirundo alba; Tom. IV. p. 42. T. CDX. Fig. 2.
Hirundo Apos Carolinenſis, Tom. IV. p. 43. T. CDXI. Fig. 2.
Hirundo domeſtica; Tom. IV. p. 42. T. CDIX. Fig. 1.
Hirundo maior, ſive Apos criſtata; Tom. IV. p. 43. T. CDXII. Fig. 2.
Hirundo maior, ſive Apos Freti Herculei; Tom. IV. p. 43. T. CDXIII. Fig. 1.
Hirundo maior, ſive Apos vulgaris; Tom. IV. p. 43. T. CDXII. Fig. 1.
Hirundo minor urbica; Tom. IV. p. 42. T. CDVIII. Fig. 2.
Hirundo riparia, ſive montana fuſca; Tom. IV. p. 42. T. CDIX. Fig. 2.
Hirundo Sinenſis; Tom. IV. p. 42. T. CDXI. Fig. 1.
Hirundo ſylvatica vel riparia; Tom. IV. p. 41. T. CDVIII. Fig. 1.
Hirundo vulgaris; Tom. IV. p. 42. T. CDX. Fig. 1.
Hirundo Americana; Tom. IV. p. 44. num. 20.
——— Apos Dominicenſis; ibid. num. 22.
——— Carolinenſis; ibid. num. 19.
——— Cayanenſis; ibid. num. 14.
——— domeſtica; ibid. num. 12.
——— Dominicenſis; ibid. num. 13.
——— Martinicana; ibid. num. 18.
——— Peruviana; ibid. num. 16.
——— Peruviana maior; ibid. num. 17.
——— riparia Senegalenſis; ibid. num. 21.
——— Senegalenſis; ibid. num. 15.
Hortulanus flavus; Tom. III. p. 74. T. CCCLI. Fig. 2.
Hortulanus nivalis; Tom. III. p. 74. T. CCCLII. Fig. 1.
Hortulanus Albicilla; Tom. III. p. 75. num. 7.
——— communis; ibid. num. 5.
——— candidus; ibid. num. 6.
——— Capitis Bonae Spei; ibid. num. 9.
——— Ludovicianus; ibid. num. 8.

I

IAcana; Tom. V. p. 2. num. 8.
——— armata; ibid. num. 9.
——— armata fuſca; p. 3. num. 11.
——— armata nigra; ibid. num. 10.
Iſpida, vulgo Avis S. Mariae; ibid. p. 6. T. CDXCIII.
Iſpida Americana viridis; Tom. V. p. 6. num. 9.
—— Bengalenſis; ibid. num. 2.
—— Bengalenſis maior; ibid. p. 7. num. 14.
—— Bengalenſis minor; ibid. p. 6. num. 3.
—— Bengalenſis torquata; ibid. p. 7. num. 15.
—— Brafilienſis; ibid. num. 19.
—— Brafilienſis criſtata; ibid. num. 20.
—— Brafilienſis; naevia; ibid. num. 25.
—— caerulea Americana; ibid. num. 16.
—— Capitis Bonae Spei; ibid. p. 6. num. 8.
—— Carolinenſis criſtata; ibid. p. 7. num. 21.

Ispida Cayanensis; ibid. num. 18.
—— Dominicensis cristata; ibid. num. 22.
—— ex albo & nigro varia; ibid. num. 24.
—— Indica; ibid. p. 6. num. 4.
—— Indica cristata; ibid. p. 7. num. 17.
—— Indica torquata; ibid. p. 6. num. 5.
—— Madagascariensis ibid. num. 18.
—— Madagascariensis caerulea; ibid. p. 7. num. 12.
—— Mexicana cristata; ibid. num. 23.
—— Philippensis cristata; ibid. p. 6. num. 6.
—— Senegalensis; ibid. num. 7.
—— Senegalensis maior; ibid. p. 7. num. 11.
—— Smirnensis; ibid. num. 13.
—— Ternatana; ibid. num. 26.

L

Lagopus alba; Tom. II. p. 85. T. CCXL.
Lagopus sive Francolinus montanus; Tom. II. p. 84. T. CCXXXVIII.
Lagopus vulgaris; Tom. II. p. 85. T. CCXXXIX.
Lagopus Americanus; Tom. II. p. 86. num. 9.
—— Canadensis; ibid. num. 7.
—— Canadensis minor; ibid. num. 8.
—— Corylorum; ibid. num. 4.
—— cristatus Pensilvaniae; ibid. num. 10.
—— Pyrenaicus; ibid. num. 5.
—— Scoticus; ibid. num. 6.
Lagopus; Urogallus minor; Tom. II. p. 82. T. CCXXXII.
Lagopus varius; Tom. II. p. 84. num. 8.
Lanius Bengalensis; Tom. I. p. 74. T. LVII. Fig. 1.
Lanius caeruleus; Tom. I. p. 75. T. LX. Fig. 1.
Lanius Canadensis; Tom. I. p. 75. T. LXII. Fig. 2.
Lanius Cayanensis luteus; Tom. I. p. 74. T. LVIII. Fig. 1.
Lanius cinereus maior; Tom. I. p. 72. T. LIII.
Lanius cinereus medius; Tom. I. p. 73. T. LIV.
Lanius ferrugineus maior; Tom. I. p. 74. T. LVI.
Lanius maior viridis; ibid. p. 75. T. LIX. Fig. 2.
Lanius maior ex nigro & albo mixtus; Tom. I. p. 75. T. LX. Fig. 2.
Lanius Manillensis; Tom. I. p. 75. T. LXII. Fig. 1.
Lanius minor rufus; Tom. I. p. 73. T. LV. Fig. 1.
Lanius Passer; Tom. I. p. 74. T. LV. Fig. 2.
Lanius ruber Surinamensis; Tom. I. p. 74. T. LVIII. Fig. 2.
Lanius rufus; Tom. I. p. 75. T. LIX. Fig. 2.
Lanius rufus cristatus Bengalensis; Tom. I. p. 74. T. LVII. Fig. 2.
Lanius Senegalensis cinereus; Tom. I. p. 75. T. LXI. Fig. 1.
Lanius Senegalensis ruber; Tom. I. p. 75. LXI. Fig. 2.
Lanius Americanus cristatus; Tom. I. p. 75. num. 22.
—— Bengalensis fuscus; ibid. p. 76. num. 28.
—— Capitis Bonae Spei; ibid. num. 29.
—— Cayanensis cinereus; ibid. num. 23.
—— Cayanensis naevius; ibid. num. 24.
—— Cinereus maximus; ibid. p. 75. num. 19.
—— Iocosus dictus; ibid. num. 21.
—— Lucionensis; ibid. p. 76. num. 27.
—— Ludovicianus; ibid. num. 25.
—— Madagascariensis; ibid. num. 26.
—— Madagascariensis minor viridis; ibid. num. 30.
—— Mexicanus; ibid. num. 31.
—— minor cinereus; ibid. p. 75. num. 18.
—— Schach dictus; ibid. num. 20.
Larus candidus; Tom. V. p. 23. T. DXXXII.
Larus cinereus; Tom. V. p. 21. T. DXXVIII.
Larus cinereus, capite ex viridi nigricante; Tom. V. p. 21. T. DXXVII.
Larus cinereus maximus marinarius, vel Piscator; Tom. V. p. 23. T. DXXXIII.
Larus cinereus rostri extremitate & pedibus croceis; Tom. V. p. 22. T. DXXX.
Larus cinereus rostro & pedibus rubris; Tom. V. p. 21. T. DXXVI.
Larus maculatus; Tom. V. p. 23. T. DXXXI.
Larus maculatus variegatusque; Tom. V. p. 23. T. DXXXIV.
Larus maxima ex parte albicans; Tom. V. p. 22. T. DXXIX.
Larus nostratibus vulgo *Guairo*, a nonnullis forte Larus hybernus; Tom. V. p. 23. T. DXXXV.
Larus Americanus; Tom. V. p. 23. num. 11.
—— Dominicensis; ibid. num. 12.
Limosa; Tom. IV. p. 64. T. CDLXII.
Limosa an grisea maior Brissonij; Tom. IV. p. 64. T. CDLXI.
Limosa quam in Etruria vulgo Moschettone appellant; Tom. IV. p. 63. T. CDLX.
Limosa alba Freti Hudsonis; Tom. IV. p. 65. num. 8.
—— Americana rufa; ibid. num. 7.
—— grisea; ibid. p. 64. num. 4.
—— rufa; ibid. num. 5.
—— rufa maior; ibid. p. 65. num. 6.
Linaria; Tom. III. p. 77. T. CCCLVII. Fig. 1.
Linaria montana; ibid p. 77. T. CCCLVI. Fig. 1.
Linaria rubra minor; Tom. III. p. 77. T. CCCLVI. Fig. 2.
Linaria vulgaris; Tom. III. p. 77. num. 4.
—— Aquilana; ibid. num. 5.
—— Argentoratensis; ibid. num. 6.
—— Brasilienſis Longicauda; ibid. p. 78. num. 7.
Lito-Faleo; Tom. I. p. 68. num. 47.
Loxia, vel Curvirostra; Tom. III. p. 63. T. CCCXXIV.
Luscinia palustris maior; Tom. IV. p. 38. T. CCCC. Fig. 1.
Luscinia palustris minor; Tom. IV. p. 37. T. CCCXCIX. Fig. 2.
Luscinia sive Philomela vulgaris; Tom. IV. p. 38. T. CCCC. Fig. 2.
Luscinia Madagascariensis; Tom. IV. p. 38. num. 4.

M

Manucodiata sive Paradisea; Tom. I. p. 76. T. LXIII.
Manucodiata altera; ibid. p. 77. T. LXIV. Fig. 2.
Manucodiata nigra; Tom. I. p. 78. T. LXIV. Fig. 1.
Manucodiata Rex Avium Paradisaeorum dicta; Tom. I. p. 79. T. LXVI.
Manucodiatae aliae varietates; Tom. I. p. 78. Fig. 1. & Fig. 2.
Meleagris vulgo Gallina Faraonica; Tom. II. p. 79. T. CCXXX.
Meleagris altera Gallina Aegyptiaca dicta; Tom. II. p. 80. T. CCXXXII.
Meleagris vel Gallina Guinea, vel Numidica alba; Tom. II. p. 80. T. CCXXXI.
Mellisuga cristata; Tom. IV. p. 40. T. CDII. Fig. 2.
Mellisuga Surinamensis; Tom. IV. p. 40. T. CDV. Fig. 1.

Melli-

Mellivora Carolinenſis foemina; Tom. IV. p. 40. T. CDIV. Fig. 2.
Mellivora Carolinenſis gutture coccineo; Tom. IV. p. 40. T. CDIV. Fig. 1.
Mellivora Ceylanenſis; Tom. IV. p. 40. T. CDV. Fig. 3.
Mellivora Falcinellus magna ex parte caerulea; Tom. IV. p. 41. T. CDVII. Fig. 2.
Mellivora Falcinellus nigricans Ceylanenſis; Tom. IV. p. 41. T. CDVII. Fig. 1.
Mellivora longicauda Iamaicenſis; Tom. IV. p. 41. T. CDVI. Fig. 2.
Mellivora Mexicana; Tom. IV. p. 40. T. CDIV. Fig. 3.
Mellivora minima; Tom. IV. p. 39. T. CDII. Fig. 1.
Mellivora torquata Surinamenſis; Tom. IV. p. 41. T. CDVI. Fig. 1.
Mellivora vertice & collo ſplendide coccineo vario; Tom. IV. p. 40. T. CDII. Fig. 3.
Mellivora viridis & caerulea Surinamenſis; Tom. IV. p. 40. T. CDIII. Fig. 1.
Mellivora viridis Surinamenſis longicauda; Tom. IV. p. 40. T. CDIII. Fig. 2.
Melliſuga Americana gutture topazino; Tom. IV. p. 41. num. 16.
——— Braſilienſis cauda bifurca; ibid. num. 24.
——— Braſilienſis gutture rubro; ibid. num. 22.
——— Cayanenſis; ibid. num. 18.
——— gutture naevio; ibid. num. 19.
——— maior; ibid. num. 23.
——— ventre albo; ibid. num. 20.
——— ventre griſeo; ibid. num. 21.
——— Dominicenſis; ibid. num. 17.
——— Guyanenſis cauda bifurca; ibid. num. 24.
——— Iamaicenſis cauda bifurca; ibid. num. 26.
——— Iamaicenſis violacea cauda bifurca; ibid. n. 27.
Merganſer; Tom. V. p. 15. T. DVIII.
Merganſer cinereus capite rufeſcente breviroſter; Tom. V. p. 16. T. DXI.
Merganſer longiroſter, an Foemina; Tom. V. p. 16. T. DX.
Merganſer longiroſter criſtatus; Tom. V. p. 15. T. DIX.
Merganſer minor, a quibuſdam Monialis alba dictus; Tom. V. p. 16. T. DXIII.
Merganſer minor foemina; Tom. V. p. 16. T. DXIV.
Merganſer ſuperne niger, inferne albus; Tom. V. p. 16. T. DXII.
Merganſer cinereus; Tom. V. p. 16. num. 10.
——— niger; ibid. num. 8.
——— ſtellatus; ibid. num. 9.
——— Virginianus; ibid. num. 11.
Mergus maior; Colymbus Geſneri; Tom. V. p. 13. T. DV.
Mergus maior, an foemina; Tom. V. p. 14. T. DVI.
Mergus maior naevius, ſive Arcticus; Tom. V. p. 14. T. DVII.
Mergus gutture nigro; Tom. V p. 14. num. 6.
——— gutture rubro; ibid. num. 5.
——— minor; ibid. num. 4.
——— naevius; ibid. p. 15. num. 7.
Merops ſive Apiaſter; Tom. V. p. 6. T. CDXCIV.
Merula aquatica vel Rivalis; Tom. V. p. 5. T. CDXC.
Merula aquatica nigra; Tom. V. p. 6. T. CDXCII.
Merula aquatica pectore caeruleo fuſco; Tom. V. p. 5. T. CDXCI.
Merula vulgaris foemina; Tom. III. p. 46. T. CCC.
Merula vulgaris mas; Tom. III. p. 46. T. CCXCIX.
Merula Braſilienſis; Tom. III. p. 48. T. CCCV.
Merula candida; Tom. III. p. 47. T. CCCIII.
Merula ex nigro-virideſcente & aureo varia; Tom. III. p. 49. T. CCCVI.
Merula flaveſcens; Tom. III. p. 46. T. CCCI.
Merula mas pene alba; Tom. III. p. 47. T. CCCII.
Merula torquata; Tom. III. p. 48. T. CCCIV.
Miliaria Avis; Tom. IV, p. 20. T. CDLXIV. Fig. 1.
Miliaria paluſtris; Tom. III. p. 69. T. CCCXXXVI.
Mituporanga Braſilienſis; Tom. II. p. 78. T. CCXXVIII.
Mituporanga Curaſſavica; Tom. II. p. 79. T. CCXXIX.
Mituporanga Braſilienſibus Mitu, vel Mutu; Tom. II. p. 79. num. 3.
——— Mexicana *Pauxi* dicta; ibid. num. 4.
——— Mexicanis Hoaſtzin vocata; ibid. num. 5.
——— Peruviana; ibid. num. 6.
Motacilla cinerea; Tom. IV. p. 30. T. CCCLXXXIV. Fig. 2.
Motacilla flava, ſive verna; Tom. IV. p. 31. T. CCCLXXXV. Fig. 2.
Motacilla flaveſcens capite cinereo alis fuſcis; Tom. IV. p. 31. T. CCCLXXXVI. Fig. 1.
Motacilla flava altera caudatremula; Tom. IV. p. 31. T. CCCLXXXVI. Fig. 2.
Motacilla quam noſtri albam cognominant; Tom. IV. p. 31. T. CCCLXXXV Fig. 2.
Motacilla Capitis Bonae Spei; Tom. IV. p. 32. num. 8.
——— Iavenſis; ibid. num. 7.
——— Maderaſpatana; ibid. num. 9.
——— quam in Etruria *Striſciattola* dicunt; ibid. num. 6.
Muſcicapa; Tom. IV. p. 29. T. CCCLXXXII. Fig. 1.
Muſcicapa altera mas; Tom. IV. p. 29. T. CCCLXXXII. Fig. 2.
Muſcicapa altera foemina; Tom. IV. p. 30. T. CCCLXXXIII. Fig. 1.

N

Noctua vulgaris noſtras aucuparia; Tom. I. p. 87. T. LXXXVI.
Noctua alba; Tom. I. p. 88. T. LXXXIX.
Noctua Canadenſis; Tom. I. p. 88. T. XC.
Noctua cinerea; Tom. I. p. 87. T. LXXXVIII.
Noctua flava; Tom. I. p. 87. T. LXXXVII.
Noctua Coquimbana; Tom. I. p. 88. num. 9.
——— maior; ibid. num. 6.
——— Mexicana; ibid. num. 8.
——— minima; ibid. num. 7.
Numenius, ſive Arcuata maior; Tom. IV. p. 55. T. CDXL.
Numenius coccineus Sinenſis; Tom. IV. p. 57. T. CDXLII.
Numenius maior fuſcus; Tom. IV. p. 55. T. CDXXXIX.
Numenius ſive Arcuata minor; Tom. IV. p. 56. T. CDXLI.
Numenius Americanus fuſcus; Tom. IV. p. 57. n. &
——— maior; ibid. num. 10.
——— minor; ibid. num. 11.
——— Braſilienſis candidus; ibid. num. 12.
——— fuſcus; ibid. num. 13.
——— caſtaneus; ibid. num. 7.
——— Madagaſcarienſis; ibid. num. 5.
——— Mexicanus varius; ibid. num. 9.
——— viridis; ibid. num. 6.
Numenii forte ſpecies; Tom. IV. p. 62. T. CDLVI.

O

OEnanthe ſive Vitiflora; Tom. IV. p. 30. T. CCCLXXXIII. Fig. 2.
Oenanthe alba; Tom. IV. p. 30. T. CCCLXXXIV. Fig. 1.
Oenanthe arborea foemina; Tom. IV. p. 29. T. CCCLXXXI. Fig. 2.
Oenanthe arborea, alba mas; Tom. IV. p. 29. T. CCCLXXXI. Fig. 1.
Onocrotalus ſive Pelecanus; Tom. V. p. 11. T. ID.
Onocrotalus ſive Pelecanus Americanus; Tom. V. p. 12. T. D.
Onocrotalus Mexicanus; Tom. V. p. 12. num. 3.
———— Philippenſis; ibid. num. 4.
Oſtralega, aliquibus Scolopax maritima; Tom. IV. p. 68. T. CDLXXI.
Otis ſeu Otarda Avis; Tom. III. p. 27. T. CCLXV.
Otis ſive Starda minor; Tom. III. p. 26. T. CCLXIV.
Otis ſive Tarda Arabica; Tom. III. p. 27. T. CCLXVI.

P

PAlumbus; Tom. III. p. 30. T. CCLXXII.
Palumbus Amboinenſis; Tom. III. p. 39. num. 53.
———— caeruleus Madagaſcarienſis; ibid. num. 50.
———— Moluccenſis; ibid. num. 52.
———— viridis Madagaſcarienſis; ibid. num. 51.
Parus caeruleus vel minor; Tom. IV. p. 25. T. CCCLXXVI. Fig. 1.
Parus caudatus paluſtris; ibid. p. 28. T. CCCLXXX.
Parus caudatus ſylvarum; ibid. p. 27. T. CCCLXXIX.
Parus cinereus; ibid. p. 26. T. CCCLXXVII. Fig. 1.
Parus Indicus; ibid. p. 27. T. CCCLXXVIII. Fig. 2.
Parus maior; ibid. p. 26. T. CCCLXXVII. Fig. 2.
Parus minor alter; Tom. IV. p. 26. T. CCCLXXVI. Fig. 2.
Parus paluſtris; ibid. p. 27. T. CCCLXXVIII. Fig. 1.
Parus Americanus gutture luteo; Tom. IV. p. 29. num. 12.
—— Canadenſis atricapillus; ibid. num. 9.
—— criſtatus; ibid num. 10.
—— criſtatus pectore rubro; ibid. num. 11.
—— cucullo nigro Carolinenſis; ibid. num. 14.
—— Penſilvanicus; ibid. num. 15.
—— Virginianus; ibid. num. 13.
Paſſer Americanus; Tom. III. p. 73. T. CCCXLII. Fig. 2.
Paſſer domeſticus, ibid. p. 72. T. CCCXL. Fig. 2.
Paſſer domeſticus naturae luſus; Tom. III. p. 72. T. CCCXXXIX. Fig. 2.
Paſſer Illyricus vel Sclavonicus; Tom. III. p. 73. T. CCCXLII. Fig. 1.
Paſſer Inſulae S. Thomae; Tom. III. p. 73. T. CCCXLIII. Fig. 1.
Paſſer Mexicanus; ibid. p. 73. T. CCCXLIII. Fig. 2.
Paſſer ſtultus Bononienſis; Tom. III. p. 72. T. CCCXXXIX. Fig. 1.
Paſſer ſtultus naturae luſus; Tom. III. p. 72. T. CCCXXXIX. Fig. 2.
Paſſer ſylveſtris; Tom. III. p. 73. T. CCCXLI. Fig. 1.
Paſſer ſylveſtris, Petronia marina Bononienſibus; Tom. III. p. 73. T. CCCXLI. Fig. 2.
Paſſeres Braſilienſes Papiliones dicti; Tom. III. p. 73. T. CCCXLIV.
Paſſer ſolitarius; Tom. III. p. 54. T. CCCX.
Paſſer ſolitarius varius; Tom. III. p. 55. T. CCCXI.
Paſſer ſolitarius caeruleus; Tom. III. p. 56. num. 3.
———— Manillenſis; ibid. num. 4.
———— Philippenſis; ibid. num. 5.
Pavo vel Pavus albus; Tom. II. p. 74. T. CCXVIII.
Pavo mas; Tom. II. p. 73. T. CCXVII.
Pavo Sinenſis foemina; Tom. II. p. 75. T. CCXX.
Pavo Sinenſis mas; Tom. II. p. 74. T. CCXIX.
Pavo Tibetanus; Tom. II. p. 75. T. CCXXI.
Pavo Iaponenſis; Tom. II. p. 75. num. 7.
—— varius; ibid. num. 6.
Perdix cinerea maior, Placentina in Hetruria; Tom. III. p. 19. T. CCL.
Perdix minor; Tom. III. p. 18. T. CCXLIX.
Perdix minor ſlaveſcens; Tom. III. p. 19. T. CCLI.
Perdix minor, maxima ex parte alba; Tom. III. p. 19. T. CCLII.
Perdix rubra Africana; Tom. III. p. 22. T. CCLVII.
Perdix rubra maior, quam noſtri Coturnicem vocant; Tom. III. p. 21. T. CCLVI.
Perdix rubra pectore albo; Tom. III. p. 20. T. CCLIV.
Perdix rubra pennis in toto corpore albis; Tom. III. p. 21. T. CCLV.
Perdix ruſa; Tom. III. p. 20. T. CCLIII.
Perdix Americana; Tom. III. p. 23. num. 15.
——— Braſilienſis; ibid. num. 12.
——— Braſilienſis maior, ibid. num. 13.
——— montana; ibid. num. 10.
——— montana Mexicana; ibid. num. 11.
——— Novae Angliae; ibid. num. 14.
——— Senegalenſis; ibid. num. 16.
——— Sinenſis; ibid. num. 17.
Phaeton, ſive Avis Tropicorum; Tom. V. p. 17. T. DXVI.
Phaeton albus; Tom. V. p. 18. num. 2.
——— fulvus; ibid. num. 3.
Phalacrocorax, ſive Corvus aquaticus; Tom. V. p. 12. T. DI.
Phalacrocorax pennis nigricantibus minor; Tom. V. p. 13. T. DII.
Phalacrocorax roſtro & pedibus luteis; Tom. V. p. 13. T. DIII.
Phalacrocorax vulgo in Etruria *Perdigiorno* dictus; Tom. V. p. 13. T. DIV.
Phaſianus; Tom. III. p. 23. T. CCLVIII.
Phaſianus albus; Tom. III. p. 24. T. CCLIX.
Phaſianus Bengalenſis cornutus; Tom. III. p. 25. T. CCLXIII.
Phaſianus Sinenſis; Tom. III. p. 24. T. CCLX.
Phaſianus Sinenſis albus; Tom. III. p. 25. T. CCLXI.
Phaſianus Sinenſis colore fuſco rufeſcente; Tom. III. p. 25. T. CCLXII.
Phaſianus criſtatus Indicus; Tom. III. p. 26. num. 9.
———— Guianenſis; ibid. num. 8.
———— Inſularum Antillarum; ibid. num. 7.
Phoenicopterus; Tom. V. p. 9. T. XDVI.
Pica Americana luteo nigro varia; Tom. II p. 41. T. CLVIII.
Pica caudata alba; Tom. II. p. 41. T. CLVI.
Pica minor Bengalenſis; Tom. II. p. 41. T. CLVII.
Pica Orientalis; Tom. II. p. 42. T. CLIX.
Pica varia, ſive caudata; Tom. II. p. CLV.
Pica Iamaicenſis; Tom. II p. 42. num. 7.
—— maior Mexicana; ibid. num. 8.
—— Mexicana minor; ibid. num. 9.

Pica Senegalenſis; ibid. num. 6.
Pica Glandaria; Tom. II. p. 43. T. CLXI.
Pica Glandaria alba; Tom. II. p. 44. T. CLXIII.
Pica marina; Tom. II. p. 45. T. CLXIV.
Pica nucifraga, vel Nucifragus; Tom. II. p. 44. T. CLXIII.
Pica Glandaria; Tom. II. p. 45. num. 5.
———— caerulea; ibid. num. 7.
———— fuſca Canadenſis; ibid. num. 6.
Picus altivolans ex Guinea; Tom. II. p. 49. T. CLXXIII.
Picus Bengalenſis maculatus; ibid. p. 50. T. CLXXIX.
Picus capite colloque rubris, Virginianus; Tom. II. p. 50. T. CLXXVI.
Picus Capitis Bonae Spei; Tom. II. p. 50; T. CLXXV.
Picus Indicus totus ferme caeruleus; Tom. II. p. 51. T. CLXXXI.
Picus niger; Tom. II. p. 49. T. CLXXII.
Picus niger Cayanenſis criſtatus; Tom. II. p. 49. T. CLXXIV.
Picus tridactylus; Tom. II. p. 50. T. CLXXX.
Picus varius Indicus; Tom. II. p. 48. T. CLXXI.
Picus varius maior; Tom. II. p. 47. T. CLXVII.
Picus varius maior, pennis in pectore mutatis; Tom. II. p. 47. T. CLXVIII.
Picus varius maximus; Tom. II. p. 47. T. CLXIX.
Picus varius medius; Tom. II. p. 46. T. CLXVI.
Picus varius Mexicanus maior; Tom. II. p. 50. T. CLXXVIII.
Picus viridis; Tom. II. p. 45. T. CLXV.
Picus viridis cinereo Norvegicus; Tom. II. p. 50. T. CLXXVII.
Picus varius minor; Tom. II. p. 48. T. CLXX.
Platea, vel Pellicanus; ibid. p. 53. T. CDXXXVII.
Platea roſea; Tom. IV. p. 54. T. CDXXXVIII.
Platea coccinea; Tom. IV. p. 56. num. 3.
Pluvialis aurea, an minor Briſſonii; Tom. IV. p. 69. T. CDLXXIII.
Pluvialis Dominicenſis torquata; Tom. IV. p. 70. T. CDLXXVIII.
Pluvialis maior; Tom. IV. p. 68. T. CDLXXII.
Pluvialis morinellus flaveſcens; Tom. IV. p. 69. T. CDLXXIV.
Pluvialis morinellus maior, foemina; Tom. IV. p. 70. T. CDLXXV.
Pluvialis Senegalenſis armata; Tom. IV. p. 70. T. CDLXXVIII.
Pluvialis ſpecies; Tom. IV. p. 61. T. CDLIII.
Pluvialis torquata; Tom. IV. p. 70. T. CDLXXVI.
Pluvialis aurea; Tom. IV. p. 70. num. 8.
———— Dominicenſis; ibid. num. 9.
———— Freti Hudſonis; ibid. num. 10.
———— Bengalenſis maior; ibid. p. 71. num. 14.
———— Perſica criſtata; ibid. num. 15.
———— torquata Iamaicenſis; ibid. num. 13.
———— maior; ibid. num. 11.
———— virginiana; ibid. p. 71. num. 12.
Polytmus, ſive Colybri Surinamenſis longicaudus, ruber; Tom. IV. p. 40. T. CDV. Fig. 2.
Porphyrio; Tom. V. p. 3. T. CDLXXXV.
Porphirio ex viridi nigricante; Tom. V. p. 3. T. CDLXXXVI.
Porphyrio foemina; ibid. V. p. 4. T. CDLXXXVII.
Porphirio Freti Hudſonis; Tom. V. p. 4. num. 9.
———— fuſcus; ibid. num. 6.
———— Maderaſpatanus; ibid. num. 10.
———— Melanocepholos; ibid. num. 4.
———— ruſeſcens; ibid. num. 7.
Porphirio ruſus; ibid. num. 8.
———— viridis; ibid. num. 5.
Procellaria, Fringilla marina etiam dicta; Tom. V. p. 25. T. DXXXVIII.
Procellaria cinerea Tom. V. p. 25. num. 2.
———— naevia; ibid. num. 3.
Pſittacus Ara, vel Arara Braſilienſis viridis dictus; Tom. I. p. 92. T. CI.
Pſittacus Ara Braſilienſis cyanea crocea; Tom. I. p. 94. T. CIII.
Pſittacus Ara rubra Braſilienſis dictus; Tom. I. p. 93. T. CII.
Pſittacus Amazonicus; Tom. I. p. 95. T. CXIV.
Pſittacus Amazonicus varius; Tom. I. p. 96. T. CXVI.
Pſittacus Braſilienſis viridis; Tom. I. p. 94. T. CVII.
Pſittacus Braſilienſis alter viridis; Tom. I. p. 95. T. CVIII.
Pſittacus Braſilienſis viridis capite albo; Tom. I. p. 95. T. CIX.
Pſittacus, Cacatua dictus; Tom. I. p. 96. T. CXVII.
Pſittacus, Cacatua dictus, rubro criſtatus; Tom. I. p. 96. T. CXVIII.
Pſittacus, Cacatua minor dictus; ibid. p. 96. T. CXIX.
Pſittacus capite accipitris; Tom. I. p. 96. T. CXX.
Pſittacus coccineus; Tom. I. p. 94. T. CIV.
Pſittacus coccineus alter; Tom. I. p. 94. T. CV.
Pſittacus coccineus Moluccenſis; Tom. I. p. 94. T. CVI.
Pſittacus flavus; Tom. II. p. 18. T. CXXII.
Pſittacus flavus Braſilienſis; Tom. I p. 95. T. CXI.
Pſittacus Guineenſis cinereus; Tom. I. p. 95. T. CXII.
Pſittacus Guineenſis cinereus rubro varius; Tom. I. p. 95. T. CXIII.
Pſittacus luteo ac rubro capite; Tom. II. p. 17. T. CXXI.
Pſittacus minimus fronte ac dorſo inferiore rubris Tom. II. p. 21. T. CXXXIV.
Pſittacus minimus fronte ac gula rubris; Tom. II. p. 21. T. CXXXIII.
Pſittacus minor e coccineo viridis Americanus; Tom. II. p. 22. T. CXXXV.
Pſittacus minor; ſive Pſittacula Lucionenſis; Tom. II. p. 21. T. CXXX.
Pſittacus minor, ſive Pſittacula Orientalis; Tom. II. p. 20. T. CXXIX.
Pſittacus minor, ſive Pſittacula Ginginiana erytrocephalos; Tom. II. p. 21. T. CXXXII.
Pſittacus Pſittacula criſtata dictus; Tom. II. p. 21. T. CXXXI.
Pſittacus Pſittacula dictus Americana; Tom. II. p. 19. T. CXXV.
Pſittacus Pſittacula dictus ex fuſco viridis; Tom. II. p. 19. T. CXXVI.
Pſittacus Pſittacula dictus vertice caeruleo, fronte lutea; Tom. II. p. 20. T. CXXVII.
Pſittacus Pſittacula nigra dictus; Tom. II. p. 20. T. CXXVIII.
Pſittacus Pſittacula torquata dictus; Tom. II. p. 19. T. CXXIV.
Pſittacus Pſittacula viridis; Tom. II. p. 18. T. CXXIII.
Pſittacus variegatus Braſilienſis; Tom. I. p. 96. T. CXVI.
Pſittacus viridis capite colloque flavo; Tom. I. p. 95. T. CX.
Pſittacus ſive Ara Braſilienſis; Tom. II. p. 22. num. 40.
———— Braſilienſis ex viridi & rubro varia; ibid. num. 41.
———— ex luteo & caeruleo varia; Ibid. num. 38.

Pſittacus ſive Ara Iamaicenſis; ibid. num. 37.
——— Moluccenſis; ibid. num. 39.
——— Amazonicus; ibid. p. 24. num. 59.
——— fronte lutea; ibid. num. 60.
——— gutture luteo; ibid. num. 61.
——— Iamaicenſis; ibid. num. 63.
——— roſtro variegato; ibib. num. 64.
——— varius; ibid. num. 61. *
——— alter; ibid. num. 62.
——— Aquarum Lupiarum Inſulae; ibid. num. 66.
——— Braſilienſis cinereus; ibid. p. 25. num. 73.
——— Braſilienſis fuſcus; ibid. p. 28. num. 109.
——— Braſilienſis fronte rubra; ibid. p. 24. num. 58.
——— Cacatua tota alba dictus; ibid. p. 22. num. 42.
——— capite caeruleo Braſilienſis; ibid. p. 23. n. 19.
——— capite & pectore luteo; ibid. num. 48.
——— capite rubente Braſilienſis; ibid. num. 52.
——— Ceramenſis coccineus; ibid. p. 22. num. 43.
——— Chinenſis; ibid. p. 24. num. 65.
——— coccineus collari luteo; ibid. p. 23. num. 46.
——— crythrochloros criſtatus; ibid. p. 28. num. 110.
——— e coccineo & nigro varius Braſilienſis; ibid. p. 23. num. 45.
——— (feſtivus) brachyurus viridis; ibid. p. 25. num. 76.
——— fronte alba Martinicanus; ibid. p. 23. num. 54.
——— fuſcus; ibid. p. 25. num. 74.
——— fuſcus Mexicanus; ibid. p. 24. num. 67.
——— Guianenſis caeruleus; ibid. num. 68.
——— Guianenſis cyanocephalos; ibid. num. 57.
——— Guincenſis alis rubris; ibid. p. 25. num. 71.
——— Iamaicenſis gutture rubro; ibid. p. 23. num. 53.
——— luteus Inſulae Cubae; ibid. p. 25. num. 70.
——— luteus Mexicanus; ibid. p. 24. num. 69.
——— Martinicanus cyanocephalos; ibid. num. 56.
——— Martinicanus gutture rubro; ibid. num. 55.
——— minimus ſive Pſittacula Braſilienſis; ibid. p. 27. num. 100.
——— uropygio cyaneo; ibid. num. 101.
——— minor Amboinenſis coccineus; ibid. num. 97.
——— Amboinenſis varius; ibid. p. 26. num. 92.
——— Angolenſis luteus; ibid. p. 25. num. 79.
——— Braſilienſis; ibid. p. 26. num. 85.
——— Cayanenſis; ibid. num. 84.
——— coccineus Bonarum Fortunarum Inſulae; ibid. num. 95.
——— coccineus Indicus; ibid. p. 27. num. 96.
——— Guianenſis; ibid. p. 25. num. 78.
——— Iavenſis criſtatus coccineus; ibid. p. 27. num. 98.
——— Indicus varius; ibid. p. 26. num. 93.
——— luteus Braſilienſis; ibid. num. 94.
——— ſive Pſittacula Americana dictus, longicaudus; ibid. p. 25. num. 80.
——— Carolinenſis; ibid. p. 26. n. 87.
——— Ginginiana; ibid. num. 88.
——— Iaponica; ibid. num. 91.
——— macroura; ibid. num. 89.
——— Martinicana; ibid. num. 90.
——— torquata Borbonica dictus; ibid. num. 83.
——— torquata Bengalenſis; ibid. n. 82.
——— torquata indica; ibid. num. 81.
——— minor viridis; ibid. p. 28. num. 111.
——— minor viridis longicaudus: ibid. p. 26. num. 86.
——— nigricans; ibid. p. 25. num. 75.

⁂ Pſittacus parvus Braſilienſis icterocephalos; ibid. p. 26. num. 106.
——— Braſilienſis luteus; ibid. num. 107.
——— gutture luteo; ibid. num. 105.
——— Senegalenſis; ibid. p. 28. num. 108.
——— ſive Pſittacula Braſilienſis; erythrocephalos; ibid. p. 27. num. 99.
——— Madagaſcarienſis; ibid. num. 104.
——— Malacenſis; ibid. n. 102.
——— Philippenſis; ibid. n. 103.
——— ſordide albus ad cinerem vergens; ibid. p. 23. num. 44.
——— ſuperne ſaturate coccineus; *ibid.* num. 47.
——— viridis & luteus ac caeruleus; ibid. num. 51.
——— viridis & luteus Barbadenſis; ibid. num. 50.
——— viridis longicaudus, ibid. p. 25. num. 77.
——— viridis Mexicanus pectore albo; ibid. num. 72.
Puffinus, ſive Procellaria aequinotialis; Tom. V. p. 23. T. DXXXVI.
Puffinus minor, vulgo in Etruria *Berta minore* dictus Tom. V. p. 24. T. DXXXVII.
Puffinus Braſilienſis; Tom. V. p. 25. num. 5.
——— Capitis Bonae Spei; ibid. num. 4.
——— cinereus; ibid. num. 3.

R

Reginus maritimus; Tom. IV. p. 65. T CDLIX.
Regulus Americanus alis nigris; Tom. III. p. 78. T. CCCLX. Fig. 1.
Regulus Capitis Bonae Spei; Tom. IV. p. 39. T. CDI. Fig. 2.
Regulus Capitis Bonae Spei fuſcus; Tom. III. p. 78. T. CCCLVIII. Fig. 2.
Regulus Capitis Bonae Spei mas; Tom. III. p. 78. T. CCCLVII. Fig. 2.
Regulus Capitis Bonae Spei pectore rubeſcente; Tom. III. p. 78. T. CCCVIII. Fig. 2.
Regulus Capitis Bonae Spei ſuperne coeruleus; Tom. III. p. 78. T. CCCLIX. Fig. 1.
Regulus cinereus ſive non criſtatus; Tom. IV. p. 33. T. CCCXC. Fig. 1.
Regulus criſtatus, ibid. p. 33. T. CCCXC. Fig. 2.
Regulus non criſtatus maior; Tom. IV. p. 34. T. CCCXCI. Fig. 1.
Rubecula ſive Erithacus; Tom. IV. p. 35. T. CCCXCVI. Fig. 2.
Rubicilla Angolenſis, *Paradiſiaca dicta*; Tom. III. p. 62. T. CCCXXIV. Fig. 1.
Rubicilla Bengalenſis vertice flavo; Tom. III. p. 62. T. CCCXXIII. Fig. 1.
Rubicilla Indica tota ferme rubra; Tom. III. p. 62. T. CCCXXIII. Fig. 2.
Rubicilla ſeu Pyrrhula; Tom. III. p. 61. T. CCCXXI. Fig. 1.
Rubicilla ſeu Pyrrhula foemina; Tom. III. p. 61. T. CCCXXI. Fig. 2.
Rubicilla ſive Pyrrhula alba; Tom. III. p. 62. T. CCCXXII. Fig. 2.
Rubicilla ſive Pyrrhula rubra; Tom. III. p. 62. T. CCCXXII. Fig. 1.
Rubicilla ſive Pyrrhula Africana nigra; ibid. p. 63. n. 12.
——— Americana criſtata; *ibid.* n. 17.
——— Bahamenſis violacea; *ibid.* n. 16.
——— Braſilienſis coerulea; *ibid.* n. 13.

Rubicilla ſive Pyrrhula candida; ibíd. p. 62. num. 9.
———— Carolinenſis caerulea; ibid. p. 63. num. 14.
———— Carolinenſis violacea; ibid. n. 15.
———— Hamburgenſis; ibid. p. 62. num. 10.
———— nigra; ibid. num. 8.
———— nigra Mexicana; ibid. p. 63. num. 11.
Ruticilla; Tom. IV. p. 36. T. CCCXCVIII. Fig. 1.
Rygchopſalia Roſtrum-inſtar-forficum a Gallis dicta; Tom. V. p. 29. T. DXLVIII.
Rygchopſalia; Tom. V. p. 30. num. 2.

S

Saginalis maior; Tom. IV. p. 62. T. CDLV.
Saginalis minor; Tom. IV. p. 62. T. CDLIV.
Scolopax alba; Tom. IV. p. 60. T. CDXLVIII.
Scolopax alba minor Freti Hudſonis; Tom. IV. p. 58. T. CDXLIV.
Scolopax atra; Tom. IV. p. 60. T. CDL.
Scolopax coloribus varia; ibid. p. 60. T. CDXLIX.
Scolopax Gallinago, ſive Ruſticola, maior; Tom. IV. p. 59. T. CDXLVII.
Scolopax minima; Tom. IV. p. 57. T. CDXLIII.
Scolopax, ſive Gallinago, media; Tom. IV. p. 59. T. CDXLVI.
Scolopax, ſive Gallinago, minor; Tom. IV. p. 58. T. CDXLV.
Scolopax Anglica; Tom. IV. p. 60. num. 9.
Scolopax Maderaſpatana; ibid. num. 10.
Scops; Tom. I. p. 86. num. 3.
Serinus Canarius; Tom. IV. p. 17. T. CCCLXII. Fig. 1.
Serinus Angolenſis; ibid. p. 19. T. CCCCXIII. Fig. 2.
Serinus ſeu Canarius hybridus; Tom. IV. p. 18. T. CCCLXIII. Fig. 1.
Serinus, ſeu Canarius Ilvenſis, Tom. IV. p. 18. T. CCCLXII. Fig. 2.
Sicta, ſeu Picus Canadenſis; Tom. II. p. 54. T. CXCIII. Fig. 2.
Sicta, ſive Picus minimus caeruleus Ceylanenſis; Tom. II. p. 55. T. CXCIV. Fig. 1.
Sicta, ſive Picus minimus Indicus; Tom. II. p. 55. T. CXCIV. Fig. 2.
Sicta, vel Picus minor cinereus; Tom. II. p. 54. T. CXCIII. Fig. 1.
Sicta, vel Picus minor Iamaicenſis; Tom. II. p. 55. num. 5.
—— Carolinenſis; ibid. num. 6.
———————— minor; ibid. num. 7.
Spinus; Tom. IV. p. 16. T. CCCLXI. Fig. 1.
Spipola; Tom. IV. p. 32. T. CCCLXXXVII. Fig. 2.
Spipola maior; ibip. p. 32. T. CCCLXXXIX. Fig. 1.
Spipola paluſtris; Tom. IV. p. 32. T. CCCLXXXVIII. Fig. 1.
Spipola altera ſeu potius Motacillae ſpecies; Tom. IV. p. 32. T. CCCLXXXVIII. Fig. 2.
Spipola Turdina; Tom. IV. p. 32. T. CCCLXXXVII. Fig. 1.
Stercorarius longicaudus, alias Avis Arctica dictus; Tom. V. p. 26. T. DXXXIX.
Stercorarius fuſcus; Tom. V. p. 26. num. 2.
———————— ſtriatus; ibid. num. 3.
Sterna cinerea; Tom. V. p. 27. T. DXLII.
Sterna cinerea atricapilla; Tom. V. p. 27. T. DXLIII.
Sterna maior; Tom. V. p. 26. T. DXL.
Sterna media roſtro, pedibus, & occipite nigro; Tom. V. p. 28. T. DXLV.
Sterna minor; Tom. V. p. 27. T. DXLI.
Sterna nigra; Tom. V. p. 28. T. DXLIV.
Sterna, vulgo in Etruria *Petto bianco* dicta; Tom. V. p. 28. T. DXLVI.
Sterna Dominicenſis fuſca; Tom. V. p. 28. num. 9.
—— nacvia; ibid. num. 8.
Strix Aluco; Tom. I. p. 90. T. XCIV.
Strix Americana; Tom. I. p. 91. T. XCVIII.
Strix Falco Noctuaeformis dicta; ibid. p. 90. T. XCVII.
Strix rufa; Tom. I. p. 90. T. XCVI.
Strix ſtridula; Tom. I. p. 90. T. XCV.
Strix Aldrovandi; Tom. I. p. 91 num. 9.
—— Canadenſis; ibid. num. 6.
—— Mexicana; ibid. num. 7.
—— Vulturina; ibid. num. 8.
Struthio Camelus griſeus; ibid. p. 30. T. CXXXVIII.
Struthio niger; Tom. II. p. 29. T. CXXXVII.
Struthio pennis candidiſſimis lanuginoſis; Tom. II. p. 31. T. CXXXIX.
Struthio Camelus Americanus; Tom. II. p. 32. num. 4.
———— cucullatus; ibid. num. 5.
Sturnus; Tom. III. p. 58. T. CCCXV.
Sturnus Ceylanicus; ibid. p. 60. T. CCCXVIII. Fig. 2.
Sturnus colore terreo; ibid. p. 59. T. CCCVII.
Sturnus Indicus maior, vulgo Mino; Tom. III. p. 60. CCCXIX.
Sturnus Indicus minor, vulgo Mino; Tom. III. p. 60. T. CCCXVIII. Fig. 1.
Sturnus luteus Indicus; Tom. III. p. 60. T. CCCXX.
Sturnus roſeus, ſive marinus; ibid. p. 59. T. CCCXVI.
Sturnus albus; Tom. III. p. 60. num. 9.
———— capite albo; ibid. p. 61. num. 11.
———— Capitis Bonae Spei; ibid. num. 13.
———— cinereus; ibid num. 12.
———— ex albo & nigro varius; ibid. num. 10.
———— Ludovicianus; ibid. num. 15.
———— novae Hiſpaniae; ibid. num. 14.
Sula, aliis Anſer Baſſanus; Tom. V. p. 17. T. DXV.
Sula; Tom. V. p. 17. num. 2.
—— alba; ibid. num. 5.
—— fuſca; ibid. num. 4.
—— maior; ibid. num. 3.

T

Tetrao, ſive Urogallus minor, foemina; Tom. II. p. 82. T. CCXXXIV.
Tetrao, ſive Urogallus minor alter; Tom. II. p. 83. T. CCXXXV.
Torquilla; Tom. II. p. 52. T. CLXXXVI.
Tringa; Tom. IV. p. 62. T. CDLVII.
Tringa, Gambetta Italis dicta; ibid. p. 65. T. CDLXIII.
Tringa, Gambetta Italis, foemina; Tom. IV. p. 66. T. CDLXIV.
Tringa Totanus albus Freti Hudſonis; Tom. IV. p. 67. num. 12.
———————— Bengalenſis; ibid. num. 13.
———————— cinereus; ibid. num. 11.
———————— nacvius; ibid. p. 66. num. 10.
———————— ruber; ibid. num. 8.
———————— ſtriatus; ibid. num. 9.
Tringa Cinclus; Tom. IV. p. 60. T. CDLI.
Tringa minor in Etruria *Gambecchio*, vel *Culetto* dictus; Tom. IV. p. 61. T. CDLII.
———————— Dominicenſis; Tom. IV. p. 61. num. 4.
———————— minor; ibid. num. 5.

Tringa Cinelus torquatus; ibid. p. 61. num. 3.
Troglodytes, ſive Paſſer ſopium; Tom. IV. p. 32. T. CCCLXXXIX. Fig. 2.
Trogon Braſilienſis viridis; Tom. II. p. 53. T. CLXXXVII.
Trogon Cayanenſis cinereus; Tom. II. p. 53. T. CLXXXVIII.
Trogon Cayanenſis viridis; ibid. p. 53. T. CLXXXIX.
Trogon Cayanenſis viridis, ventre candido; Tom. II. p. 53. num. 4.
——— Mexicanus; ibid. num. 5.
——————— variegatus; ibid. num. 6.
Tucana Aracari Braſilienſibus; Tom. II. p. 61. T. CCIV.
Tucana Piperivora; Tom. II p. 61. T. CCIII.
Tucana; Tom. II. p. 62. num. 3.
——— Braſilienſis gutture & collo inferiore candidus; ibid. num. 4.
——— caerulea; ibid. num. 12.
——— Cayanenſis; ibid. num. 5.
——————— gutture luteo; ibid. num. 9.
——————— torquata; ibid. num. 10.
——————— torquata altera; ibid. num. 8.
——— lutea; ibid. p. 63. num. 11.
——— Mexicana torquata; ibid. p. 62. num. 6.
——— Mexicana viridis; ibid. num. 7.
Turdus; Tom. III. p. 41. T. CCXC.
Turdus albus; Tom. III. p. 42. T. CCXCII.
Turdus Americanus, Avis polyglotta dictus; Tom. III. p. 45. T. CCXCVIII.
Turdus flaveſcens; Tom. III. p. 42. T. CCXCI.
Turdus minor; Tom. III. p. 43. T. CCXCIII.
Turdus ſaxatilis univerſim variegatus; Tom. III. p. 45. T. CCXCVII.
Turdus ſive Merula ſaxatilis; Tom. III. p. 44. T. CCXCVI.
Turdus viſcivorus, vel maior; ibid. p. 43. T. CCXCIV.
Turdi viſcivori maioris alia ſpecies; Tom. III. p. 44. T. CCXCV.
Turdus Americanus canorus, ſive polyglottus; Tom. III. p. 50. num. 38.
——— Americanus polyglottus; ibid. num. 37.
——— arundinaceus; ibid. p. 49. num. 24.
——— Bengalenſis; ibid. p. 50. num. 35.
——— criſtatus; ibid. p. 49. num. 19.
——— fuſcus Iamaicenſis; ibid. p. 51. num. 40.
——— maior Carolinenſis; ibid. p. 49 num. 21.
——— medius; ibid. num. 18.
——— minor Carolinenſis; ibid. num. 20.
——— Muſicus Canadenſis; ibid. num. 25.
——— torquatus Americanus; ibid. p. 50. num. 28.
——— variegatus capite cyaneo; ibid. num. 27.
——— viſcivorus maior capite albo; ibid. p. 49 n. 22.
——— viſcivorus maior maculis lunatis notatus; ibid. num. 23.
Turdus ſive Merula Amboinenſis canora; ibid. p. 50. num. 29.
——————— Americana; ibid. p. 52. num. 56.
——————— Angolenſis; ibid. num. 57.
——————— Borbonica; ibid. p. 51. num. 47.
——————— calva Philippenſis; ibid. num. 42.
——————— Canadenſis; ibid. p. 50. num. 30.
——————— Capitis Bonae Spei; ibid. p. 52. num. 51.
——————— Capitis Bonae Spei atricapilla; ibid. p. 52. num. 53.
——————— Capitis Bonae Spei torquata; ibid. num. 52.
——————— cinerea Americana; ibid. p. 51. num. 45.
Turdus ſive Merula cinerea Madagaſcarienſis; ibid. num. 46.
——————— criſtata Capitis Bonae Spei; ibid. p. 50. num. 33.
——————— Dominicenſis; ibid. p. 51. num. 43.
——————— fuſca Capitis Bonae Spei; ibid. p. 50. num. 34.
——————— Indica; ibid. num. 32.
——————— Indica cinerea; ibid. p. 51. n. 34.
——————— Madagaſcarienſis; ibid. num. 39.
——————— Madagaſcarienſis aurea; ibid. p. 50. num. 31.
——————— montana; ibid. p. 49. num. 26.
——————— olivacea Capitis Bonae Spei; ibid. p. 51. num. 48.
——————— olivacea Dominicenſis; ibid. n. 49.
——————— olivacea Indica; ibid. num. 50.
——————— Palmarum; ibid. p. 52. num. 54.
——————— Palmarum atricapilla; ibid. n. 55.
——————— Philippenſis; ibid. p. 51. num. 41.
——————— Senegalenſis; ibid. p. 50. num. 36.
——————— Surinamenſis; ibid. p. 52. num. 62.
——————— viridis Carolinenſis; ibid. num. 59.
——————— viridis longicauda Senegalenſis; ibid. num. 58.
——————— viridis Molucceana; ibid. num. 60.
——————— viridis Molucceana atricapilla; ibid. num. 61.
Turtur; Tom. III. p. 40. T. CCLXXXIX.
Turtur Indicus; Tom. III. p. 39. T. CCLXXXVII.
Turtur ſylveſtris minor; ibid. p. 39. T. CCLXXXVIII.
Turtur Amboinenſis; Tom. III. p. 41. num. 18.
——— Americanus; ibid. p. 40. num. 7.
——— Canadenſis; ibid. p. 41. num. 13.
——— candidus; ibid. p. 40. num. 4.
——— Capitis Bonae Spei; ibid. p. 41. num. 14.
——— Carolinenſis; ibid. num. 10.
——— Indicus ſtriatus; ibid. num. 9.
——— Luſitanus; ibid. p. 40. num. 6.
——— mixtus, ſive hibridus; ibid. num. 5.
——— parvus Americanus; ibid. p. 41. num. 11.
——— parvus fuſcus Americanus; ibid. num. 12.
——— Senegalenſis; ibid. num. 15.
——— Senegalenſis in gutture maculatus; ibid. num. 17.
——— Senegalenſis torquatus; ibid. num. 16.
——— Sinenſis ſtriatus; ibid. p. 40. num. 8.

U

Upupa; Tom. II. p. 63. T. CCV.
Upupa Americana lutea; Tom. II. p. 64. CCVI.
Upupa Eremita viridis; Tom. II. p. 65. num. 4.
——— Paradiſea; ibid. num. 3.
——— Pyrrhocorax atra; ibid. num. 5.
Urogallus ſive Tetrao maior foemina; Tom. II. p. 83. T. CCXXXVII.
Urogallus ſive Tetrao maior mas; Tom. II. p. 83. T. CCXXXVI.
Urogallus minor cauda longiore Canadenſis; ibid. p. 84. num. 7.
——————— punctatus; ibid. num. 6.
Uria maior; Tom. V. p. 30. T. DXLIX.
Uria minor; Tom. V. p. 30. T. DL.

Uria minor, Columba Groenlandica vulgo dicta; Tom. V. p. 31. num. 3.
——— ſtriata; ibid. num. 4.

V

Vannellus, ſive Capella Avis; Tom. IV. p. 71. T. CDLXXIX.
Vannellus Ludovicianus armatus; Tom. IV. p. 71. T. CDLXXX.
Vannellus Bononienſis maior; Tom. IV. p. 71. num. 6.
——— cinereus; ibid. num. 3.
——— Dominicenſis armatus; ibid. p. 72. num. 8.
——— Helveticus; ibid. p. 71. num. 5.
——— Senegalenſis armatus; ibid. p. 72. num. 7.
——— varius; ibid. p. 71. num. 4.
Vidua Africana; Tom. III. p. 74. T. CCCXLVII.
Vidua Americana; Tom. III. p. 73. T. CCCXLVI.
Vidua Braſilienſis; Tom. III. p. 73. T. CCCXLV.
Vulpanſer, Ornithologis Tadorna; Tom. V. p. 45. T. DLXXVI.
Vultur Aquilinus cinereus; Tom. I. p. 45. T. XIV.
Vultur Aquilinus fuſcus; Tom. I. p. 47. T. XV.
Vultur barbatus Africanus; Tom. I. p. 44. T. XI.
Vultur Braſilienſis; Tom. I. p. 45. T. XIII.
Vultur fulvus; Tom. I. p. 43. T. X.
Vultur Indicus; Tom. I. p. 44. T. XII.
Vultur niger, ſive Leporarius; Tom. I. p. 42. T. IX.
Vultur alter vulgaris; Tom. I. p. 48. num. 8.
——— Aegyptiacus; ibid. num. 11.
——— alpinus; ibid. num. 14.
——— Arabicus; ibid. p. 49. num. 18.
——— Arpia; ibid. num. 17.
——— Boeticus ſive caſtaneus; ibid. p. 48. num. 9.
——— criſtatus; ibid. num. 12.
——— fuſcus; ibid. num. 10.
——— Hiſpanicus *Candor* dictus; ibid. p. 49. num. 16.
——— Leucocephalus; ibid. num. 15.
——— niger; ibid. p. 48. num. 13.

TAVOLA

TAVOLA ALFABETICA

DI QUEI GENERI, DI QUELLE SPECIE, E DI QUELLE VARIETA' DI UCCELLI STATI RAPPRESENTATI, O DESCRITTI, O SOLTANTO NOMINATI IN QUESTA ORNITOLOGIA CON DENOMINAZIONE FRANCESE.

A

Aigle ; Tom. I. p. 35. T. I.
Aigle à la queve blanche ; Tom. I. p. 40. T. VII.
Aigle à tête blanche ; Tom. I. p. 40. T. VIII.
Aigle marine ; Tom. I. p. 64. T. XL.
Aigle noir ; Tom. I. p. 37. T. III.
Aigrette ; Tom. IV. p. 47. T. CDXXIII.
Albatros ; Tom. V. p. 31. T. DLII.
Alovette ; Tom. IV. p. 24. T. CCCLXXV. Fig. 1.
Alovette de Buiſſon ; Tom. IV. p. 32. T. CCCLXXXVII. Fig. 2.
Alovette de champ ; Tom. IV. p. 23. T. CCCLXXII. Fig. 1.
Alovette-de-mer ; Tom. IV. p. 61. T. CDLI.
Alovette de prez ; Tom. IV. p. 23. T. CCCLXXII. Fig. 2.
Alovette hupée ; Tom. IV. p. 24. T. CCCLXXIV. Fig. 1.
Ara bleu & jaune du Bréſil ; Tom. I. p. 94. T. CIII.
Ara vert du Bréſil ; Tom. I. p. 92. T. CI.
Autour ; Tom. I. p. 54. T. XXI.
Autruche noir ; Tom. II. p. 29. T. CXXXVII.
Avocette ; Tom. V. p. 8. T. CDLXXXXV.

B

Barbú ; Tom. II. p. 51. T. CLXXXII.
Barbú de Cajenne ; Tom. II. p. 51. T. CLXXXIII. Fig. 1.
Barge ; Tom. IV. p. 64. T. CDLXII.
Barge brune ; Tom. IV. p. 63. T. CDLX.
Becaſſe ; Tom. IV. p. 59. T. CDXLVII.
Becaſſe blanche ; Tom. IV. p. 60. T. CDXLVIII.
Beccaſſeau, appellé vulgairement Cul-blanc. Tom. IV. p. 62. T. CDLVII.
Beccaſſine ; Tom. IV. p. 58. T. CDXLV. = p. 59. T. CDXLVI.
Beccaſſine blanche ; Tom. IV. p. 58. T. CDXLIV.
Bec-croiſé ; Tom. III. p. 63. T. CCCXXIV.
Bec-en-ciſeaux ; Tom. V. p. 29. T. DXLVIII.
Becfigue ; Tom. IV. p. 34. T. CCCXCIII. Fig. 1.
Bergeronette griſe ; Tom. IV. p. 30. T. CCCLXXXIV. Fig. 2.
Bergeronette jaune ; Tom. IV. p. 31. T. CCCLXXXVI. Fig. 2.
Bergeronette du printemps ; ibid. p. 31. T. CCCLXXXV. Fig. 2.
Bhioreau ; Tom. IV. p. 47. T. CDXXII.
Biſet, Ramier ; Tom. III. p. 30. T. CCLXXI.
Boule de Gaux ; Tom. II. p. 66. T. CCIX.
Bout de Petun ; Tom. II. p. 53. T. CXC.
Bruant ; Tom. III. p. 74. T. CCCLXVIII. Fig. 1.
Bruant de prez ; Tom. III. p. 74. T. CCCXLIX. Fig. 1.
Bruant de Haye ; Tom. III. p. 74. T. CCCL. Fig. 2.
Butor ; Tom. IV. p. 49. T. CDXXXII.

C

Caille ; Tom. III. p. 14. T. CCXLIII.
Caille femelle ; Tom. III. p. 15. T. CCXLIV.
Caille hupée du Mexique ; Tom. III. p. 16. T. CCXLVI.
Canard a bec courbé ; Tom. V. p. 41. T. DLXV.
Canard a collier de Terre-neuve ; Tom. V. p. 46. T. DLXXX.
Canard a longue queve, ou Coq de mer ; Tom. V. p. 47. T. DLXXXI.
Canard d'été ; Tom. V. p. 46. T. DLXXIX.
Canard d'Hyver ; Tom. V. p. 46. T. DLXXVII.
Canard domeſtique ; Tom. V. p. 42. T. DLXIII.
Canard muſqué ; Tom. V. p. 42. T. DLXVIII.
Canard ſauvage ; Tom. V. p. 43. T. DLXX.
Canard Siffleur ; Tom. V. p. 48. T. DLXXXV.
Canard Sifflеur d' Amérique ; Tom. V. p. 49. T. DLXXXVIII.
Canard ſiffleur hupé ; Tom. V. p. 49. T. DLXXXVII.
Caſoar ; Tom. II. p. 28. T. CXXXVI.
Caſſenoix ; Tom. II. p. 44. T. CLXIII.
Chapon de Pharaon ; Tom. I. p. 45. T. XIV.
Chardonneret ; Tom. III. p. 76. T. CCCLIII. Fig. 1.
Chardonneret blanc ; Tom. III. p. 76. T. CCCLIV. Fig. 2.
Chardonneret blanchâtre ; Tom. III. p. 76. T. CCCLIV. Fig. 1.
Chardonneret d'Amerique ; Tom. III. p. 76. T. CCCLV. Fig. 1.
Chathuant de Canada ; Tom. I. p. 88. T. XC.
Chevalier ; Tom. IV. p. 65. T. CDLXIII.
Chipeau, Tom. V. p. 45. T. DLXXIV.
Chirurgien varié ; Tom. V. p. 2. T. CDLXXXIII.

Choucas; Tom. II. p. 35. T. CXLVI.
Choucas du Cap de Bonne Eſpérance; Tom. II. p. 36. T. CXLVII.
Choucas des Philippines; Tom. II. p. 40. T. CLIV.
Chovette; Tom. I. p. 87. T. LXXXVI.
Cigogne blanche; Tom. IV. p. 51. T. CDXXXIV.
Cigogne brune; Tom. IV. p. 51. T. CDXXXIII.
Cul-blanc; Tom. IV. p. 30. T. CCCLXXXIII. Fig. 2.
Colibry du Mexique; Tom. IV. p. 40. T. CDIV. Fig. 3.
Colibry rouge a longe queve du Surinam; Tom. IV. p. 40. T. CDV. Fig. 2.
Combattant, ou Paon-de-mer; Tom. V. p. 4. T. CDLXXXVIII.
Coracias; Choucas; Choquar; Chovette rouge; Tom. II. p. 37. T. CXLIX.
Corbeau; Tom. II. p. 32. T. CXL.
Corbeau blanc; Tom. II. p. 32. T. CXLI.
Cormoran; Tom. V. p. 13. T. DI.
Cornette; Tom. II. p. 34. T. CXLIV.
Corneille moiſſonneuſe; Tom. II. p. 35. T. CXLV.
Crabier jaune; Tom. IV. p. 46. T. CDXVIII.
Creſſerelle; Tom. I. p. 66. T. XLIX.
Coq. Tom. II. p. 65. T. CCVII.
Coq de Bruyeres, & Faiſan bruyant; Tom. II. p. 83. T. CCXXXVI.
Coq de Bruyeres a queve fourchue; Tom. II. p. 82. T. CCXXXIII.
Coq de Bruyeres femelle; Tom. II. p. 82. T. CCXXXIV.
Coq de marais; Tom. II. p. 84. T. CCXXXVIII.
Coq de Roche; Tom. II. p. 64. T. CCVI.
Coq frizé; Tom. II. p. 71. T. CCXV.
Coq nain; Tom. II. p. 70. T. CCXIV.
Coq patu; Tom. II. p. 68. T. CCXII.
Coucou; Tom. I. p. 80. T. LXVII.
Coucou bleu de la Chine; Tom. I. p. 83. T. LXXX.
Coucou bleu de Madagaſcar; Tom. I. p. 83. T. LXXVIII.
Coucou d'Andaluſie; Tom. I. p. 81. T. LXX.
Coucou de la Tartarique; Tom. I. p. 83. T. LXXIX.
Coucou huppé de Coromandel; Tom. I. p. 82. T. LXXIV.
Coucou huppé de Madagaſcar; Tom. I. p. 82. T. LXXIII.
Coucou noir de Bengale; Tom. I. p. 82. T. LXXII.
Coucou tacheté de Mindanao; Tom. I. p. 82. T. LXXI.
Coucou verd huppé de Siam; Tom. I. p. 82. T. LXXV.
Courly; Tom. IV. p. 56. T. CDXL.
Coucou cendré de Cayenne; Tom. II. p. 53. T. CLXXXVIII.
Coucou verd de Cayenne; Tom. II. p. 53. T. CLXXXIX.
Coucou verd du Brêſil; Tom. II. p. 53. T. CLXXXVII.
Cygne; Tom. V. p. 33. T. DLIII.
Cygne ſauvage; Tom. V. p. 34. T. DLIV.

D

Demoiſelle de Numidie; Tom. IV. p. 53. T. CDXXXV.
Dindon du Bréſil; Tom. II. p. 77. T. CCXXVII.
Dindon huppé; Tom. II. p. 75. T. CCXXII.

E

Echaſſe; ou Grand Chevalier d'Italie; Tom. IV. p. 67. T. CDLXX.
Ecorcheur à tête rouge; Tom. I. p. 74. T. LVI.
Ecorcheur de Madagaſcar; Tom. I. p. 75. T. LX, Fig. 2.
Ecorcheur varié; Tom. I. p. 74. T. LV. Fig. 2.
Epervier des Alouettes; Tom. I. p. 53. T. XX.
Epervier, ou Moucher; Tom. I. p. 49. T. XVI.
Epervier petit; Tom. I. p. 51. T. XVII.
Emerillon, ou l'Emerillon; Tom. I. p. 51. T. XVIII.
Etourneau; Tom. Tom. III. p. 58. T. CCCXV.
Etourneau de Bengale; Tom. III. p. 60. T. CCCXX.

F

Faiſan; Tom. III. p. 23. T. CCLVIII.
Faiſan blanc; Tom. III. p. 24. T. CCLIX.
Faiſan blanc de la Chine; Tom. III. p. 25. T. CCLXI.
Faiſan cornu de Bengale; Tom. III. p. 25. T. CCLXIII.
Faiſan rouge de la Chine; Tom. III. p. 24. T. CCLX.
Farlouſe blanche; Tom. IV. p. 24. T. CCCLXXIII. Fig. 1.
Faucon a collier; Tom. I. p. 61. T. XXXI.
Faucon a queve annelee; Tom. I. p. 66. T. XLIV. Fig. 2.
Faucon a tête blanche; Tom. I. p. 61. T. XXXIII.
Faucon blanche; Tom. I. p. 61. T. XXXV.
Faucon Chovette; Tom. I. p. 90. T. LXXVII.
Faucon gentil; Tom. I. p. 50. T. XXIX.
Faucon Hagard; Tom. I. p. 61. T. XXXIV.
Faucon pelerin; Tom. I. p. 56. T. XXIII.
Faucon Tartarot ou de Barbarie; Tom. I. p. 56. T. XXV.
Faucon Tunicien; Tom. I. p. 58. T. XXVII.
Fauvette; Tom. IV. p. 35. T. CCCXCI. Fig. 1.
Fauvette a Teſte Noire; Tom. IV. p. 35. T. CCCXCVIII. Fig. 2.
Fauvette Babillarde; Tom. IV. p. 34. T. CCCXCII. Fig. 1.
Fauvette de Haye; Tom. IV. p. 33. T. CCCXCI. Fig. 2.
Feu en cul, ou Oiſeau du Tropic; Tom. V. p. 17. T. DXVI.
Flamant; Tom. V. p. 9. T. CDLXXXVI.
Fou de Bafan; Tom. V. p. 17. T. DXV.
Foulque, ou Morelle; Tom. V. p. 20. T. DXXV.
Francolin; Tom. III. p. 13. T. CCXLI.

G

Garrot; Tom. V. p. 50. T. DXCIII.
Gelinote; Tom. II. p. 85. T. CCXXXIX.
Gelinote blanche: Tom. II. p. 85. T. CCXL.
Gerfault; Tom. I. p. 60. T. XXX.
Goiland gris, Tom. V. p. 23. T. DXXXIII.

Goiland noir, Tom. V. p. 23. T. DXXXII.
Goiland varie, ou le Grifard; Tom. V. p. 23. T. DXXXIV.
Grand Aigle Royal; Tom. I. p. 36. T. II.
Grand Barge rife; Tom. IV. p. 64. T. CDLXI.
Grand Bout de Fetun; Tom. II. p. 54. T. CXCI.
Grand Duc, Tom. I. p. 84. T. LXXXI.
Grand Duc d'Italie; Tom. I. p 85. T. LXXXII.
Grand Duc de Virginie; Tom. I. p. 86 T. LXXXIV.
Grand Hibou blanc; Tom. I. p. 90. T. XCIII.
Grand Hirondelle d'Eſpagne; Tom, IV. p. 43. T. CDXIII.
Grand Linotte; Tom. III. p. 77. T. CDLVII. Fig. 1.
Grand Mainate; Tom. III. p 60. T. CCCXIX.
Grand Perroquet vert des Indes Occidentales; Tom. I. p. 96. T. CXV.
Grand Perroquet vert du Breſil; Tom. I. p. 96. T. CXVI.
Grand Pie-Griefche verte; Tom. I. p. 75. T. LIX. Fig. 2.
Grand Pingoin; Tom. V, p. 10, T. CDLXXXXVII.
Grand Pic varié; Tom. II. p. 47. T. CLXVII.
Grand Pic varié du Mexique; Tom. II. p. 50. T. CLXXVIII.
Grand Plongeon; Tom. V. p. 13. T. DV.
Grand Plongeon tacheté; Tom. V. p. 14. T. DVII.
Grand Pluvier appellé vulgairement Courly de terre; Tom. IV. p. 68. T. CDLXXII.
Grand Traquet; Tom. IV. p. 39. T. CCCLXXXI. Fig. 2.
Grand Veuve; Tom. III. p. 73. T. CCCXLVI.
Grande Foulque, ou la Macroule, ou Diable de mer; Tom. V. p 20. T. DXXIV.
Grande Hirondelle-de-mer; Tom. V. p. 26. T. DXL.
Grande Monette cendree; Tom. V. p. 23. T. DXXXI.
Grebe a oreilles; Tom. V. p. 19. T. DXX.
Grebe hupée, Tom. V. p. 19. T DXXI.
Grimpereau; Tom. II. p. 55. T. CXCV. Fig. 1.
Grimpereau a longue queve du Cap de Bonne Eſpérance; Tom. II. p. 58. T. CCI. Fig. 1.
Grimpereau a longue queve du Senegal; Tom. II. p. 59. T. CCI. Fig. 2.
Grimpereau bleu de Cayenne, ou du Surinam; Tom. II. p. 56. T. CXCVI. Fig. 2.
Grimpereau de Bengale; Tom. II. p. 57. T. CXCVIII. Fig. 1.
Grimpereau de muraille, ou Pic de muraille, Tom. II. p. 56. T. CXCVII.
Grimpereau des Indes; Tom. II. p. 56. T. CXCV. Fig. 2.
Grimpereau noir; Tom. II. p. 49. T. CLXXII.
Grimpereau noir & jaune; Tom. II. p. 57. T. CXCVIII. Fig. 2.
Grimpereau noiraſtre du Breſil; Tom. II. p. 59. T. CCII. Fig. 1.
Grimpereau pourpré de Virginie; Tom. II. p. 59. T. CCII. Fig. 2.
Grimpereau pourpré des Philippines; Tom. II. p. 58. T. CC. Fig. 1. & 2.
Grimpereau violet du Senegal; Tom. II. p. 58. T. CXCIX. Fig. 2.
Grive blanche; Tom. III. p. 42. T. CCXCII.
Gros-Bec; Tom. III. p. 64. T. CCCXXV.
Gros-Bec bleu d'Angola; Tom. III. p. 67. T. CCCXXX.
Gros-Bec de la Chine; Tom. III. p. 65. T. CCCXXVII. Fig. 1.
Gros-Bec de la Chine; Tom. III. p. 65. T. CCCXXVIII. Fig. 1.
Gros-Bec de Virginie dit vulgairement le Cardinal hupé; Tom. III. p. 66. T. CCCXXIX.
Gros-Bec du Mexique; Tom. III. p. 69. T. CCCXXXV. Fig. 2.
Gros-Bec tacheté de Iava; Tam. III. p. 66. T CCCXXVIII. Fig. 2.
Groſſe Grive; Tom. III. p. 43, T. CCXCIV.
Groſſe Meſange bleve; Tom. IV. p. 27. T. CCCLXXVIII. Fig. 2.
Groſſe Meſange ou le Charbonniere; Tom. IV. p. 27. T. CCCLXXVII. Fig. 2.
Grue; Tom. IV. p. 44. T. CDXV.
Grue de la Baye d'Hudſon; Tom. IV. p. 45. T. CDXVI.
Grue des Indes Orientales; Tom. IV. p. 45. T. CDXVII.
Gueſpier; Tom. V. p. 7. T. CDLXXXXIV.
Guillemot; Tom. V. p. 30. T. DXLIX.

H

Harle; Tom. V. p. 15. T. DVIII.
Harle blanc & noir; Tom. V. p. 16. T. DXII.
Hale hupé; Tom. V. p. 15. T. DIX.
Héron; Tom. IV. p. 46. T. CDXXI.
Héron blanche; Tom. IV. p. 48. T. CDXXV.
Héron hupé; Tom. IV. p. 48. T. CDXXVIII.
Héron pourpré; Tom. IV. p. 48. T. CDXXVII.
Hirondelle blanche; Tom. IV. p. 42. T. CDX. Fig. 2.
Hirondelle de rivage; Tom. IV. p. 41. T. CDVIII. Fig. 1.
Hirondelle de rivage de la Cochinchine; Tom. IV. p. 42 T. CDXI. Fig. 1.
Hirondelle-de-mer a tête noire, ou le Gachet; Tom. V. p. 27. T. DXLIII.
Hirondelle-de-mer cendrée; Tom, V. p. 27. T. DXLII.
Hirondelle-de-mer noire; ou l'Epouvantail; Tom. V. p. 28. T. DXLIV.
Hocco de la Guiane; Tom. II. p. 78. T. CCXXVIII.
Huitrier, appellé vulgairement Pie de Mer; Tom. IV. p. 68. T. CDLXXI.
Hupe; Tom. II. p. 63. T. CCV.

I

Iacamar; Tom. II. p. 52. T. CLXXXIV.
Iaſeur de Boheme; Tom. II. p. 42. T. CLX.

K

Kakatoes a hupe iaune; Tom. I. p. 96. T. CXVII.
Kakatoes a hupe rouge; Tom. I. p. 96. T. CXVIII.

L

Lanier, ou Lanneret; Tom. I. p. 56. T. XXVI.
Lavandiere; Tom. IV. p. 31. T. CCCLXXXV. Fig. 1.

Linotte de montagne; Tom. III. p. 77. T. CCCLVI. Fig. 1.
Litorne, ou Tordelle; Tom. III. p. 44. T. CCXCV.
Lory à callote noir; Tom. I. p. 94. T. CIV.
Lory des Moluques; Tom. I. p. 94. T. CVI.
Lory des Philippines; Tom. I. p. 94. T. CV.
Loriot; Tom. III. p. 52. T. CCCVII.

M

Macareux, ou Perroquet de mer; Tom. V. p. 31. T. DLI.
Mainate; Tom. III. p. 60. T. CCCXVIII.
Manchot tacheté; Tom. V. p. 11. T. CDLXXXXVIII.
Martin-Pescheur; Tom. V. p. 6. T. CDLXXXXIII.
Martin-Pescheur queüe d'Hirondelle; Tom. II. p. 52. T. CLXXXV.
Martinet; Tom. IV. p. 43. T. CDXII. Fig. 1.
Mauvis; Tom. III. p. 43. T. CCXCIII.
Merle; Tom. III. p. 46. T. CCXCIX.
Merle blanc; Tom. III. p. 47. T. CCCIII.
Merle couleur de rose; Tom. III. p. 59. T. CCCXVI.
Merle de roche; Tom. III. p. 44. T. CCXCVI.
Merle varié; Tom. III. p. 47. T. CCCII.
Merle-d'eau; Tom. V. p. 5. T. CDXC.
Mésange a longue queve; Tom. IV. p. 27. T. CCCLXXIX.
Mésange a tête noire; Tom. IV. p. 26. T. CCCLXXVI. Fig. 2.
Mésange Barbue; Tom. IV. p. 21. T. CCCLXIV. Fig. 2.
Mésange bleve; Tom. IV. p. 25. T. CCCLXXVI. Fig. 1.
Mésange cendrée; Tom. IV. p. 26. T. CCCLXXVII. Fig 1.
Mésange de marais; Tom. IV. p. 27. T. CCCLXXVIII. Fig. 1.
Mésange de Pologne, ou le Remiz; Tom. IV. p. 28. T. CCCLXXX.
Milan royal; Tom. I. p. 63. T. XXXIX.
Millouin; Tom. V. p. 47. T. DLXXXIII.
Moineau d'Amerique; Tom. III. p. 73. T. CCCXLII. Fig. 2.
Moineau de bois; Tom. III. p. 73. T. CCCXLI. Fig. 2.
Moineau de campagne; Tom. III. p. 73. T. CCCXLI. Fig. 1.
Moineau d'Esclavonie; Tom. III. p. 73. T. CCCXLII. Fig. 1.
Moineau fou; Tom. III. p. 72. T. CCCXXXIX. Fig. 1.
Moineau franc; Tom. III. p. 72. T. CCCXL. Fig. 2.
Moqueur; Tom. III. p. 45. T. CCXCVIII.
Morillon; Tom. V. p. 49. T. DLXXXIX.
Mouette cendrée tachetée; Tom. V. p. 22. T. DXXIX.
Mouette d'Hyver; Tom. V. p. 23. T. DXXXV.
Mouette rieuse; Tom. V. p. 21. T. DXXVII.
Mouette rieuse a pattes rouges; Tom. V. p. 21. T. DXXVI.
Moyen Duc; Tom. I. p. 86. T. LXXXV.

O

Oiseau blanc, & plus comunement le Bossu; Tom. V. p. 5. T. CDLXXXIX.
Oiseau d'Amadavad; Tom. IV. p. 22. T. CCCLXV. Fig. 1.
Oiseau de Paradis; Tom. I. p. 76. T. LXIII.
Oiseau d'eau des Indes; Tom. V. p. 52. T. DC.
Oiseau rouge de Surinam; Tom. I. p. 74. T. LVIII. Fig. 2.
Oiseau-Mouche; Tom. IV. p. 39. T. CDII. Fig. 1.
Oiseau-Mouche a collier de Surinam; Tom. IV. p. 41. T. CDVI. Fig. 1,
Oiseau-Mouche a gorge rouge de la Caroline; Tom. IV. p. 40. T. CDIV. Fig. 1.
Oiseau-Mouche a poitrine bleve du Surinam; Tom. IV. p. 40. T. CDIII. Fig. 1.
Oiseau-Mouche a queve fourchue de la Iamaique; Tom. IV. p. 41. T. CDVI. Fig. 2.
Oiseau-Mouche du Surinam; Tom. IV. p. 40. T. CDV. Fig. 1.
Oiseau-Mouche hupé; Tom. IV. p. 40. T. CDII. Fig. 2.
Oiseau-Royal; Tom. IV. p. 44. T. CDXIV.
Ortolan de niege; Tom. III. p. 75. T. CCCLII. Fig. 1.
Ortolan de roseaux; Tom. III. p. 70. T. CCCXXXVI.
Ortolan jaune; Tom. III. p. 74. T. CCCLI. Fig. 2.
Outarde; Tom. III. p. 27. T. CCLXV.
Outarde d'Arabie; Tom. III. p. 27. T. CCLXVI.
Oye a duvet, ou l'Eider; Tom. V. p. 39. T. DLXII.
Oye domestique; Tom. V. p. 36. T. DLVIII.
Oye Sauvage; Tom. V. p. 38. T. DLXI.

P

Paon; Tom. II. p. 73. T. CCXVII.
Paon Blanc; Tom. II p. 74. T. CCXVIII.
Paon de la Chine; Tom. II. p. 74. T. CCXIX.
Paon du Tibet; Tom. II. p. 75. T. CCXXI.
Pelican; Tom. V. p. 11. T. CDXCIX.
Pelican brun; Tom. V. p. 12. T. D.
Perdix-de-mer; Tom. V. p. 28. T. DXLVII.
Perdrix grise; Tom. III. p. 18. T. CCXLIX.
Perdrix rouge; Tom. III. p. 20. T. CCLIII.
Perdrix rouge; Tom. III. p. 22. T. CCLVI.
Perdrix rouge de Barberie; Tom. III. p. 22. T. CCLVII.
Perroquet Amazone a gorge bleue; Tom. I. p. 95. T. CIV.
Perroquet à tête de Faucon; Tom. I. p. 96. T. CXX.
Perroquet cendre de Guinée; Tom. I. p. 95. T. CXII
Perroquet d'Amerique; Tom. II. p. 22. T. CXXXV.
Perroquet de Guinée rouge & cendré; Tom. I. p. 95. T. CXIII.
Perroquet de l'Isle de Luçon; Tom. II. p. 21. T. CXXX.
Perroquet ou Perruche a tête bleve; Tom. II. p. 20. T. CXXIX.
Perroquet noir; Tom. II. p. 20. T. CXXVIII.
Perruche a collier; Tom. II. p. 18. T. CXXIII.

Perruche a tête rouge de Gingi; Tom. II. p. 21. T. CXXXII.
Petit Alovette-de-mer; Tom. IV. p. 61. T. CDLII.
Petit Beccaſſine; Tom. IV. p. 57. T. CDXLIII.
Petit Chathuant; Tom. I. p. 88. T. XCI.
Petit Cormoran; Tom. V. p. 13. T. DII.
Petit Courly, ou le Corlieu; Tom. IV. p. 56. T. CDXLI.
Petite Grebe cornue; Tom. V. p. 18. T. DXVII.
Petite Grive; Tom. III. p. 41. T. CCXC.
Petite Outarde; Tom. III. p. 26. T. CCLXIV.
Petite Perroquet verd des Indes Orientales; Tom. II. p. 21. T. CXXXIII.
Petite Perruche des Indes; Tom. II. p. 21. T. CXXXIV.
Petite Perruche hupée du Mexique; Tom. II. p. 21. T. CXXXI.
Petite Pies des Indes; Tom. II. p. 41. T. CLVII.
Petit Faucon Chovette de la Baye d'Hudſon; Tom. I. p. 91. T. XCVIII.
Petit Faucon des Indes Tom. I. p. 66. T. XLIV. Fig. 1.
Petit Grimpereau gris & iaune des Philippines; Tom. II. p. 58. T. CXCIX. Fig. 1.
Petit Guillemot; Tom. V. p. 30. T. DL.
Petit Harle hupé, ou la Piette; Tom. V. p. 16. T. DXIII.
Petit Hirondelle; Tom. IV. p. 42. T. CDVIII. Fig. 2.
Petit Hirondelle-de-mer; Tom. V. p. 27 T. DXLI.
Petit Kakatoes; Tom. I. p. 96. T. CXIX.
Petit Linotte; Tom. III. p. 77. T. CCCLVI. Fig. 2.
Petit Morillon; Tom. V. p. 50. T. DXCI.
Petit Movette cendrée; Tom. V. p. 22. T. DXXX.
Petit Pluvier doré; Tom. IV. p. 69. T. CDLXXIII.
Petit Pluvier, ou le Guignard; Tom. IV. p. 69. T. CDLXXIV.
Petit Poule-Sultane; Tom. V. p. 3. T CDLXXXVI.
Petit Puffin; Tom. V. p. 24. T. DXXXVII.
Petit Raſile d'eau, ou la Marovette; Tom. V. p. 2. T. CDLXXXIV.
Petit Sarcelle; Tom. V. p. 51. T. DXLVIII.
Pétrel; Tom. V. p. 25. T. DXXXVIII.
Phaiſan, ou le Hocco do Corraſſow; Tom. II. p. 79. T. CCXXIX.
Pic a tête rouge de Virginie; Tom. II. p. 50. T. CLXXVI.
Pic du Cap de Bonne Eſpérance; Tom. II. p. 50. T. CLXXV.
Pic verd de Bengalo; Tom. II. p. 50. T. CLXXIX.
Pic verd de Norvege; Tom. II. p. 50. T. CLXXVII.
Pie blanche; Tom. II. p. 41. T. CLVI.
Pie de l'Iſle Papoe; Tom. II. p. 42. T. CLIX.
Pie des Indes; Tom. I. p. 74. T. LVII. Fig. 1.
Pie-Grieſche bleue; Tom. I. p. 75. T. LX. Fig. 1.
Pie-Grieſche griſe; Tom. I. p. 72. T. LIII.
Pie-Grieſche griſe du Senegal; Tom. I. p. 75. T. LXI. Fig. 1.
Pie-Grieſche jaune de Cayenne; Tom. I. p. 74. T. LVIII. Fig. 1.
Pie-Grieſche rouge; Tom. I. p. 75. T. LIX. Fig. 1.
Pie-Grieſche rouge du Senegal; Tom. I. p. 75. T. LXI. Fig. 2.
Pie-Grieſche rouſſe Tom. I. p. 73. T. LV. Fig. 1.
Pie-Grieſche rouſſe de Bengale; Tom. I. p. 74. T. LVII. Fig. 2.
Pie, Iaquette; Dame; Agaſſe; Tom. II. p. 40. T. CLV.
Pie varié; Tom. II. p. 46. T. CLXVI.
Pie verd; Tom. II. p. 45. T. CLXV.
Pigeon a gorge friſée; Tom. III. p. 31. T. CCLXXIV.
Pigeon Cavalier; Tom. III. p. 32. T. CCLXXVII.
Pigeon de Barberie; Tom. III. p. 32. T. CCLXXVI.
Pigeon de Norvégie; Tom. III. p. 35. T. CCLXXXIV.
Pigeon domeſtique; Tom. III. p. 29. T. CCLXX.
Pigeon friſé; Tom. III. p. 34. T. CCLXXXII.
Pigeon nonain; Tom. III. p. 31. T. CCLXXIII.
Pigeon-Paon; Tom. III p. 28, T. CCLXVIII.
Pigeon patu; Tom. III. p. 35. T. CCLXXXIII.
Pigeon ramier; Tom. III. p. 30. T. CCLXXII.
Pigeon Ramain; Tom. III. p. 32. T. CCLXXVIII.
Pinçon; Tom. III. p. 70. T. CCCXXXVII.
Pinçon d'Ardennes; Tom. III. p. 71. T. CCCXXXVIII. Fig. 1.
Pinçon de montagne; Tom. IV. p. 20. T. CCCLXIV. Fig. 1.
Pinçon rouge & bleu du Breſil; Tom. III. p. 73. T. CCCXLIII. Fig. 2.
Pintade; Poule Pintade; Tom. II. p. 80. T. CCXXX.
Pivoine; Tom. III p. 61. T. CCCXXI. Fig. 1.
Pluvier a collier; Tom. IV. p. 70. T. CDLXXVI.
Pluvier a collier de S. Domingue; Tom. IV. p. 70. T. CDLXXVII.
Povillot; Tom. IV. p. 33. T. CCCXC. Fig. 1.
Poule de Limoges, ou de bruyeres; Tom. II. p. 84. T. CCXXXVII.
Poule-Sultane; Tom. V. p. 3. T. CDLXXXV.
Poule, ou Sauci; Tom. IV. p. 33. T. CCCXC. Fig. 2.
Prover; Tom. III. p. 76. T. CCCLII. Fig. 2.
Puffin; Tom. V. p. 24. T. DXXXVI.

R

Raſile d'eau; Tom. V. p. 1. T. CDLXXXI.
Raſle de Geret, ou Roy de Cailles; Tom. III. p. 17. T. CCXLVIII.
Roitelet; Tom. IV. p. 32. T. CCCLXXXIX. Fig. 2.
Rollier; Tom. II. p. 39. T. CLIII.
Rouge-gorge; Tom. IV. p. 35. T. CCCXCVI. Fig. 2.
Rouge-gorge de Bologne; Tom. IV. p. 32. T. CCCLXXXIX. Fig. 1.
Roſſignol; Tom. IV. p 38. T. CD. Fig. 2.
Roſſignol de Muraille; Tom. IV. p. 36. T. CCCXCVII. Fig. 1.
Roy des Oiſeaux de Paradis; Tom. I. p. 79. T. LXVI.

S

Sarcelle, Cercelle; Tom. V. p. 51. T. DXCV.
Sarcelle de la Chine; Tom. V. p. 52. T. DXCIX.
Sacre; Tom. I. p. 58. T. XXVIII.
Serin des Canaries; Tom. IV. p. 17. T CCCLXII. Fig. 1.
Serin d'Italie; Tom. IV. p. 15. T. CCCLXI. Fig. 1.
Serin mulet; Tom. IV. p. 18. T. CCCLXIII. Fig. 1.
Solitaire; Tom. III. p. 54. T. CCCX.
Souchet; Tom. V. p. 45. T. DLXXII.
Spatule; Tom. IV. p. 54. T. CDXXXVII.
Spatule couleur de Roſe; Tom. IV. p. 54. T. CDXXXVIII.
Stercoraire a longue queve; Tom. V. p. 26. T. DXXXIX.

T

TAdornee; Tom. V. p. 45. T. DLXXVI.
Tarin; Tom. IV. p. 16. T. CCCLXI. Fig. 2.
Tette Chévre; Tom. I. p. 91. T. XCIX.
Tette Chévre de Virginie; Tom. I. p. 92. T. C.
Toreol; Tom. II. p. 52. T. CLXXXVI.
Torehepot Grimpereau; Tom. II. p. 54. T. CXCIII. Fig. 1.
Toucan; ou Pie du Breſil; Tom. II. p. 61. T. CCIII.
Toucan verd du Breſil; Tom. II. p. 61. T. CCIV.
Touraco, ou le Coucou verd hupé de Guinée; Tom. I. p. 82. T. LXXIII.
Tourterelle; Tom. III. p. 40. T. CCLXXXIX.
Tourterelle Santage; Tom. III. p. 40. T. CCLXXXVIII.
Traquet; Tom. IV. p. 29. T. CCCLXXXII. Fig. 1.
Troupiale; Tom. II. p. 42. T. CLVIII.

V

VAnneau; Tom. IV. p. 71. T. CDLXXIX.
Vanneau armé de la Loviſiane; Tom. IV. p. 71. T. CDLXXX.
Vautour-Aigle de coleur chatain; Tom. I. p. 47. T. XV.
Vautour barbu; Tom. I. p. 44. T. XI.
Vautour Chaſſeur des Lievres; Tom. I. p. 42. T. IX.
Vautour des Indes; Tom. I. p. 44. T. XII.
Vautour du Bréſil; Tom. I. p. 45. T. XIII.
Vautour fauve; Tom. I. p. 43. T. X.
Verdier; Tom. III. p. 68. T. CCCXXXI. Fig. 1.
Verdier a tête rouge; Tom. III. p. 69. T. CCCXXXIII. Fig. 2.
Verdier de la Loviſiane; Tom. III. p. 73. T. CCCLXIV.
Verdier des Indes; Tom. III. p. 69. T. CCCXXXIII. Fig. 1.
Veuve a longue queve; Tom. III. p. 74. T. CCCXLVII.

INDICE ALFABETICO

DEI NOMI INGLESI DATI DA TAL NAZIONE A DIVERSI UCCELLI DESCRITTI O NOMINATI IN QUESTA ORNITOLOGIA.

A

AMadavad Bird; Tom. IV. p. 22. T. CCCLXV. Fig. 1.
American Wood Duck; Tom. V. p. 46. T. DLXXIX.
Arctick-Bird; Tom. V. p. 26. T. DXXXIX.

B

BAld Buzzard; Tom. I. p. 64. T. XL.
Bald Coot; Tom. V. p. 20. T. DXXIV. and T. DXXV.
Bald Eagle; Tom. I. p. 40. T. VIII.
Barbary Pigeon; Tom. III. p. 32. T. CCLXXVI.
Beard Manica from Iuteland, Bearded Tit-Mouse; Tom. IV. p. 21. T. CCCLXIV. Fig. 2.
Bee-Cater; Tom V. p. 7. T. CDXCIV.
Bird of Paradise; Tom. I. p. 76. T. LXIII.
Bittern; Tom. IV. p. 49. T. CDXXXII.
Blach and yellow Bird; Tom. II. p. 57. T. CXCVIII. Fig. 2.
Black-Bird; Tom. III. p. 46. T. CCXCIX.
Black-Cap, Tom. V. p. 21. T. DXXVI. and Tom. IV. p 27. T. CCCLXXVIII. Fig. 1.
Black capped Lori; Tom. I. p. 94. T. CIV.
Black Eagle; Tom. I. p. 37. T. III.
Black Stork; Tom. IV. p. 51. T. CDXXXIII.
Blak-Cap; Tom. IV. p. 36. T. CCCXCVIII. Fig. 2.
Blak Parrot from Madagascar; Tom. II. p. 20. T. CXXVIII.
Blew-Backt Falcon; Tom. I. p. 55. T. XXIII.
Blew-Titmouse, Tom. IV. p. 25. T. CCCLXXVI. Fig. 1.
Bluand yellow Maccaw; Tom. I p. 94. T. CIII.
Bramble; Tom. III. p. 71. T. CCCXXXVIII Fig 1.
Brasilian Green Maccaw; Tom. I. p. 92. T. CI.
Brown and Ash-Colour'd Crane; Tom. IV. p. 45. T. CDXVI.
Buffel's Head Duck; Tom. V. p. 46. T. DLXXVII.
Bul-Finch; Tom III. p. 61. T. CCCXXI. Fig. 1.
Bunting, Tom. III. p 76. T. CCCLII Fig. 2.
Burrough-Duck; Tom. V. p. 45. T. DLXXVI.
Bustard, or Bistard; Tom. III. p. 27. T. CCLXV.
Butcher-Bird; Tom. I. p. 72. T. LIII.

C

CAnary-Bird; Tom. IV. p. 17. T. CCCLXII. Fig. 1.
Cassoware, or Cassowary; Tom. II. p. 28. T. CXXXVI.
Cepped Wren; Tom. IV. p. 33. T. CCCXC. Fig. 2.
Chaffinch; Tom. III. p. 70. T. CCCXXXVII.
Chesnut Vulture; Tom. I. p. 43. T. X.
China-Pheasant; Tom. III. p. 24. T. CCLX.
Citril; Tom. IV. p. 15 T. CCCLXI. Fig. 1.
Cock of the Wood; Tom. II. p. 83. T. CCXXXVI.
Cok; Tom. II. p. 65. T. CCVII.
Colemouse · Tom. IV. p. 26. T. CCCLXXVI. Fig. 2.
Common Dish-Washer; Tom. IV. p. 31. T. CCCLXXXV. Fig. 1.
Common Heron; Tom. IV. p. 46. T. CDXXI.
Common-Pigeon; Tom. III p. 29 T. CCLXX.
Common sea Mew, or Lesser Grey Gull; Tom. V. p. 23. T DXXXI.
Common Tame Duck; Tom. V. p. 40. T. DLXIII.
Common Teal; Tom. V. p. 51. T. DXCVIII.
Common Wigeon; Tom. V. p. 48. T. DLXXXV.
Common Wild Goose; Tom. V. p. 38. T. DLXI.
Common Wren; Tom. IV. p. 32. T. CCCLXXXIX. Fig. 2.
Cormorant; Tom. V. p. 13. T. DI.
Cornish-Chough; Tom. II. p. 37. T. CXLIX.
Crane; Tom. IV. p. 44. T. CDXV.
Creeper; Tom. II p. 70. T. CCXIV.
Creeper, or Tree-Creeper; Tom. II. p. 55. T. CXCV. Fig. 1.
Crested Heron; Tom. IV. p. 48. T. CDXXVIII.
Crested Lark; Tom. IV. p. 24. T. CCCLXXIV. Fig. 1.
Crested Parrot, or Cockatoo; Tom. I. p. 96. T. CXVII.
Crested Turkey; Tom. II. p. 75. T. CCXXII.
Crow; Tom. II. p. 34. T. CXLIV.
Crowned African Crane; Tom. IV. p. 44. T. CDXIV.
Cross Bill; Tom. III. p. 63. T. CCCXXIV.
Cuckow; Tom. I. p. 80. T. LXVII.
Curacao-Bird; Tom. II. p. 78. T. CCXXVIII.
Curlew; Tom. IV. p. 56. T. CDXL.
Cutbert-Duck; Tom V. p. 39. T. DLXII.
Cut Water; Tom. V. p. 29. T. DXLVIII.

D

DAker-Hen, or Corn-Crek; Tom. III. p. 17. T. CCXLVIII.
Didapper; Tom. V. p. 18. T. DXVII.
Dotterell; Tom. IV. p. 69. T. CDLXXIV.

E

EAgle; Tom. I. p. 35. T. I.
Egret; Tom. IV. p. 47. T. CDXXIII.

F

FAlcon gentle; Tom. I. p. 59. T. XXIX.
Fallow-Smich; Tom. IV. p. 30. T. CCCLXXXIII. Fig. 2.
Fieldefare; Tom. III. p. 44. T. CCXCV.
Flamengo, e Phenicopter; Tom. V. p. 9. T. CDXCVI.
Fooliſch-Sparrow; Tom. III. p. 72. T. CCCXXXIX. Fig. 1.
Francolin; Tom. III. p. 13. T. CCXLI.
French Fleld Duck Little Buſtard; Tom. III. p. 26. T. CCLXIV.
French-Pie Tom. II. p. 46. T. CLXVI.

G

GAdwall; Tom. V. p. 45. T. DLXXIV.
Girardin; Tom. V. p. 2. T. CDLXXXIV.
Goat Sucker; Tom. I. p. 91. T. XCIX.
Goat-head; Tom. IV. p. 64. T. CDLXII.
Gold-Finch; Tom. III. p. 76. T. CCCLIII. Fig. 1.
Gold-Finch American; Tom. III. p. 76. T. CCCLV. Fig. 1.
Golden Cye; Tom. V. p. 50. T. DXCIII.
Golden Eagle; Tom. I. p. 36. T II.
Gooſander; Tom. V. p. 15. T. DVIII.
Goſ-Hawk; Tom. I. p. 54. T. XXI.
Gowri; Tom. III. p. 66. T. CCCXXVIII. Fig. 2.
Great Beakt Pie of Braſil, or Pepper Pie; Tom. II. p. 61. T. CCIII.
Great Black, and White Gull; Tom. V. p. 23. T. DXXXII.
Great Black Bird; Tom. II. p. 53. T. CXC.
Great Black Wood-Pecker; Tom. II. p. 49. T. CLXXII.
Great-Diver; Tom. V. p. 19. T. DXXI.
Great Grey Gull; Tom. V. p. 23. T. DXXXIV.
Great-Hen; Tom. II. p. 82. T. CCXXXIV.
Great Horn Owl; Tom. I. p. 84. T. LXXXI.
Great ſpotted Wood Pecker; Tom. II. p. 47. T. CLXVII.
Great Tit-Mouſe; Tom. IV. p. 27. T. CCCLXXVII. Fig. 2.
Greate-Brombling; Tom. III. p. 75. T. CCCLII. Fig. 1.
Greater Brambling; Tom. IV. p. 20. CCCLXIV. Fig. 1.
Greater Cockatoo; Tom. I. p. 96. T. CXVIII.
Greater Indian Crane; Tom. IV. p. 45. T. CDXVII.
Greater Red-Headed Linnet; Tom. III. p. 77. T. CCCLVII. Fig. 1.
Greater Red Start; Tom. III. p. 44. T. CCXCVI.
Greateſt Diver, or Greateſt Loon; Tom. V. p. 14. T. DVII.
Greenlande Dove; or Sea Turle; Tom. V. p. 30. T. DL.
Green-Finch, Neighing-Bird; Tom. III. p. 68. T. CCCXXXI. Fig. 1.
Green Legged Horſeman; Tom. IV. p. 64. T. CDLXI.
Green-Wood-Spite; Tom. II. p. 45. T. CLXV.
Gros-Beak; Tom. III. p. 64. T. CCCXXV.
Guillam; Tom. V. p. 30. T. DXLIX.
Guinea Parrot; Tom. I. p. 95. T. CXII.

H

HAggard Falcon; Tom. I. p. 61. T. XXXIV.
Hawk Headed Parrot; Tom. I. p. 96. T. CXX.
Hedge-Sparrow; Tom. IV. p. 33. T. CCCXCI. Fig. 2.
Hen-Quail; Tom. III. p. 15. T. CCXLIV
Herring Gull; Tom. V. p. 23. T. DXXXIII.
Heſtrel; Tom. I. p. 66. T. XLIX.
Hobby; Tom. I. p. 53. T. XX.
Honey Thief; Tom. II. p. 56. T. CXCV. Fig. 2.
Hook bill'd Duck; Tom. V. p. 41. T. DLXV.
Hoop; Tom. II. p. 63 T. CCV.
Horn Owl; Tom. I. p. 86. T. LXXXV.
Hortulane yellow; Tom. III. p. 74. T. CCCLI Fig. 2.
Humming-Bird; Tom. IV. p. 39. T. CDII. Fig. 1. and p. 40. T. CDIV. Fig. 1.

I

IAck Daw; Tom. II. p. 35. T. CXLVI.
Iacobine-Pigeon; Tom. III. p. 31. T. CCLXXIII.
Ierſalcon; Tom. I. p. 60. T. XXX.
Indian Stare; Tom. III. p. 60. T. CCCXVIII.
Iud-Cock; or Iack-Snipe; Tom. IV. p. 57. T. CDXLIII.

K

KIng of the Vultures; Tom. I. p. 44. T. XII.
King-Tisher; Tom. V. p. 6. T. CDXCIII.
Kite; Tom. I. p. 63. T. XXXIX.

L

LAnghing Gull; Tom. V. p. 21. T. DXXVII.
Lannar, or Lanneret; Tom. I. p. 56. T. XXVI.

Lapwing'

Lapwing' Plover; Tom. IV. p. 71. T. CDLXXIX.
Large Binana Bird; Tom. II. p. 42. T. CLVIII.
Lark; Tom. IV. p. 24. T. CCCLXXV. Fig. 1.
Leſſer Cormorant; Tom. V. p. 15. T. DIX.
Leſſer green Parrot; Tom. II. p. 22. T. CXXXV.
Leſſer Sea-Swallow; Tom. V. p. 27. T. DXLI.
Leſſer variegated Butcher Bird; T. I. p. 74. T. LV. Fig. 2.
Light Horſemen-Pigeon; Tom. III. p. 32. T. CCLXXVII.
Little red-head Parrakeet; Tom. II. p. 21. T. CXXXIII.
Long-Taild Indian Sparrow; Tom. III. p. 73. T. CCCXLVI.
Long-tail'd-Titmouſe; Tom. IV. p. 27. T. CCCLXXIX
Longlegs; or Red Legged Crane; Tom. IV. p. 67. T. CDLXX.

M

Manks Puffin; Tom. V. p. 24. T. DXXXVI.
Merlin; Tom. I. p. 51. T. XVIII.
Mock-Brid; or Nightingale; Tom. III. p. 45. T. CCXCVIII.
Mountain-Hen; Tom. II. p. 84. T. CCXXXVII.
Mountain-Linnet; Tom. III. p. 77. T. CCCLVI. Fig. 1.
Mountain Titmouſe; Tom. IV. p. 28. T. CCCLXXX.
Muſcovy-Duck; Tom. V. p. 42. T. DLXVIII.

N

Nightingale; Tom. IV. p. 38. T. CD. Fig. 2.
Night-Raven; Tom. IV. p. 47. T. CDXXII.
Northern Penguin; Tom. V. p. 10. T. CDXCVII.
Numidian Crane; Tom. IV. p. 53. T. CDXXXV.
Nut-Breaker; Tom. II. p. 44. T. CLXIII.
Nut-Hatch; Tom. II. p. 54. T. CXCIII. Fig. 1.

O

Old-Man, or Rain Bird; Tom. I. p. 83. T. LXXIX.

P

Partridge; Tom. III. p. 18. T. CCXLIX.
Pea-Cock; Tom. II. p. 73. T. CCXVII.
Pelecane; Tom. V. p. 1 . T. CDXCIX. and p. 12. T. D.
Perroquet Tom. II. p. 18. T. CXXIII.
Pettichaps; Tom. IV. p. 35. T. CCCXCV. Fig. 1.
Petteril; Tom. V. p. 25. T. DXXXVIII.
Pheaſant, Feſan; Tom. III. p. 23. T. CCLVIII.
Pie; or Piaret; or Magpye; Tom. II p. 40. T. CLV.
Pied Black-Bird; Tom. III. p. 47. T. CCCII.
Pintado; Tom. II. p. 80. T. CCXXX.
Pochard; Tom. V. p. 47. T. DLXXXIII.
Puffin, Coulterneb, Tom. V. p. 31. T. DLI.

Q

Quail; Tom. III. p. 14. T. CCXLIII
Quaker, or Broad-tail'd Shaker; Tom. III. p. 28. T. CCLXVIII.

R

Red-Headed Wood-Pecker; Tom. II. p. 50. T. CLXXVI
Red-bill'd Whiſtlin Duck; Tom. V. p. 49. T. DLXXXVIII
Red-Breaſt; Tom. IV. p. 35. T. CCCXCVI. Fig. 2.
Red Game; Tom. II. p. 84. T. CCXXXVIII.
Red hegg's Partridge from Barbary; Tom. III. p. 22. T. CCLVII.
Red leg'd Partridge; Tom. III. p. 20. T. CCLIII.
Red Linnet; Tom. III. p. 77. T. CCCLVI. Fig. 2.
Red-Shank; Tom. IV. p. 65. T. CDLXIII.
Redſtart, or Red-Tail; Tom. IV. p. 36. T. CCCXCVII. Fig. 1.
Reed-Sparrow; Tom. III. p. 70. T. CCCXXXVI.
Ring Dove; Tom. III. p. 30. T. CCLXXII.
Ring Tail; Tom. I. p. 61. T. XXXI.
Rough-Footed-Dove; Tom. III. p. 35. T. CCLXXXIII.
Rough-Footed Swallow; Tom. IV. p. 42. T. CDVIII. Fig. 2.
Runt-Pigeon, Tom. III. p. 32. T. CCLXXVIII.
Ruffe; Tom. V. p. 4. T. CDLXXXVIII.

S

Sacre, or Sicker; Tom. I. p. 58. T. XXVIII.
Sand-Martin; Tom. IV. p. 41. T. CDVIII. Fig. 1.
Saulary; Tom. II. p. 41. T. CLVII.
Scare-Crow, or Black Headed Gull, or Schear Water; Tom. V. p. 28. T. DXLIV.
Scarlet Lory; Tom. I. p. 94. T. CVI.
Scooper; Tom. V. p. 8. T. CDXCV.
Sea Pheaſant; Tom. V. p. 47. T. DLXXXI.
Sea Pie; Tom. IV. p. 68. T. CDLXXI.
Sea Swallow; Tom. V. p. 26. T. DXL.
Secob; Tom. V. p. 22. T. DXXX.
Shag; Tom. V. p. 13. T. DII.
Shoveler; Tom. V. p. 45. T. DLXXII.
Shrive, or Miſſel-Bird; Tom. III p. 43. T. CCXCIV.
Siskin; Tom. IV. p. 16. T. CCCLXI. Fig. 2.
Small Lark, or Pippit; Tom. IV. p. 32. T. CCCLXXXVII. Fig. 2.
Small yellow-Bird; Tom. IV. p. 33. T. CCCXC. Fig. 1.
Snipe; Tom. IV. p. 58. T. CDXLV. and p. 59. T. CDXLVI.
Soland Gooſe; Tom. V. p. 17. T. DXV.
Solitary Sparrow; Tom. III. p. 54. T. CCCX.
Sparrow; Tom. III. p. 72. T. CCCXL. Fig. 2.
Spoon-bill; Tom. IV. p. 54. T. CDXXXVII.
Spoon bill'd Duck; Tom. V. p. 49. T. DLXXXIX.

State;

Stare; Tom. III. p. 58. T. CCCXV.
Stock-Dove; Tom. III. p. 30. T. CCLXXI.
Stone Curlew; Tom. IV. p. 68. T. CDLXXII.
Stone-Smich; Tom. IV. p. 29. T. CCCLXXXI. Fig. 1.
Stork; Tom. IV. p. 51. T. CDXXXIV.
Swift; Tom. IV. p. 43. T. CDXII.

T

THe Swan; Tom. V. p. 33. T. DLIII.
The Barbary Falcon; Tom. I. p. 56. T. XXV.
The Carrion Crow; Tom. I. p. 45. T. XIII.
The Hare-Catching-Valture; Tom. I. p. 42. T. IX.
The Hobby; Tom. I. p. 51. T. XVII.
The White tailed Eagle, Tom. I. p. 40. T. VII.
The Baſtard-Serin; Tom. IV. p. 18. T. CCCLXIII. Fig. 1.
The Bengal Woodpecker; Tom. II. p. 50. T. CLXXIX.
The black Game, or Grouſe called by Turner the more-Hen; Tom. II. p. 82. T. CCXXXIII.
The black Indian; Tom. I. p. 82. T. LXXII.
The blew Groſs-beak of Angola; Tom. III. p. 67. T. CCCXXX.
The blue Kreeper; Tom. II. p. 56. T. CXCVI. Fig. 2.
The Bohemian Gayor Chatterer; Tom. II. p. 42. T. CLX.
The Braſilian Iacupema; Tom. II. p. 77. T. CCXXXVII.
The Chineſe Sparrow; Tom. III. p. 65. T. CCCXXVII. Fig. 1.
The Chineſe Tail; Tom. V. p. 52. T. DXCIX.
The common Grey Owl; Tom. I. p. 87. T. LXXXVI.
The creſted Humming-Bird, Tom. IV. p. 40. T. CDII. Fig. 2.
The creſted red, or ruſſit Butcher Bird; Tom. I. p. 74. T. LVII. Fig. 2.
The forck taild Indian Butcher Bird; Tom. I. p. 74. T. LVII. Fig. 1.
The great Horned Owl; Tom. I. p. 86. T. LXXXIV.
The great Spotted Cuckow; Tom. I. p. 81. T. LXX.
The greater Minor, or Mino; Tom. III. p. 60. T. CCCXIX.
The greateſt Martin, or Swift; Tom. IV. p. 43. T. CDXIII.
The King of Birds of Paradiſe; Tom. I. p. 70. T. LXVI.
The leſſer Puffin; Tom. V. p. 24. T. DXXXVII.
The leſſer red-backt Butcher Bird; Tom. I. p. 74. T. LV. Fig. 1.
The little black white, and red Indian Creeper; Tom. II. p. 57. T. CXCVIII. Fig. 1.
The Oſtrich; Tom. II. p. 29. T. CXXXVII.
The Pea-Cock Pheaſant from China; Tom. II. p. 74. T. CCXIX.
The Pie Bird of Paradiſe; Tom. II. p. 41. T. CLIX.
The Raven; Tom. II. p. 32. T. CXL.
The Red Bird from Surinam; Tom. I. p. 74. T. LVIII. Fig. 2.
The Red headed Butcher Bird; Tom. I. p. 74. T. LVI.
The-rei breaſted; Tom. III. p. 74. T. CCCXLVII.
The Roller; Tom. II. p. 39. T. CLIII.
The Rook; Tom. II. p. 35. T. CXLV.
The Spider-catcher; Tom. II. p. 56. T. CXCVII.
The Swallow-tail'd Kingfiſcher; Tom. II. p. 52. T. CLXXXV.
The Teal; Tom. V. p. 51. T. DXCV.
The Tit-Lark; Tom. IV. p. 23. T. CCCLXXII. Fig. 1.
The white, and rough-footed Partridge; Tom. II. p. 58. T. CCXL.
The Wryneçk; Tom. II. p. 52. T. CLXXXVI.
Throſtle; Tom. III. p. 41. T. CCXC.
Tit-Lark; Tom. IV. p. 23. T. CCCLXXIII. Fig. 1.
Titling; Tom. IV. p. 34. T. CCCXCII. Fig. 1.
Tome Gooſe; Tom. V. p. 36. T. DLVIII.
Tropick Bird; Tom. V. p. 17. T. DXVI.
Tunis-Falcon; Tom. I. p. 58. T. XXVII.
Turbit-Pigeon, Tom. III. p. 31. T. CCLXXIV.
Turtle, or Tutle-Dove; Tom. III. p. 40. T. CCLXXXIX.
Tufted Duck; Tom. I. p. 50. T. DXCI.

V

VIrginian Nightingale; Tom. III. p. 66. T. CCCXXIX.
Vulturine Eagle; Tom. I. p. 45. T. XIV.

Y

YEllow; Hammer; Tom. III. p. 74. T. CCCXLVIII. Fig. 1.
Yellow Water-Wagtail; Tom. IV. p. 31. T. CCCLXXXV. Fig. 2. and T. CCCLXXXVI. Fig. 2.

W

WAter-Ouzel; Tom. V. p. 5. T. CDXC.
Water-Rail; Tom. V. p. 1. T. CDLXXXI.
Water-Swallow; Tom. IV. p. 61. T. CDLI.
Whimbrell; Tom. IV. p. 56. T. CDXLI.
Whin-Chat; Tom. IV. p. 29. T. CCCLXXXI. Fig. 2.
White Owl; Tom. I. p. 92. T. C.
White China-Pheaſant; Tom. III. p. 25. T. CCLXI.
White Falcon; Tom. I. p. 68. T. XXXV.
White Heron; Tom. IV. p. 48. T. CDXXV.
White Nun-diver; Tom. V. p. 16. T. DXIII.
White Owl; Tom. I. p. 88. T. XCI.
White Pea-Cock; Tom. II. p. 74. T. CCXVIII.
White Red-Shank, Tom. IV. p. 58. T. CDXLIV.
White-Throat; Tom. IV. p. 26. T. CCCLXXVIII. Fig. 1.
White Wood-Cock; Tom IV. p. 60. T. CDXLVIII.
Widdehop; Tom. II. p. 64. T. CCVI.
Wild-Duck, Tom. V. p. 43. T. DLXX.
Wild Swan Elk Hooper; Tom. V. p. 34. T. DLIV.
Wind-Trush; Tom. III. p. 43. T. CCXCIII.
Winter Mew; Tom. V. p. 23. T. DXXXV.
Witwol; Tom. III. p. 52. T. CCCVII.
Wood-Cock; Tom. IV. p. 59. T. CDXLVII.

INDICE

DELLE COSE PRINCIPALI TRATTATE IN QUESTA ISTORIA NATURALE DEGLI UCCELLI, E DISTESA IN LINGUA TOSCANA.

A

ALbatro, suo becco osservabile; Tom. V. p. 31.
Anatra d'India munita d'un genitale osservabile; p. 42. Tom. V.
Aquila nera detta in Greco *Malanoetos*, e in latino *Valeria*; Tom. I. p. 37.
Aquila non beve, e vive lungo tempo; Tom. I. p. 37.
Aquile non separate di genere dai Falchi da Linneo; Tom. I. p. 40.
Aquile rapiscono i fanciulli; Tom. I. p. 39.
Aquile s'istruiscono per la Caccia; Tom. I. p. 40.
Asperarteria del Cigno salvatico osservabile per esser ripiegata a modo di Tromba; Tom. V. p. 34.
Avoltoio cibandosi di Cadaveri purga l'aria dalla corruzione; Tom. I. p. 46.
Avoltoio Indiano bellissimo, detto Re degli Avoltoi; Tom. I. p. 44.
Avoltoio suo cibo; Tom. I. p. 42.

B

BAsettino osservato per la prima volta dal P. Abat. D. Bruno Tozzi Valombrosano; Tom. IV. p. 21.
Beccaccia ove abiti; Tom. IV. p. 59.
Biblioteca Ornitologica, o sia Catalogo di tutti gl'Autori, che hanno trattato degl'Uccelli; Tom. I. p. 1.
Braccio Fiorentino (*misura*) come si divida, e suo rapporto col piede d'Inghilterra, e di Parigi; Tom. I. p. 7.

C

CAlcagno negl'Uccelli qual sia; Tom. III. p. 42.
Carne della Gallinella palustre provoca l'appetito, ed ancora la volontà di bere; Tom. V. p. 1.
Caso seguito ad un Uomo per cavare un nido d'Aquila; Tom. I. p. 38.
Cavità del meato auditorio della Civetta; Tom. I. p 89.
Cibo del Basettino; Tom. IV. p. 21.
—— del Calenzuolo; Tom. III. p. 68.
—— del Cigno; Tom. V. p. 33.
—— del Colimbo, o Tuffetto; Tom. V. p. 18.
—— del Colimbo minore detto *Suasso Turco*; Tom. V. p. 19
—— del Colombaccio; Tom. III. p. 30.
—— del Crociere; Tom. III. p 64.
—— del Cucule; Tom. I. p. 80.
—— del Culbianco; Tom IV. p. 62.
—— del Fagiano; Tom. III. p 25.
—— del Francolino; Tom. III. p. 12.
—— del Frosone; Tom. III. p. 65.
—— del Gabbiano; Tom. V. p. 22.
—— dell'Allodola Campestre; Tom. IV. p. 23.
—— dell'Allodola Panterana; Tom. IV. p. 25.
—— dell'Anatra detta Canone, e Quattrocchi; Tom. V. p. 50
—— dell'Anatra maggiore detta in Toscana Tuffetto, e Tuffatore; Tom. V. p. 49.
—— dell'Anatra Penelope, detta in Toscana Bibbio e Caporosso; Tom. V. p. 47.
—— dell'Anatre; Tom. V. p. 40.
—— dell'Aquila; Tom. I. p. 36.
—— della Cinciallegra; Tom. IV. p. 25.
—— della Civetta; Tom. I. p. 87.
—— della Folaga; Tom V. p. 20.
—— della Grue; Tom. IV. p. 44.
—— della Merla; Tom. III. p. 48.
—— della Merla acquatica; Tom. V. p. 5.
—— della Merope o Tordo Marino; Tom. V. p. 7.
—— della Pantana o Moschettone; Tom. IV. p. 63.
—— della Passera di Canaria; Tom. IV. p. 17.
—— della Paoncella; Tom. IV. p. 71.
—— della Sgarza, o *Airone* cenerino; Tom. IV. p. 46.
—— della Sgarza, o *Airone* bianco; Tom. IV. p. 47.
—— della *Sterna*; Tom. III. p. 19.
—— della Sterna minore; Tom. V. p. 27.
—— della Sula, altrimenti Oca Bassana; Tom. V. p. 17.
—— della Tortora; Tom. III. p. 39.
—— della Velia; Tom. I. p. 72.
—— delle Oche; Tom. V. p. 37.
—— del Onocrotalo; Tom. V. p. 12.
—— dell'Ostralega; Tom. IV. p. 68.
—— dello Stercorario; Tom. V p. 26.
—— del Otarda minore; Tom. III. p. 26.
—— del Marangone; Tom V. p. 13.
—— del Mellivoro; Tom. IV. p. 39.
—— del Mergo-Oca; Tom V. p. 15.
—— del Monachino; Tom. III. p. 61.
—— del Nibbio; Tom. I. p. 63.
—— del Pollo Sultano; Tom. V. p. 3.

Cibo del Puffino; Tom. V. p. 24.
—— del Raperino; Tom. IV. p. 15.
—— del Rigogolo; Tom. III. p. 54.
—— del Ruſignolo; Tom. IV. p. 38.
—— del Succhiacapre; Tom I. p. 92.
—— del Tordo, o Merla Saſſatile; Tom. III. p. 44.
—— del Tucano; Tom. II. p. 61.
—— dei Pappagalli; Tom. II. p. 20.
——, volo parto, ed uſo ne cibi del Chiurlo ſon deſcritti dall' Aldrovando; Tom. II. p. 56.
Cigno vive lungo tempo; Tom. 5. p. 33.
Cinciallegra cenerina difende con ardire i ſuoi Figliuoli Tom. IV. p. 70.
Colombi vivono lungo tempo; Tom. III. p. 34.
Combattente o ſia Pavone di Mare; Tom. V. p. 4.
Combattimento dei Galli; Tom. II. p. 71.
Coccio di Colombo è molto calido; Tom. III. p. 36.
Coccia di montagna di nido è ottimo cibo; Tom. II. p. 39.
Cornacchia naſconde gl' avanzi del cibo; Tom. II. p. 26.
Corvo s' inſtruiſce alla Caccia; Tom. II. p. 33.
Corvo vive lungo tempo; Tom. II. p. 33.
Coturnice, o Quaglia maſchio s' inſtruiſce a combattere; Tom. III. p. 15.

D

Debolezza delle gambe dell'Imantopo o Merlo Aquatico; Tom. IV. p. 67.
Difficoltà per determinare alcune ſpecie d' Uccelli; Tom. I. p. 43.
Diſtinzione dell' Allocco, della Civetta, e d'altri Uccelli Notturni; Tom. I. p. 89.
Diſtinzione dell' Aquila dall' Avoltoio; Tom. I. p. 35.
Diſtinzioni delle ſpecie dei Pappagalli; Tom. I. p. 93.
Diviſione Siſtematica degl' Uccelli ſecondo Charleton; Tom. I. p. 17.
Diviſione di Briſſon; Tom. I. p. 27.
Diviſione degl' Uccelli ſecondo Linneo; Tom. I. p. 24.
Diviſione Siſtematica del Klein; Tom. I. p. 21.
Diviſione Siſtematica del Moehringio; Tom. I. p. 20.
Diviſione Siſtematica del Willugby; Tom. I. p. 18.

E

Emeu, o Caſuario è privo di lingua; Tom. II. p. 28.

F

Falco addeſtrato alla Caccia dell'Allodole; Tom. I. p. 51.
Falco femmina ſupera il maſchio in groſſezza, e ciò oſſervaſi in tutte le altre ſpecie d' Uccelli rapaci; Tom. I. p. 50.
Falco o Sparviere come ſi prenda; Tom. I. p. 52.
Fenicottero ha le gambe lunghiſſime; Tom. V. p. 9.
Francolino ſua carne apprezzatiſſima; Tom. III. p. 14.

G

Galline ſi cibano d' uva e di fichi con danno loro; Tom. II. p. 68.
Gallinella paluſtre, ſua Caccia; Tom. V. p. 1.
Gallo alpeſtre minore, ſua Caccia; Tom. II p. 82.
Genere di vita delle Rondini, e Cicogne in tempo d' Inverno; Tom. III. p. 1.
Gufo ammaſſa molta preda; Tom. I. p. 85.

L

Lingua del Picchio lunga, oſſea e dentata; Tom. II. p. 48.
Linneo ſcanſa molte difficoltà col ſuo Siſtema; Tom. I. p. 53.

M

Malattie de Colombi; Tom. III. p. 34.
Malattie delle Galline; Tom. II. p. 68.
Malattie delle Paſſere di Canaria; Tom. IV. p. 17.
Maniera d' Anatomizzare, preparare, e imbalſamare gli Uccelli; Tom. IV. p. 5.
Manucodiata ha i piedi; Tom. I. p. 78. T. LXIV.
Merli imparano a parlare; Tom. V. p. 47.
Mutazione dei Falchi nella Vecchiaia; Tom. I. p. 78.

N

Nibbio trovaſi in ogni paeſe; Tom. I. p. 63.
Nido dei Falchi; Tom. I. p. 54.
—— del Baſettino; Tom IV. p. 21.
—— del Beccafico Canapino; Tom. IV. p. 34.
—— del Beccafico cenerino minore; Tom. IV. p. 36.
—— del Codibugnolo; Tom. IV. p. 27. T. CCCLXXIX.
—— del Codibugnolo di padule o ſia Pendolino; Tom. IV. p. 28. T. CCCLXXX.
—— del Codiroſſo; Tom IV p. 36.
—— del Colimbo minore detto Suaſſo Turco; Tom. V. p. 19.
—— del Corvo; Tom. II. p. 32.
—— del Crociare; Tom. III. p. 64.
—— del Cucule; Tom. I. p. 80.
—— del Culbianco; Tom. IV. p. 62.
—— del Fagiano; Tom. III. p. 24.
—— del Falco di Pollonia; Tom. I. p. 59.
—— del Falco pellegrino non trovaſi in parte alcuna; Tom. I. p. 55.
—— del Falco Peſcatore o Balbuſardo; Tom. I. p. 65.
—— del Fringuello; Tom. III. p. 70.
—— del Froſone; Tom. III. p. 65.
—— del Gabbiano; Tom. V. p. 22.

Nido del Germano Reale; Tom. V. p. 43.
—— del Gufo; Tom. I. p. 85.
—— dell' Allodola Campeſtre; Tom. IV. p. 23.
—— dell' Allodola Panterana; Tom. IV. p. 25.
—— della Bubbola; Tom. II. p. 63.
—— della Capinera; Tom. IV. p. 36.
—— della Cicogna; Tom. IV. p. 51.
—— della Cinciallegra; Tom. IV. p. 25.
—— della Civetta; Tom. I. p. 87.
—— della Colombella; Tom. III. p. 30.
—— della Coturnice Ortigrometra; Tom. III. p. 17.
—— della Cutrettola bianca; Tom. IV. p. 31.
—— della Folaga, Tom. V. p. 20.
—— della Fraticella; Tom. V. p. 31.
—— della Gazzera; Tom. II. p. 40.
—— della Ghiandaia; Tom. II. p. 43.
—— della Glareola; Tom. V. p. 29.
—— della Maſſaiola; Tom. IV. p. 30.
—— della Merla; Tom. III. p. 46.
—— della Merope o ſia Tordo Marino; Tom. V. p. 8.
—— della Paoncella; Tom. IV. p. 71
—— della Paſſera di Canaria; Tom. IV. p. 19.
—— della Procellaria o ſia Fringuello di mare; Tom. V. p. 25.
—— della Quaglia; Tom. III. p. 16.
—— della Sgarza Stellare; Tom. IV. p. 49.
—— della Rondine; Tom IV. p. 42.
—— della Rondine mangiato volentieri da Chineſi; Tom. IV. p. 42.
—— della Starna; Tom. III. p. 19
—— della Sterna minore; Tom. V. p. 27.
—— della Sula altrimenti Oca Baſſana; Tom. V. p. 17.
—— della Velia; Tom. I. p. 72.
—— della Volpoca, altrimenti Tadorna; Tom. V. p. 36.
—— delle Aquile ove troviſi; Tom. I. p. 38.
—— dell' Onocrotalo, e ſuo cibo; Tom. V. p. 12.
—— dell' Orfa; Tom. V. p. 30. T. DXLIX.
—— del Laniere; Tom. I. p. 58. T. XXVI.
—— del Marangone; Tom. V. p. 13. T. DI.
—— del Mellivoro; Tom. IV. p. 39.
—— del Mergo maggiore; Tom. V. p. 14.
—— del Mergo Oca; Tom. V. p 15.
—— del Monachino; Tom. III. p. 61.
—— del Pellicano; Tom. IV. p. 54.
—— del Pettiroſſo; Tom. IV. p. 35.
—— del Picchio verde; Tom. II p. 46.
—— del Pigliamoſche, o Saltinſelce; Tom IV. p. 29.
—— del Pinguino maggiore; Tom. V. p. 10.
—— del Piviere biondo; Tom. IV. p. 69.
—— del Raperino; Tom IV. p. 15.
—— del Rigogolo; Tom. III. p. 53.
—— del Ruſignolo; Tom. IV. p. 38.
—— dello Scricciolo, o Re di Macchia; Tom. IV. p. 32.
—— del Tordo; Tom. III. p. 42.
Notizie neceſſarie per la Storia degl' Uccelli; Tom. I. p. 8.

O

OChe diventano ſterili preſe e reſe manſuete; Tom. V. p. 39.
Oſſa dell' Onocrotalo perchè traſparenti; Tom. V. p. 12.

P

PAppagalli come s' inſtruiſcono; Tom. II. p. 19.
Pappagalli come ſi prendino; Tom. I. p. 95.
Pappagalli vivono lungamente; Tom. I. p. 96.
Paſſera di Canaria Spuria; Tom. IV. p. 18.
Pavone vive lungamente; Tom. II. p. 73.
Pelle d' Iſpida o ſia Uccello S. Maria conſervaſi con le penne contro le Tarme; Tom. V. p. 6.
Penne della Sgarza o Airone bianco ſon di gran valore; Tom. IV. p. 47.
Perchè cadino agl' Uccelli le piume ogn' anno; Tom. V. p. 44.
Piedi anomali del Gufo, Aſſiolo, *Strige*; Tom. I. p. 86.
Piviere il grande s' addomeſtica; Tom. *IV. p. 68.*
Puffino privo di penne; Tom. V. p. 24.
Pulcini dell' Anatra, ſe gli manchi la madre *ſi nutriſcono* da loro ſteſſi; Tom. V. p. 41.
Pulcini naſcono col calore del forno; Tom. II. p. 81.

R

RIgopſalia ha la parte di ſotto del becco *molto più* corta della *ſuperiore* al contrario degl' *altri Uccelli*; Tom. V. p. 29.

S

SEba dice aver veduto in Olanda le Sterne o Rondini di Mare che tramandano un odor gratiſſimo d' ambragrigia; Tom. V. p. 28.
Sgarza bianca, maggiore, o Airone bianco, *cibo molto* ſtimato; Tom. IV. p. 48.
Struzzo come ſi prenda; Tom. *II. p. 31.*
Struzzo cova l' Uova; Tom. *II. p. 30.*

U

UCcelli dell' Albino poco ſimili alvero e malamente coloriti; Tom. I p. 43.
Uccelli ſono di più lunga vita degl' altri animali; Tom. IV. p. 3.
Uova delle Pernici cercate e diſtrutte ogn' anno dagl' abitanti dell' Iſola di Nanfio; Tom. III. p. 20.
Uova d' Uccelli quali le migliori, e quali le *peggiori* per cibo dell' huomo; Tom. II. p. 30.
Uovo del Gufo e mera favola; Tom. II. p. 70.

INDEX

RERUM PRAECIPUARUM IN HAC NATURALI AVIUM HISTORIA, LATINE CONSCRIPTA, OCCURRENTIUM.

A

Accipiter ad capiendas Alaudas inſtituitur; Tom. I. p. 51.
Accipiter quibus inſidiis capiatur; Tom. I. p. 52.
Accipitris in Polonia nidus; Tom. I p. 59.
Accipitris Lanarii nidus; Tom. I. p. 58.
Accipitris nidus ſtructura & materies; Tom. I. p. 54.
Accipitris Peregrini nidus non invenitur; Tom. I. p. 55.
Alaudae Panteranae nidus; Tom. IV. p. 25.
Albatri roſtrum notatu dignum; Tom. V. p. 31.
Alcae maioris nidus; Tom. V. p. 10.
Alcae eiuſdem cibus; ibidem.
Anas Indica genitale habet notatu dignum; Tom. V. p. 42.
Anatis ferae nidus; Tom. V. p. 43.
Anatum Pulli etiam ſine nutrice vivunt; Tom. V. p. 41
Anſeres ſteriles evadunt ſi mites redditae fuerint; Tom. V. p 39.
Aquilae a Linnaeo a Falconibus non diſiunguntur; Tom. I. p. 40.
Aquilae ab Indis pro Leprorum aliorumque animalium venatu inſtituuntur; Tom. I p. 40.
Aquilae potus nullus, & vita longa; Tom. I. p. 37.
Aquilae Pueros etiam rapiunt; Tom. I. p. 39
Aquilae quo nidificent; Tom. I. p. 38.
Ardeae albae cibus; Tom. IV. p. 47.
Ardeae albae maioris Pulli in deliciis habentur; Tom. IV. p. 48.
Ardeae albae pennae maximo habentur pretio; Tom. IV. p. 47.
Ardeae cinereae cibus, & nidus; Tom. IV. p. 46.
Ardeae ſtellaris nidus; Tom. IV. p. 49.
Aſio, Bubo &c. pedes habent anomalos; Tom. I. p. 86.
Aves ab Albino non ſatis accurate expreſſae, & etiam peſſime depictae adinveniuntur; Tom. I. p. 43.
Aves aliis animantibus longaeviores, Tom. IV. p. 3.
Avis pugnacis proprietates; Tom. V. p. 4.

B

Albuſardi Falconis nidus; Tom. I. p. 65.
Bibliotheca Ornithologica, ſive Auctorum omnium Catalogus, qui de Avibus ſcripſerunt, Tom. II. p. 1.
Brachii Florentini pars quarta, cum parte tertia Pedis Pariſienſis & Anglici comparatur; Tom. I. p. 7.
Bubo multum praedae congerit; Tom. I. p. 85.
Bubonis minoris nidus; Tom. I. p. 85.

C

Calcaneum in Avibus quid ſit; Tom. III. p. 42.
Canarii nidus; Tom. IV. p. 19.
Canarius hybridus; Tom. IV. p. 18.
Caſus cuiuſdam Hominis, qui Aquilas iuniores nido extrahebat cyſta incluſus; Tom. I. p. 38.
Cavitates in Noctuae hiatu auditorio obſervabiles; Tom. I. p. 89.
Certhia Arundinum primum ad D. Brunone Tozzi Monaco Valliſumbroſae obſervata; Tom. IV. p. 21.
Certhiae eiuſdem nidus; ibidem.
Chloridis cibus; Tom. III. p. 68.
Cibus Alaudae Panteranae; Tom. IV. p. 25.
—— Anatis; Tom. V. p. 40.
—— Anatis Clangulae; Tom V. p. 50.
—— Anatis Glaucionis maioris; Tom. V. p. 49.
—— Anatis Penelopis; Tom. V. p. 47.
—— Anſeris; Tom. V. p. 37.
—— Aquilae, Tom. I. p. 36.
—— Caprimulgi; Tom. I p. 92.
—— Ciconiae; Tom. IV. p. 51.
—— Citrinellae; Tom. IV. p. 15.
—— eiuſdem nidus; ibidem.
—— Colymbi auriti, & cornuti minoris; Tom. V. p. 19.
—— Colymbi minoris; Tom. V. p. 18.
—— Cuculi; Tom. I. p. 80.
—— Cygni; Tom. V. p. 33.
—— Francolini; Tom. III. p. 14.
—— Fulicae; Tom. V. p. 18.
—— Ianii; Tom. I. p. 72.
—— Lari; Tom V. p. 22.
—— Mellivorae; Tom. IV. p. 19.
—— Meropis; Tom. V. p. 7.
—— eiuſdem nidus; ibidem.
—— Merulae aquaticae; Tom. V. p. 5.
—— Milvi; Tom. I. p. 63.
—— niduſque Alaudae campeſtris Tom. IV. p. 23.
—— Noctuae; Tom. I. p. 87.
—— Onocrotali; Tom. V. p. 12.
—— Pari caerulei; Tom. IV. p. 25.
—— Phalacrocoracis; Tom. V. p. 13.
—— Pſittacorum, Tom. II. p. 20.
—— Sulae ſeu Anſeris Baſſani; Tom. V. p. 17.
—— Tucani; Tom. II. p. 61.
Ciconiae nidus; Tom. IV. p. 52.
Columbae Liviae, vel Palumbi ſylveſtris minoris nidus; Tom. III. p. 30.

Columbae longaevae; Tom. III. p. 34.
Coracias montana ſuavi conſtat carne; Tom. II. p. 39.
Cornix quando ſatiata ſit reliquias recondit; Tom. II. p. 36.
Corvi nidus; Tom. II. p. 32.
Corvus longaevus; Tom. II. p. 33.
Corvus venaticus evadit; Tom. II. p. 33.
Coturnicis nidus; Tom. III. p. 16.
Coturnicis Ortygometrae nidus; Tom. III. p. 17.
Coturnix mas ad pugnam inſtituitur; Tom. III p. 15.
Colymbi minoris nidus; Tom. V. p. 19.
Cuculi nidus, Tom. I. p. 80.
Cygni aſpera arteria tubae in modum reflexa; Tom. V. p. 34.
Cygnus longaevus; Tom. V. p. 33.

D

Difficultas accurate diſtinguendi ſpecies Avium ab Auctoribus deſcriptarum; Tom I. p 43.
Diſtinctio Aluconis a Noctua; Tom. I. p. 43
Diſtinctio Aquilae a Vulture; Tom. I. p. 35.
Divino Methodica Avium ad mentem Charletoni; Tom. I. p. 17.
—— Briſſonii; Tom. I. p 27.
—— Kleinii; Tom. I. p. 21.
—— Linnaei; Tom. I. p 24.
—— Moehringii; Tom. I. p. 20.
—— Willughby; Tom. I. p. 18.

E

Emeu ſive Caſuarius lingua caret; Tom. II. p. 28.

F

Ficedulae atricapillae nidus; Tom. IV. p. 36.
Fringillae cannabinae nidus; Tom. IV. p. 34.
Fringillae cinereae minoris nidus; Tom. IV. p 35.
Fimus Columbinus calefacit vehementer; Tom. III. p. 36.
Francolini, ſive Attagenis caro laudatiſſima; Tom. III. p. 14.
Fraterculae nidus; Tom. V. p. 31.
Frugillae nidus; Tom. III. p. 70.
Foemina Accipitris & Avium congenerum multum craſſitie marem antecellit; Tom. I. p. 50.
Fulicae nidus; Tom. V. p 20.

G

Galbulae nidus; Tom. III. p. 53.
Galbulae eiuſdem cibus; ibidem.
Galli ad pugnam inſtruuntur; Tom. II. p. 71.
Galli ovum mera fabula; Tom. II. p. 70.
Gallinae veſcuntur ficubus & uvis impenſe, ſed cum earundem damno, Tom. II. p. 68
Gallinarum, & Phaſianorum ova optima, Anſeris & Struthionis deteriora; Tom. II. p. 30.
Gallinulae paluſtris caro appetentiam irritat, bibendique voluntatem; Tom. V. p. 1.
Gallinulae paluſtris venatio; ibidem.
Glareolae nidus; Tom. V. p. 29.
Gruis cibus; Tom. IV. p. 44.

H

Hibernatio Hirundinum ac Ciconiarum; Tom. III. p. 1.
Himantopi crurum longitudo & exilitas; Tom. III. p. 67.
Hirundinis nidus & cibus; Tom. IV. p. 42.
Hirundinis Sinenſis nidus avide devoratur a Sinenſibus; Tom. IV. p 42.

I

Inſulae Namphii habitatores ova Perdicum quotannis diſfrangunt; Tom III. p. 20.
Iſpidae pellis cum pennis contra tineas aſſervatur; Tom. V. p 6.
Iſpidae ſive Alcyonis fluviatilis nidus; ibidem.

L

Lanii cinerei nidus; Tom. I. p. 72.
Lari nidus; Tom. V. p. 22.
Limoſae cibus; Tom IV. p. 63.
Lingua Picorum prielonga, & in exitu aculeo oſſeo dentato munita; Tom. II. p 48.
Linnaeus multas Syſtemate ſuo reſecat difficultates; Tom. I p. 53
Loxiae vel Curvirroſtri nidus, cibuſque; Tom. III. p. 64.
Luſciniae, ſeu Philomelae nidus, cibuſque; Tom. IV. p. 38.

M

Manucodiata pedibus non caret; Tom. I. p. 78.
Mellivorae nidus; Tom. IV. p. 39.
Merganſeris cibus & nidus; Tom. V. p. 15.
Mergi majoris nidus, Tom. V. p. 14.
Merulae cibus; Tom. III p 48.
Merulae humanum imitantur ſermonem; Tom. III. p. 47.
Merulae nidus; Tom III. p. 46.
Methodus pro excludendis pullis ex vulgarium Gallinarum ovis; Tom. II. p. 81.
Milvus ubique reperitur; Tom. I. p. 63.
Morbi Columbarum; Tom. III. p. 34.
Morbi Gallinarum; Tom. II. p 68.
Morbi Paſſerum Canarienſium; Tom. IV. p. 17.
Motacillae albae nidus; Tom. IV. p. 31.
Muſcicapae, vel Muſcipetae Rubetrae nidus; Tom. IV. p. 29.
Mutatio Accipitris in ſenectute; Tom. I. p. 61.

N

Noctuae nidus; Tom. I. p. 57.
Notae characteristicae Avium Historiae praemittuntur; Tom. I. 8.
Numenii victus, volatus, partus, & eius usus in cibis ab Aldrovando describuntur; Tom. IV. p. 56.

O

Otis minor qua ratione capiatur; Tom. III. p. 26.
Otis minor quo vescatur cibo; Tom. III. p. 26.
Onocrotali nidus; Tom. V. p. 12.
Ossa Onocrotali singularia quia pellucida; ibidem.
Ostralegae cibus; Tom. IV. p. 68;

P

Passeris Canarii cibus; Tom. IV. p. 17.
Pari caerulei nidus; Tom. IV. p. 17.
Pari caudati nidus; Tom. IV. p. 27. T. CCCLXXIX.
Pari caudati palustris nidus; Tom. IV. p. 28. T. CCCLXXX
Parus cinereus Pullos suos mirabiliter defendit; Tom. IV. p. 27.
Palumbi maiotis cibus; Tom. III. p. 30.
Perdicis cibus; Tom. III p. 19.
Perdicis minoris nidus; Tom. III. p. 19.
Phalacrocoracis nidus, Tom V. p. 13.
Phasiani cibus; Tom. III. p. 25.
Phasiani nidus; Tom. III. p. 24.
Phenicopteri crura longissima; Tom. V. p. 5.
Picae glandariae nidus; Tom. II. p. 43.
Picae nidus; Tom. II. p. 40.
Pici viridis nidus; Tom. II. p. 46.
Plateae vel Pellicani nidus & cibus; Tom. IV. p. 54.
Pluvialis flavescentis nidus; Tom. IV. p. 19.
Pluvialis maior facile mansuescit; Tom. IV. p. 63.
Porphirionis cibus; Tom. V. p. 3.
Procellariae nidus; Tom. V. p. 25.
Psittaci in tria genera distinguuntur; Tom. I. p. 93.
Psittaci longaevi; Tom. II. p. 73.
Psittaci qua ratione capiantur; Tom. I. p. 95.
Puffini cibus; Tom. T. p. 24.
Puffinus pennis caret; Tom. V. p. 25.

R

Ratio ac methodus Aves dissecandi, ac condiendi; Tom. IV. p. 5.
Ratio, qua Avibus quolibet anno plumae decidant; Tom. V. p. 44.
Rubecu ae nidus; Tom. IV. p. 35.
Rubicillae seu Pyrrhulae nidus & cibus; Tom. III. p. 61.
Ruticillae nidus; Tom. IV. p. 36.
Rygchopsaliae rostrum observatione dignum, quia eius pars inferior longior superiore; Tom. V. p. 29.

S

Scolopax ubi inveniatur; Tom. IV. p. 59.
Seba in Hollandia Sternas observavit ambrae griseae gratissimum odorem spirantes; Tom. V. p. 28.
Stercorarii longicaudi cibus; Tom. V. p. 26.
Sternae minoris nidus & cibus; Tom. V. p. 27.
Struthio-Camelus ovorum incubationi operam dat; Tom. II. p 30.
Struthio qua ratione capiatur; Tom. II. p. 31.
Sulae seu Anseris Bassani nidus; Tom. V. p. 17.

T

Tringae nidus, & cibus; Tom. IV. p 62.
Troglodytes, seu Passer sepium; eius nidus, cibusque; Tom. IV. p. 32.
Turdi nidus; Tom. III. p. 42.
Turdi vel Metulae Saxatilis cibus; Tom. III. p. 44.
Turturis cibus; Tom. III. p. 39.

U

Upupae nidus; Tom. II. p. 63.
Uriae nidus; Tom. V. p. 30.
Urogallus minor qua methodo capiatur; Tom. II. p. 82.

V

Vannelli nidus & cibus; Tom. IV. p. 71.
Vitiflorae nidus, & cibus; Tom. IV. p. 30.
Vulpanseris, alias Tadornae nidus; Tom. V. p. 46.
Vultur cadavera devorando aerem purgat; Tom. I. p. 46.
Vultur Indicus, Rex Vulturum dictus; Tom. I. p. 44.

CDLXXXI.

Gallinella Palustre comune. — *Gallinula Palustris vulgaris.*

P.P.A.V.

CDLXXXII.

Gallinella Palustre piccola. —————— *Gallinula Palustris minor.*

Gallinella armata Indiana. ——— *Gallinula armata Indica.*

Gallinella acquatica volg.t Sutro. ——— Gallinula Ochra.

Pollo Sultano. ——— Porphyrio.

CDLXXXVI.

Pollo Sultano volg.^r Cimandorlo. ——— Porphyrio ex viridi nigricans.

Pollo Sultano della ſteſſa ſpecie femmina. — Porphyrio ejusdm ſpeciei foemina.

Combattente. —— Avis Pugnax.

Combattente Indiano. ——— *Avis Pugnax Indica.*

Merla acquatica, o acquajola comune. = *Merula aquatica, vel rivalis.*

CDLXXXXI.

Merla acquatica di petto ceruleo scuro. — *Merula aquatica pectore caeruleo fusco.*

Merla acquatica nera. ⟵ *Merula aquatica nigra.* CDLXXXXII.

Ispida, volg.^r Uccello S. Maria. = Ispida, vulgo Avis S. Mariae.

Merope, vulgò Tordo Marino. —— *Merops, sive Apiaster.*

Avosetta, o Becco storto. —— Avosetta, sive Recurvirostra.

CDLXXXXVI.

Fenicottero altrim.e Fiammingo. —— Phoenicopterus.

Pinguino maggiore. — *Alca major*

Diomedea, o Sfenisco brizzolato. —— *Diomedea, vel Spheniscus naevius.*

Onocrotalo, o sia Pellicano. —— Onocrotalus, sive Pelecanus.

Onocrotalo, o Pellicano d'America. —— *Onocrotalus Americanus*

Marangone, o sia Corvo aquatico. ——— *Phalacrocorax.*

C. Marangone affatto nereggiante. = Phalacrocorax penitus nigrans.

Marangone di becco, e piedi gialli. ⟷ *Phalacrocorax rostro, et pedibus lutei.*

Maramone, vedi in Tavana Perdigiorno ——— *Phalaropus*

Mergo maggiore, volg.e Smergo. —— Mergus major.

Mergo, o Smergo maggre forse femmina dell'antecedi.e specie. = Mergus major, an antecedentis speciei foemina.

Mergo maggiore brizzolato, o sia Mergo artico. — Mergus major naevius, sive Arcticus.

Mergo - Oca, detto anche Oca Marina. ——— *Merganser*

Mergo-Oca di lungo becco col ciuffo. —— *Merganser longirostris, cristatus.*

Mergo-Oca, forse la femmina dell'antecedente. = *Merganser antecedentis speciei foemina?*

Mergo-Oca cenerino di capo rossiccio, e di becco minore. = *Merganser cinereus capite rufescente, brevirostr.*

Mergo - Oca nero e bianco, volg: Domenicano. = Merganser superne, niger infer= ne albus.

Mergo - Oca minore S. Monaca bianca. ⟷ Mergus minor Linnæi alba dictus.

Mergo – Oca minore, femmina. ——— Merganser minor, foemina.

Sula, altrimenti Oca dell' Isola di Bassa. = *Sula, alioquin Anser Bassanus.*

Fetonte, altrimenti Uccello dei Tropici. ⟶ Phaethon, sive Avis Tropicorum.

Colimbo minor volg: Tuffetto. —— Columbus minor.

Colimbo maggiore cinereo —— Colymbus cinereus major Raj:

Colimbo minore nero, eroſso, volg.e Tuffetto roſso. = Colymbus minor ex nigro, et rubro refectus.

Colimbo minore, volgo: Suasso Turco. — Colymbus auritus, et cornutus minor.

Colimbo crestato maggiore maschio. ⟷ *Colymbus major cristatus mas.*

Colimbo crestato maggiore, femmina. ——— Colymbus cristatus major, foemina.

Colimbo giovane dell' antidetta specie — Colymbus superciliosus juvenis.

Folaga maggiore. —— *Fulica major*

Folaga comune. —— Fulica vulgaris.

Gabbiano Corallino cenerino. ——— *Larus cinereus rostro, et pedibus rubris.*

DXXVII.

Gabbiano d. volg. Moretta. —— Larus cinereus capite ex viridi nigricante.

Gabbiano d. Volg. Moretta. — Larus cinereus capite ex viridi nigricante.

Gabbiano d'Ovidy: Terragnola e Galetra — DXXIX. *Larus vulgo Terragnola et Galetra dictus.*

Gabbiano E.° Zafferano cinerino. = Larus cinereus rostri extremitate et pedibus croceis.

Gabbiano d'volg.e Mezza Mosca. Lanus ex cinereo, albo fusco, et nigricante infectus et maculatus.

DXXXII.

Gabbiano di Tufferano mezzo morto. Larus [illegible] natatus dorso de remigibus usque ad apicem, mari, rostro pedibusq: flaveis.

Gabbiano Reale, o sia Marino Pescatore. = Larus cinereus maximus Mannarius Piscator

Crabbiam picchettato colla Monatone. — Laru[s] maculis Musca[e] referentibus variegatus

Gabbiano volg.e Guairo. = Larus nostratibus vulgo Guairo.

Puffino altrimenti Procellaria Equinoziale. = *Puffinus, sive Procellaria Equinotialis.*

Puffino minore vedi: Berra minore. —— Puffinus minore.

Procellaria, o sia Uccello di tempesta. *Procellaria.*

DXXXIX.

Sterconario di coda lunga, altrim.te d'Uccello Aroico. — *Stercorarius longicaudus, alias Arct. Arctica dictus.*

Sterna maggiore — *Sterna major*.

Sterna minore. *Sterna minor.*

Sterna *cinerea*. —— *Sterna* *cinerea*.

Sterna cinerina di testa nera. —— *Sterna cinerea atricapilla.*

Sterna nera. — *Sterna nigra.*

DXXXXV.

Sterna mezzana di becco, piedi e occipite di color nero. — *Sterna media rostro, pedibus et occipite nigro.*

Sterna d.a volg.e in Toscana Petto-bianco. — Sterna vulgo in Etruria Petto-bianca dicta

Glareola — Glareola

Rigaopsalia, d.ti dai Francesi Becco a Forbice. = Rygaopsalia, Rostrum instar forficum. a Gallis dicta.

Uria maggiore. ——— *Uria major.*

Uria minore. ——— *Uria minor.*

Fraticella d.ᵗ dall' Aldovrando Pica Marina. — *Fratercula, Pica Marina ab Aldo=*
vrando dicta.

C. Albatro. C. Albatruj.

Cigno Reale. — Cygnus maximus.

Cigno Salvatico. ——————→ Cygnus ferus.

Cigno della China bianco. —— Cygnus Sinensis albus.

DLVI.

Cigno della China falbo. —— *Cygnus Sinensis ex flavo luteus.*

Cigno della China vario. ——— *Cygnus Sinensis versicolor.*

Pica comune. ——— *Anser vulgaris.*

Oca di vario colore d.ª Paglietana. —— *Anser versicolor.*

Oca di vario colore S.ª Lombardella. ——. Anser alius versicolor.

Oca Salvatica. Anser Sylvestris.

DLXII.

Oca Settentrionale. ——— *Anser Septentrionalis.*

Anatra domestica di vario colore. — *Anas domestica versicolor.*

Anatra domestica bianca, Femmina. —— *Anas domestica, Foemina.*

Anatra domestica di becco incurvato = Anas domestica rostro incurvo.

A Sua Altezza Reale l'Arciduchessa Anna d'Austria ec: ec:

Anatra domestica di becco incurvato altra varietà. — Anas domestica alia rostro incurvo.

All'Ill.mo Sig.re Marchese Giovanni de Serpos ec.

Anatra domestica sauna di becco inarcato, femmina. = Una domestica fusca rostro inarcato, femina.

A Sua Eminenza il Sig.re Cardle Diacono Pasquale Acquaviva ec.

Anatra d' India. —————— Anas Indica.

A Sua Eccellenza il Sig.re Principe di Torremuzza Siciliano ec.

Anitra d'India bianca, varietà dell'antecedente. — Anas Indica alba, antecedentis varietas.

A Sua Eccell.za il Sig.re Marchese Agostino Litta Patrizio Milanese ec.

Anatra galeata d. Germano. Reale. ——— Anas fera

All'Ill.mo Sig.re Rodolfo di Valtravers Consigliere e Ambasciatore per la Corte Elettorale Palatina di Wannheim e di Munich a Londra, Membro di molte Accademie d'Europa ec.

DI A M

Anatra salvatica di Germania femmina. — Anas Boschas maior.

A Sua Eccell.za il Sig.r Marchese Carlo Molinari Patrizio Milanese ec.

Anatra salvatica d'in Jamaica Mestolone, maschio = Anas latirostra, mas.

All'Ill.mo Sig.r Cav.re Giovanni Grimmston, Signore di Kilnwick nella Contea d'York, gran fautore delle Arti, e amatore dell'Istoria Naturale

c Mergolone · Femmina. ——— · Anas latirostra Foemina.

A Sua Alterza Elettorale il Serenis.mo Principe Saverio di Sassonia ec.ec.

DLXXV

Anatra salvatica ♂. in Toscana Cicalona, e Canapiglia Maschio. = Anas fera stre
pera Mas.

All: Ill: mo Sig. re Conte Pietro Verri Ciamberl: nu e Consigl: re Intimo delle LL. M. M.
I. I. e R. R., Amministrat: re delle Regie Finanze, Presidente del Commercio ec.

Cicalona e Canapiglia Femmina ——→ Anas fera strepera, Foemina.

A Sua Eccell: il Sig: Mse Cesare Beccaria Patrizio Milanese ec.

Volpoca Ital. dagli Autori . Tadorna . —— Vulpanser, Ornithologij . Tadorna .

All.mo Sig.re Carlo Gandini Celebre Medico, e Filosofo a Genova .

DLXXVII

Anatra d' Inverno Maschio. ——— Anas hyberna Mas.

A Sua Altezza il Serenissimo Margravio di Baden ec. ec.

DLXXVIII.

Anatra d'Inverno . Femmina. —— Anas hyberna Foemina .

A S. A. il Sig.re Principe del S. R. Imp.e Giovanni di Schwartzenberg ec.ec.

Anatra d' Estate. —— Anas Æstiva.

All'Ill.mo Sig.re Dottore Grazio Traversari Medico a Cervia.

Anatra col collare dell'Isola di Terra Nuova. = Anas Torquata ex Insula Terræ Nova.

Al Sig.r Moisè Beniamino Foà di Reggio Provved.re della Biblio=
teca Ducale di S. A. il Serenissimo Duca di Modena.

DLXXXI.

Anatra di coda lunga. —— *Anas longicauda.*

A S. E. il Sig.re Conte Iacopo Collalto Patrizio Veneto ec.

Anatra d.a in Toscana Germano Colombaccio. = Anas Palumbus torquatus quodammodo refert.

All'Ill.mo Sig.r Maggiore Marchese Cesare Malaspina de Marchesi di Mu=
lazzo Ciamb.e delle LL. MM. II. RR. Ap.ca, e delle LL. AA. RR. ecc.ca

Anatra Penelope Maschio. ——————— Anas Penelope Mas.

All'Ill.mo Reverendmo Sig.r Giuseppe dei Conti Strasoldo = Villanova, Canonico di Salisburgo.

DLXXXIV.

C. Anatra . Penelope . Femmina. ——— . Anas . Penelope . Foemina

All'. Illmo Sig.^r Marchese Carlo . Rinuccini Patrizio . Fiorentino
Ciamb.e delle LL. AA. RR. &.^ec. e delle LL. AA. RR. ec. ec.

C Inabra d.a in Toscana Marigiana Maschio. — Inab. pistularis Mas.

A Sua Eccell.za il Sig.re D. Trianco M.a Quarto Duca di Belgiojoso, Conte del Vaglio, Signore di Laurenzana e del Feudo di Montegrosso ec.

C Marigiana C Femmina ——— C Anas fistularis C Femmina

C All.ª Ill.ma Sig.re de C Briani Barone della C Tour D.ª Aigues Consigliere al C Parlamento D.ª Aix in C Provenza ec.

Fischione col ciuffo. ——————. Anas fistularis cristata.

All'. Illmo Sig.^re Pietro Foacier de Betteville ec.

DLXXXVIII.

Fischione (Americano. ——— (Anas fistularis Americana.

(All.: Ill.: mo Sig.: re Domenico Campostano Commiss.: o di Guerra per
S. A. R. nella Piazza di Livorno.

DLXXXIX.

C. Anatra Marina maggiore Maſchio. ——— Anas Glaucia major Maſ.

All.° Ill.mo Sig.re Conte Ridolfo Zauli Patrizio Faentino ec.

DLXXX

Anatra Marina maggiore Femmina. = Anas Glaucia major Foemina.

All'Ill.mo Sig.re Giuseppe M.a Cavalli ec. Modena.

DLXXXV

Anatra marina minore col ciuffo, Maschio. — Anas Glaucu minor Mas cristata.

All' Illmo Sig.^re D. Antonio Tanzi ec. Milano.

Anatra dell' antecedente specie ♂ *Femmina.* ——— ♀ *Anas Glaucæ minor Fœmina.*

All'Illmo Sig.^r Conte D. Giuseppe Visconti ec. Milano.

Anatra d'in Toscana, Canone, Quattrocchi e Domenicano Maschio. — *Anas Clangula mas.*

Ad Sua Eccellza il Sig.re Mse Girolamo Durazzo Patrizio Genovese &c.

Canone, Quattrocchi, e Domenicano Femmina. —— *Anas Clangula, Foemina.*

A Sua Eccellenza il Sig.re D. Franco d'Aquino Principe di Caramanico ec.

Anatra Cercedula maggiore Maschio. —— Anas querquedula major mas.

All.' Ill.mo Sig.re Roberto Ramsay de Blackraig il Giovane Socio del Real Collegio dei Medici di Edinburgo.

Anatra Cercedula maggiore d.a in Toscana Fischione = Anas alia querquedula major.

All'Ill.mo Sig.re Giacomo Ferber Svedese Professore di Storia Natu=rale appo il Serenis.mo Duca di Curlandia ec.

Anatra querquedula maggiore d.a in Toscana Scopajola. = *Anas alia querquedula major.*

All' Eccellmo Sig.re Dott.re Attilio Zuccagni Medico Fiorentino, Dilettante di Storia Naturale, e Socio Ordinario della Reale Accad.a di Agricoltura c.a dei Georgofili.

Anatra querquedula minore d'in Toscana Arzavola, e Marzajola = Anas querquedula minor.

A Sua Eccellza la Sig.ra Principessa Vittoria di Caramanico, Nata Duchessa di Maddalona ec.

Anatra querquedula col ciuffo della China. = Anas querquedula Sinarsis cristata.

Al Molto Ecc.te Sig.re Giuseppe Torricelli Celebre Intaglore in Gemme nella Galleria di S.A.R.

Alca Indiana. ——— Alca Indica.

All'Ill.mo Sig.re Cav.re Alessandro Sansedoni Ciamb.e delle LL. MM. 99. RR. Apr.ci Patrizi=
o Senese.